


479259

f


DEC 16 1955




LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

598.2
H363n

NATURAL
HISTORY



Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign



Ferdinand Heine

Nomenclator

Musei Heineani Ornithologici.

Verzeichniss der Vogel-Sammlung

des

Königlichen Oberamtmanns Ferdinand Heine

auf Klostergut St. Burchard vor Halberstadt,

herausgegeben von

Ferdinand Heine und **Anton Reichenow**

auf Kloster Hadmersleben

in Berlin.

Berlin.

R. Friedländer & Sohn.

1882 bis 1890.

598.2

H 363 n

Nat. Hist.

Die rühmlichst bekannte ornithologische Sammlung des Oberamtmanns Ferdinand Heine auf Kloostergut St. Burchard vor Halberstadt, lange Zeit einzig in ihrer Art dastehend und auch jetzt noch eine der bedeutendsten ornithologischen Privat-Sammlungen, ist im Jahre 1843 in wissenschaftlicher Form begründet worden. Hervorgegangen aus persönlicher Liebhaberei des Besitzers, welcher seit 1830 in- und ausländische Vogelbälge, anfänglich als Zimmerschmuck, dann weitergehend zur Ausstattung ganzer Räume zusammenbrachte und in seinen Mussestunden studirte, wurde die Sammlung unter Beihülfe von Fach-Gelehrten, vor Allem unter der Jahrzehnte lang andauernden, treuesten Unterstützung des Professor Dr. J. Cabanis in Berlin, zu einem wirklichen Museum ausgebildet, dessen Schätze der Besitzer stets mit grösster Liberalität für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung gestellt hat.

Ferdinand Heine, am 9. März 1809 geboren, ist jetzt wohl der Nestor aller lebenden Ornithologen. Wie er in Freundeskreisen wegen seiner gewinnenden Herzensgüte und wohlwollenden Freundlichkeit verehrt wird, so hat ihm sein feines Verständniss für alle Schöpfungen der Natur und sein hervorragender Scharfblick im Erkennen der verschiedenen Vogelformen die Achtung und Hochschätzung aller Fachgenossen erworben. Seit seiner frühesten Jugend von dem lebhaftesten Interesse für die Naturkunde im Allgemeinen und für die Vogelkunde im Besonderen erfüllt, hat er schon als Schüler mit Vorliebe die Zucht und die Pflege edler Taubenrassen betrieben, und aus dieser Taubenliebhaberei entstand, von Jahr zu Jahr wachsend, seine Liebe für alle leben-

den Wesen, besonders aber für die Vogelwelt, welche Liebe allmählig mehr und mehr wissenschaftlich geschult, ein weiteres Ziel erstrebte. Noch heute hat er trotz seines hohen Alters dasselbe rege Interesse und dieselbe reine Freude an der vielseitigen Gestaltung seiner befiederten Lieblinge wie in jüngeren Jahren.

Durch Vermittelung des verstorbenen Geheimraths Lichtenstein, Directors des zoologischen Museum der Kgl. Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, wurde Ferdinand Heine vor nunmehr 47 Jahren mit dem damals gerade von seiner amerikanischen Reise zurückgekehrten Dr. Cabanis bekannt, dessen Anregung ihn zuerst auf eine wissenschaftliche Gestaltung und planmässige Vervollkommnung seiner Sammlung hinleitete. Seinem rastlosen Eifer gelang es mit Unterstützung seines Berliner Freundes bald, das begonnene Werk derartig zu fördern, dass seine Sammlung in den fünfziger Jahren der ornithologischen Abtheilung des Kgl. Museums in Berlin wenig nachstand, in einzelnen Gruppen dieselbe sogar weit überflügelt hatte. Eine grössere und allgemeinere Bedeutung gewann indessen die Sammlung erst dadurch, dass sie auf Heine's Anregung und unter dessen stetiger, eingehendster Betheiligung von Dr. Cabanis in den Jahren 1850 und 1851 allein, sodann von 1859 bis 1863 in Gemeinschaft mit dem ältesten Sohn des Besitzers, dem damaligen stud. philos. Ferdinand Heine II., wissenschaftlich bearbeitet wurde, wobei manche neue Gesichtspunkte für die Systematik gewonnen, die Synonymie vieler Arten geklärt und eine grössere Anzahl neuer Species beschrieben werden konnten. Diese Ergebnisse sind in dem in fünf Theilen erschienenen „Museum Heineanum“, begonnen von J. Cabanis, fortgesetzt von J. Cabanis und F. Heine jun. (Halberstadt 1850—1863), niedergelegt worden. Die beiden letzten dieser die Ordnungen der *Oscines*, *Clamatores*, *Strisores* und die Hälfte der *Scansores* umfassenden Theile sind völlig monographisch ausgearbeitet, so dass sie sowohl die damals in der Sammlung vorhandenen, als noch fehlenden Arten nicht nur aufzählen, sondern auch mit vollständiger Synonymie beschreiben. Als 1864 Ferdinand Heine II. sich vom Studium der Naturwissenschaften zur Land-

wirthschaft wandte, war es dem durch Berufsarbeiten überreichlich in Anspruch genommenen Dr. Cabanis nicht möglich, das begonnene Werk allein fortzusetzen und zu vollenden. Wenn somit in der kritischen Bearbeitung des Materials ein Stillstand eintrat, so wurde doch der Sammeleifer des Oberamtmann Heine nur wenig gehemmt, und ist das „Museum Heineanum“ bis auf den heutigen Tag stetig vermehrt und vervollständigt worden.

Der lebhafteste Wunsch des Besitzers, ein gedrucktes Verzeichniss seiner Schätze zu haben, veranlasste dessen Sohn, Ferdinand Heine II., unter Mithilfe des Unterzeichneten zur Fertigstellung des vorliegenden Katalogs. Als Manuscript lag für die Arbeit ein vom Oberamtmann Ferdinand Heine eigenhändig verfasstes Verzeichniss vor. Die Thätigkeit der Herausgeber hat sich daher darauf beschränkt, einestheils die unsicheren und die wenigen überhaupt nicht bestimmten Stücke der Sammlung zu prüfen, beziehungsweise zu bestimmen, andernteils unter möglichstem Anschluss an die in dem ältern Verzeichniss gewählten Bezeichnungen die vorhandenen Arten unter denjenigen Namen aufzuführen, welche jedesmal zur Zeit der Prüfung als die richtigsten erschienen. Da beide Herausgeber über sehr knapp bemessene Zeit für den vorstehenden Zweck verfügen konnten, zudem vom Sitz der Sammlung entfernt wohnen, hat die Arbeit nur sehr langsam gefördert werden können. Es sind neun Jahre vom Beginn bis zur Beendigung verflossen, wie die auf jedem Bogen vermerkten Drucktage erkennen lassen. Die meisten der in neuester Zeit zahlreich erschienenen Monographien haben deshalb nicht benutzt werden können. Das Vorkommen mancher gegenwärtig nicht mehr gebräuchlichen Namen in dem Verzeichniss wird bei Beachtung des Druck-Tages genügende Entschuldigung finden.

Hinsichtlich der Systematik und Nomenclatur schliesst das nachfolgende Verzeichniss eng an die ältere Arbeit („Museum Heineanum“) sich an. Aus diesem Grunde haben in demselben die gegenwärtig für die Namengebung massgebenden Grundsätze nicht volle Berücksichtigung erfahren. Insonderheit sind, wie dies in dem ältern Katalog geschehen, barbarische und unrichtig gebildete

Gattungsnamen durch spätere oder bei Fehlen solcher durch neue, regelrecht gebildete ersetzt, beziehungsweise verbessert worden.

Bei dem Umfange der Sammlung und in Anbetracht des Umstandes, dass dieselbe viele Typen enthält, welche im Druck durch einen * kenntlich gemacht worden sind, schien es von allgemeinem Nutzen zu sein, diesem zunächst nur für die unmittelbare Benutzung des Heine'schen Museums und die persönlichen Zwecke des Besitzers bestimmten Katalog eine weitere Verbreitung durch den Buchhandel zu geben. Möge die Veröffentlichung in diesem Sinne aufgenommen werden.

Berlin, im September 1890.

Ant. Reichenow.

Ordo I. Oscines.

Fam. Rhacnemididae.

Subfam. Luscininae.

Genus *Aëdon* Forst. 1814.

1. *luscinia* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ [*communis* L. Brehm*]
Renthendorf (Thüringen); 1 ♂ [*occidentalis* A.
E. Brehm*] Catalonien.
2. *philomela* (Bchst.) — 1 ♂ Ost-Europa; 1 St. Laaland.

Genus *Erythacus* Cuv. 1801.

1. *rubecula* (L.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 juv. Harz; 2 jun. Schlesien.
2. *akahige* (Temm.) — 1 ♂ Japan.

Genus *Melodes* Keys. et Blas. 1840.

1. *calliope* (Pall.) — 1 ♂ Kamtschatka; 1 ♂ Amoy; 1 ♂ Ostindien.
2. *pectoralis* (Gould) — 1 ♂ Sikkim.

Genus *Cyanecula* Brehm 1828.

1. *suecica* (L.) [*Motacilla caerulecula* Pall.] — 2 ♂ Sibirien; 1 ♂
[*dichrosteria* Cab.* Mus. Hein. I. p. 1] Suez.

2. *leucocyana* Brehm [*Sylvia cyanecula* Wolf] — 2 ♂ Thüringen;
4 ♂, 2 ♀ Europa; 1 ♂ [*Wolffi* Brehm] Europa.

Genus *Grandala* Hodgs. 1843.

1. *caelicolor* Hodgs. — 1 ♂, 1 ♀ Decan.

Genus *Ruticilla* Brehm 1828.

1. *phoenicea* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Harz; 1 juv.
Frankreich.
2. *tithys* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
3. *semirufa* (Hempr. et Ehr.) — 1 ♀ Syrien.
4. *aurea* (Gm.) — 1 ♂ Japan; 1 ♀ Amoy.
5. *Hodgsoni* Moore — 1 ♂ Himalaya.
6. *rufiventris* (Vieill.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Ostindien; 1 ♂ Ma-
dras; 1 ♂ Nord-Decan.
7. *frontalis* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya.
8. *leucocephala* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Ostindien.
9. *fuliginosa* (Vig.) — 2 ♂ Himalaya.

Genus *Larvivora* Hodgs. 1837.

1. *brunnea* Hodgs. — 1 ♂ Nepal.

Genus *Nemura* Hodgs. 1844.

1. *cyanura* (Pall.) — 1 ♀ Japan; 1 ♀ Amoy.

Genus *Tarsiger* Hodgs. 1844.

1. *chrysaeus* Hodgs. — 1 ♂ Darjeeling; 1 ♀ Ostindien.
2. *superciliaris* Hodgs. — 1 ♂, 1 ♀ Sikkim (Ostindien).

Genus *Pogonocichla* Cab. 1847.

1. *stellata* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Callene* Blyth 1847.

1. *frontalis* (Blyth) — 1 ♂ Nepal.

Subfam. Turdinae.

Genus *Catharus* Bp. 1850.

1. *melpomene* (Lcht.) [*Turdus melpomene* (Lcht.) Cab. Mus. Hein. I. p. 5] — 1 ♂ Xalapa; 1 ♂ Costa Rica; 1 ♀ Duennas (Guatemala).
2. *aurantiurostris* (Hartl.) — 1 ♂ Caracas.
3. *occidentalis* ScL. — 1 ♂, 1 ♀ Totontepec (Mexico).
4. *Frantzii* Cab. — 1 ♂ Costa Rica.

Genus *Hylocichla* Baird 1864.

1. *Pallasi* (Cab.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Georgien.
2. *Aonalaschkae* (Gm.) — 1 ♂ S. Francisco; 1 ♀ Sierra Nevada (Californien); 1 ♀ Nord-America.
3. *Auduboni* (Baird) — 1 ♂ La Parada (Mexico); 1 ♀ Mexico.
4. *fuscescens* (Steph.) — 1 St. Nord-America.
5. *ustulata* (Nutt.) — 1 ♂ Guatemala.
6. *Swainsoni* (Cab.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Pallatanga (Ecuador); 1 ♀ Nanegal (Ecuador).
7. *Aliciae* (Baird) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
8. *mustelina* (Gm.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Vera Paz (Guatemala).

Genus *Planesticus* Bp. 1854.

1. *jamaicensis* (Gm.) — 1 ♂ Jamaica.
2. *phaeopygus* (Cab.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Guiana; 1 St. Macas (Ecuador).
3. *crotopezus* (Lcht.) — 1 ♀ Brasilien.
4. *albicollis* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
5. *tristis* (Sws.) [*assimilis* Cab.* Mus. Hein. I. p. 4] — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa; 1 ♂ Central-America.
6. *leucauchen* (ScL.) — 1 ♂, 1 ♀ Guatemala.
7. *leucomelas* (Vieill.) [*amaurochalinus* Cab.* Mus. Hein. I. p. 5] — 1 ♂ juv., 1 ♀, 1 juv. Brasilien.

8. *gymnophthalmus* (Cab.) — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♂ Caracas.
9. *albiventer* (Spix) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ [var. an sp. dist.]
Babahoyo (Ecuador).
10. *ignobilis* (Scl.) — 1 St. Bogota.
11. *Grayi* (Bp.) — 1 ♂, 1 juv. Xalapa; 1 ♂ Duennas (Guatemala).
12. *euryzonus* (Du Bus) [*T. fulviventris* Scl.] — 1 ♂ Bogota.
13. *rufiventris* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Brasilien.
14. *fumigatus* (Licht.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Brasilien.
15. *magellanicus* (King) — 2 ♂, 1 ♀ Chile; 1 St. Collico (Chile);
1 ♂, 1 jun. Cordilleren v. Chile; 1 ♀ Valdivia.
16. *migratorius* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 juv. Nord-America.
17. *flavirostris* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Semimerula* Scl. 1859.

1. *gigas* (Fras.) — 1 ♂ [var.] Bogota; 1 ♀ Cachi Llacta (Ecuador).
2. *infuscata* (Lafr.) — 1 ♂ Totontepec (Mexico).
3. *flavipes* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♀ Brasilien.
4. *atrosericea* (Lafr.) — 2 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ juv. Neu-Granada.
5. *aurantia* (Gm.) — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Hesperocichla* Baird 1864.

1. *naevia* (Gm.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Merula* Leach 1816.

1. *nigra* Leach — 1 ♂, 1 ♂ [var.], 2 ♀, 2 juv. Harz; 1 ♀ Schlesien;
1 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♀ jun. Westfalen.
2. *boulboul* (Lath.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Nepal.
3. *mandarina* (Bp.) — 1 ♀ Amoy.
4. *albicincta* (Royle) — 1 ♂ jun. Nepal.
5. *castanea* Gould — 1 ♂ Himalaya.
6. *Kinnisi* Blyth — 1 ♂ Ceylon.
7. *javanica* (Horsf.) [*Turdus hypopyrrhus* Hartl.] — 1 ♂ Java.
8. *poliocephala* (Lath.) — 1 ♂ Norfolk-Insel.

Genus *Turdulus* Hodgs. 1844.

1. *Wardi* (Jerd.) — 1 ♂ Himalaya.

2. *cardis* (Temm.) — 1 ♂ Japan.
 3. *sibiricus* (Pall.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ Japan; 1 ♀ Ostindien.

Genus *Turdus* L. 1766.

1. *musicus* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 St. [var. *alba*], 1 St. [var. *albida*],
 3 St. [var. *albesc.*] Harz; 1 St. Schlesien.
 2. *iliacus* L. — 3 St., 3 St. [var. *pallida*], 1 St. [var. *albida*] Harz;
 1 St. Schlesien; 1 ♂ Nord-Russland.
 3. *viscivorus* L. — 1 ♂, 2 ♀ Harz; 1 ♂ [*Hodgsoni* v. Hom.*] Hi-
 malaya.
 4. *pilaris* L. — 2 ♂, 2 ♀ Harz.
 5. *torquatus* L. — 3 ♂, 1 ♀ Harz.
 6. *atrigrularis* Temm. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Nord-Asien; 1 ♂ jun.
 Nepal.
 7. *ruficollis* Pall. — 2 ♂, 1 ♀ Amur.
 8. *Naumanni* Temm. — 1 ♀ Harz; 1 ♀ Amur.
 9. *fuscatus* Pall. — 1 ♂ Amur; 1 ♀ Formosa.
 10. *pallidus* Gm. [*daulias* Temm.] — 1 ♂ Japan; 1 ♀ Formosa.
 11. *obscurus* Gm. [*pallens* Pall.] — 1 ♂ Harz; 1 ♂ Malacca; 1 ♂,
 2 ♀ Java.
 12. *chrysolaus* Temm. — 1 ♂ Formosa; 1 jun. Japan.
 13. *protomomelas* Cab. [*dissimilis* Blyth] — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Psophocichla* Cab. 1860.

1. *strepitans* (Smith) — 1 ♂ Kaffernland.
 2. *simensis* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.
 3. *olivacea* (L.) — 3 ♂ Süd-Africa; 1 ♀ Cap.
 4. *Cabanisi* (Bp.)* [Mus. Hein. I. p. 3] — 1 ♂ Kaffernland.
 5. *icterorhyncha* (Pr. Würt., v. Heugl.) — 1 ♂ Nordost-Africa;
 1 ♀ Abessinien.
 6. *cryptopyrrha* Cab.* in Mus. Hein. Mscr. [*T. chiguancoides* (!)
 Seebohm]. — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Geocichla* Kuhl 182?.

1. *citrina* (Lath.) — 1 ♀ Ostindien.

2. *rubecula* Gould — 2 ♂, 1 ♀ Java.
3. *innotata* Blyth — 1 ♂ Hinter-Indien.

Genus *Oreocincla* Gould 1837.

1. *dauma* (Lath.) — 1 St. Ostindien; 1 St. Nepal.
2. *lunulata* (Lath.) — 1 ♂ Australien.
3. *macrorhyncha* Gould — 1 St. Van Diemensland.
4. *varia* (Pall.) — 1 St. Sibirien.
5. *Heinei* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 6; Journ. Orn. 1872 p. 236
— 237] — 1 St. Nord-Australien.
6. *Horsfieldi* Bp. — 1 St. Java.

Genus *Zoothera* Vig. 1831.

1. *monticola* Vig. — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Nepal.

Genus *Myiophonus* Temm.

1. *flavirostris* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *Temmincki* Vig. — 1 ♂ Himalaya; 1 St. Ostindien.
3. *Horsfieldi* Vig. — 1 ♂ Himalaya.
4. *cyaneus* (Horsf.) — 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♂, 1 ♀ Java.

Subfam. **Saxicolinae.**

Genus *Sialia* Sws. 1827.

1. *sialis* (L.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 jun., 1 juv. Nord-America.
2. *mexicana* Sws. et Rich. — 1 ♂ Mexico.
3. *occidentalis* Towns. — 1 ♂, 1 ♀ Californien.

Genus *Petrophila* Sws. 1837.

1. *erythrogastra* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya; 1 ♂ Darjeeling.
2. *cinclorhyncha* (Vig.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Monticola* Boie 1822.

1. *saxatilis* (L.) — 1 ♂, 2 ♂ juv., 1 ♀ juv. Süd-Europa; 1 ♂ Pie-

mont; 1 ♂ juv. Harz; 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Keren
(Nordost-Africa).

2. *cyanea* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Frankreich; 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
3. *rupestris* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
4. *explorator* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ juv. Cap.

Genus *Myrmecocichla* Cab. 1850.

1. *formicivora* (Vieill.) — 1 ♂, 1 St. Süd-Africa.
2. *aethiops* (Lcht.) [Cab. Mus. Hein. I. p. 8] — 1 St. Senegal.

Genus *Thamnolaea* Cab. 1850.

1. *cinnamomeiventris* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland.
2. *semirufa* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 jun. Abessinien.

Genus *Bessornis* Smith 1836.

1. *bicolor* (Sparrm.) [*T. vociferans* Sws.] — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♂ Natal.
2. *natalensis* (Smith) — 1 ♂ jun. Natal.
3. *verticalis* (Hartl.) — 2 ♂ Senegal; 1 ♂ West-Africa.
4. *phoenicura* (Gm.) — 2 ♂ Süd-Africa; 2 ♂ Cap.
5. *semirufa* (Rüpp.) — 1 ♂ Abessinien.
6. *albicapilla* (Vieill.) — 1 ♂ Gambia; 1 ♂ West-Africa.

Genus *Cichladusa* Ptrs. 1863.

1. *guttata* (v. Heugl.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Copsychus* Wagl. 1827.

1. *sularis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien; 1 ♂ Siam; 1 ♂ juv. Malacca.
2. *macrurus* (Gm.) — 2 ♂ Ostindien; 1 ♀ Java.
3. *amoenus* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
4. *pica* (Natt.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Dromolaea* Cab. 1850.

1. *monticola* (Vieill.) — 1 jun. Kaffernland; 1 ♂, 2 juv. [*Sylvia cursoria* Vieill.] Süd-Africa.

2. *monacha* (Rüpp.) — 3 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
3. *leucura* (Gm.) — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Sierra Nevada (Spanien); 1 ♂ jun. Constantine; 1 St. Algier.
4. *cinerea* (Vieill.) — 1 ♂ Cap; 1 St. Süd-Africa.

Genus *Saxicola* Behst. 1802.

1. *oenanthe* (L.) — 3 ♂, 2 ♀, 1 juv. Harz; 1 ♀ Attica; 1 ♀ Smyrna; 1 ♂, 1 ♀ [*libanotica* Hempr. et Ehr.*] Libanon.
2. *stapazina* (L.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂ Griechenland.
3. *aurita* Temm. [*albicollis* Vieill.] — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂ Griechenland.
4. *deserti* Temm. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Nordost-Africa; 1 ♂ Arabien; 1 ♂ jun. Luxor.
5. *lugens* Licht. — 2 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂ Ober-Egypten; 1 ♂, 1 ♂ jun. Constantine; 1 ♀ Nord-Africa.
6. *morio* Hempr. et Ehr. [*pleschanka* Lepesch., *leucomela* Pall.] — 1 ♂ Ural.
7. *lugubris* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.
8. *isabellina* Rüpp. — 1 ♂ Chartum; 1 ♂ Sennaar; 1 ♂ Dongola; 1 ♀ Abessinien; 1 ♂ [*saltatrix* Mén.] Smyrna.
9. *moesta* Licht. — 1 ♂ Algier.
10. *picata* Blyth — 2 ♂ Himalaya.
11. *Galtoni* (Strickl.) — 1 St. Cap.

Genus *Cercomela* Bp. 1856.

1. *melanura* (Temm.) — 1 ♂, 2 ♀ Nordost-Africa.

Genus *Campicola* Sws. 1827.

1. *pileata* (Gm.) — 1 ♂ Cap; 1 ♂ Süd-Africa.
2. *bifasciata* (Temm.) — 2 ♂ Cap.

Genus *Pentholaca* Cab. 1850.

1. *frontalis* (Sws.) — 1 St. Casamanze (West-Africa).

Genus *Pratincola* Koch 1816.

1. *rubetra* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 2 juv. Harz.
2. *rubicola* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ juv. Harz; 1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
3. *sibylla* (L.) — 2 ♂ Süd-Africa.
4. *Hemprichi* (Ehrb.) — 2 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa; 1 ♂ Abessinien.
5. *ferrea* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 ♀ Himalaya.
6. *Moussieri* (Gall.) [Cab. Journ. Orn. 1853 Extrah. p. 7] — 1 ♂, 2 ♀ Algier.
7. *caprata* (L.) — 1 ♂ Ostindien; 3 ♂, 2 ♀ Timor; 1 ♂, 1 ♀ Etawah (Himalaya).

Genus *Lamprolia* Finsch 1873.

1. *minor* Kleinschm. — 1 ♂ Kandavu (Viti-Inseln).

Genus *Oreicola* Bp. 1854.

1. *melanoleuca* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Timor.
2. *pyrrhonota* (Müll. et Schl.) — 1 St. Timor.

Genus *Petroeca* Sws. 1832.

1. *cuicullata* (Lath.) — 2 ♂ Australien.
2. *multicolor* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *phoenicea* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Van Diemensland.
4. *Goodenovi* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂ Australien; 1 ♂ West-Australien.

Genus *Myioscopus* Rchb. 1850.

1. *albifrons* (Gm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Erythrodryas* Gould 1842.

1. *rhodinogastra* (Drap.) — 1 ♂ Australien.

Subfam. Cinclinae.

Genus *Cinclus* Behst. 1802.

1. *aquaticus* Behst. — 1 ♂ Goeltzschthal; 1 ♀ Harz; 1 ♀ Thüringer Wald.
2. *melanogaster* Brehm — 1 ♂ Harz.
3. *marila* (Swinh.) — 1 St. Formosa.
4. *asiaticus* Sws. — 1 ♂ Central-Asien.
5. *mexicanus* Sws. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Henicurus* Temm. 182?.

1. *velatus* Temm. — 1 ♂ Java; 1 ♂ Sumatra.
2. *Leschenaultii* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Java.
3. *maculatus* Vig. — 2 ♂ Himalaya.
4. *ruficapillus* Temm. — 1 ♂ Borneo.

Genus *Eupetes* Temm. 1836.

1. *macrocerus* Temm. — 2 St. Sumatra; 1 St. Borneo.

Fam. Sylvicolidae.

Subfam. Motacillinae.

Genus *Motacilla* L. 1735.

1. *alba* L. — 3 ♂ Harz; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Nordost-Africa;
1 ♀ Abessinien; 1 ♂ [var.] Galizien.
2. *dukhnensis* Sykes — 2 St. Sirinagur (Ostindien).
3. *lugens* Ill. — 3 ♂ Kamtschatka.
4. *luzoniensis* Scop. — 1 ♂ Ostindien.
5. *Hodgsoni* Gray. — 1 ♂ Dekan.
6. *Vaillanti* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 13] — 1 ♂ Südwest-Africa.
7. *Lichtensteini* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 12] — 1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa; 1 ♂ Nubien; 1 ♂ Mozambique.
8. *capensis* L. — 1 jun. Cap.

Genus *Pallemura* Pall. 1831.

1. *sulphurea* (Behst.) — 2 ♂ Harz; 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♀ [var. *pallida*] Krim; 1 ♀, 1 jun. Ostindien.

Genus *Budytes* Cuv. 1817.

1. *flavus* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Galizien; 3 ♂, 2 ♀ Nordost-Africa; 1 ♂ [*fasciata* Brehm*] Chartum; 1 ♂, 1 ♀ [*intercedens* Brehm*] Süd-Frankreich; 1 ♂ adol. [*campestris* Brehm*] Chartum; 1 ♀ [*campestris* Brehm*] Dongola.
2. *viridis* (Scop.) — 2 St. Nepal.
3. *pygmaeus* O. Brehm — 1 ♂ Alexandrien; 1 ♀ Unter-Egypten;
1 ♀ Nil-Delta.
4. *cinereocapillus* (Savi.) — 1 ♂ Dalmatien.
5. *melanocephalus* (Leht.) — 1 ♂ Griechenland; 2 ♂, 1 ♂ jun. Chartum; 1 ♂ juv. Alexandrien.
6. *Kaliniczenskii* (Kryn.) — 2 ♂ Tamak (Krim).
7. *citreolus* (Pall.) — 1 ♂ Amur; 1 juv. Ostindien.

Genus *Limoniidromus* Gould 1862.

1. *indicus* (Gm.) — 1 ♂ Nepal; 1 ♀ Ostindien.

Genus *Anthus* Behst. 1802.

1. *pratensis* (L.) — 3 ♂, 3 ♀ Harz; 1 St. Nordost-Africa.
2. *cervinus* (Pall.) — 1 ♂ Griechenland; 1 ♂ Tamak (Krim); 1 ♂ Süd-Russland.
3. *leucophrys* Vieill. — 1 ♂ Choarec (Ostindien) [!].
4. *obscurus* (Gm.) — 1 ♂ Griechenland; 1 St. Schweden.
5. *spinoletta* (L.) — 1 St. Süd-Frankreich; 1 St. ?; 1 St. [*orientalis* Brehm*] Nil-Delta.
6. *ludovicianus* (Gm.) — 1 St. Nord-America; 1 ♂ Grönland.
7. *sordidus* Rüpp. — 1 St. Abessinien; 1 St. West-Africa.
8. *euonyx* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 14] — 1 ♂ Java; 1 ♂ Sumatra; 1 ♀ China.
9. *striolatus* Blyth — 1 St. Ostindien.
10. *arboreus* Behst. — 2 ♂, 1 ♀ [var. *alba*] Harz.
11. *agilis* Sykes — 1 St. Ostindien.
12. *chii* Vieill. — 1 ♂, 1 St. Brasilien.
13. *Hasselti* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Java.
14. *correndera* Vieill. — 1 ♂ Brasilien; 1 St. Chile.
15. *campestris* Behst. — 3 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ Griechenland.
16. *australis* Vig. et Horsf. — 1 St. West-Australien; 1 St. Australien.

Genus *Corydalla* Vig. 1825.

1. *Richardi* (Vieill.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 St. Spanien.
2. *sinensis* Bp. — 1 St. China.

Genus *Macronyx* Sws. 1837.

1. *capensis* (L.) — 2 ♂, 1 jun. Cap.

Genus *Sinus* Sws. 1827.

1. *aurocapillus* (L.) — 1 ♂, 1 St. Mexico.

2. *noveboracensis* (Gm.) — 1 St. Venezuela.
3. *major* (Cab.)* [Mus. Hein. I. p. 16] — 1 St. Xalapa.

Subfam. Sylvicolinae.

Genus *Oporornis* Baird 1858.

1. *formosa* (Wils.) — 1 ♂ Vera Paz (Guatemala).

Genus *Geothlypis* Cab. 1847.

1. *trichas* (L.) — 3 ♂ Nord-America.
2. *speciosa* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
3. *aequinoctialis* (Gm.) — 1 ♀ Cayenne.
4. *velata* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Rio Grande; 1 + Mexico.
5. *Philadelphiae* (Wils.) — 1 ♂ jun. Mexico.
6. *Macgillivrayi* (Aud.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Icteria* Vieill. 1816.

1. *viridis* (Gm.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 2 ♀ Nord-America.
2. *longicauda* Lawr. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Granatellus* Du Bus 1850.

1. *Sallaei* Scl. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Myioctonus* Cab. 1850.

1. *mitratus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-America.
2. *pusillus* (Wils.) — 3 ♂ Mexico; 1 ♀ Duennas (Guatemala).

Genus *Basileuterus* Cab. 1847.

1. *vermivorus* (Vieill.) — 1 St. Brasilien; 1 St. Bogota.
2. *bivittatus* (Lafr. et d'Orb.) — 1 St. Cachi Llaeta (Ecuador).
3. *culicivorus* (Leht.) [Cab. Mus. Hein. I. p. 17] — 1 ♂ Xalapa;
1 ♂ Mexico.

4. *Belli* (Giraud) — 1 ♂ Mexico.
5. *rufifrons* (Sws.) — 1 ♂ Oaxaca (Mexico).
6. *mesochrysus* Scl. — 1 ♂ Bogota.
7. *coronatus* (Tsch.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador); 2 ♂ Bogota.
8. *cinereicollis* Scl. — 1 ♂ Bogota.
9. *stragulatatus* (Lcht.) — 1 ♂ Bahia.
10. *leucoblepharus* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
11. *uropygialis* Scl. — 1 ♀ Bogota.

Genus *Myiothlypis* Cab. 1850.

1. *nigrocristata* (Lafr.) — 1 ♂ Columbien; 2 ♂ Bogota.
2. *flaveola* (Baird) — 2 St. Brasilien.

Genus *Setophaga* Sws. 1827.

1. *ruticilla* (L.) — 3 ♂, 2 ♀ Nord-America; 1 ♀ Caracas.
2. *picta* Sws. — 1 ♂ Mexico.
3. *miniata* Sws. — 2 ♂ Mexico.
4. *verticalis* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂ Caracas; 1 ♂ Bogota.
5. *ruficoronata* Kaup — 1 ♂ Lloa (Ecuador).
6. *albifrons* Scl. et Salv. — 1 ♂ Merida (Venezuela).
7. *ornata* Boiss. — 2 ♂ Columbien; 2 ♂ Bogota.

Genus *Cardellina* Bp. 1850.

1. *rubrifrons* (Giraud) — 1 ♂ Mexico.
2. *rubra* Bp. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Mexico.

Genus *Euthlypis* Cab. 1850.

1. *lacrymosa* (Lcht.) [Cab. Mus. Hein. I. p. 19] — 1 ♂ Mexico.
2. *canadensis* (L.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂ Texas.

Genus *Mniotilta* Vieill. 1816.

1. *varia* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Compsothlypis* Cab. 1850.

1. *americana* (L.) — 2 St. Nord-America.

2. *pitiayumi* (Vieill.) — 2 ♂, 3 ♀ Brasilien; 2 ♂ Bogota.
3. *superciliosa* (Hartl.). [*C. mexicana* (Licht.) Cab. Mus. Hein. I. p. 21] — 1 St. Mexico.

Genus *Helminthophaga* Cab. 1850.

1. *pinus* (L.) — 1 ♂ Mexico.
2. *ruficapilla* (Wils.) — 1 ♂ Mexico.
3. *celata* (Say.) — 2 ♂, 1 ♀ Mexico.
4. *peregrina* (Wils.) — 1 ♀ Duennas (Guatemala); 1 jun. Caracas.

Genus *Helmintherus* Rafin. 1819.

1. *vermivorus* (Gm.) — 1 St. Georgien.

Genus *Rhimanphus* Rafin. 1819.

1. *virens* (Gm.) — 1 ♂ Mexico.
2. *Townsendi* (Nutt.) — 1 ♂ jun. Mexico.
3. *occidentalis* (Townsend.) — 1 ♂ ad., 1 ♂ jun. Mexico.
4. *nigrescens* (Townsend.) — 1 St. Mexico.
5. *canadensis* (L.) — 1 ♂ Nord-America.
6. *coronatus* (L.) — 2 ♂ juv. Nord-America.
7. *Anduboni* (Townsend.) — 1 ♂ ad., 1 ♂ jun. Oaxaca (Mexico).
8. *Blackburniae* (Gm.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♀ New-York;
1 ♂, 3 jun. Bogota.
9. *castaneus* (Wils.) — 1 ♂ Mexico.
10. *pinus* (Wils.) — 1 ♂ ad., 1 ♂ jun. Nord-America.
11. *pennsylvanicus* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ Rockport (Ohio).
12. *caeruleus* (Wils.) — 1 ♂ Rockport (Ohio); 1 ♀ Georgia.
13. *striatus* (Forst.) — 2 ♂ Nord-America.
14. *aestivus* (Gm.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♀ Süd-Carolina; 1 ♀
Venezuela.
15. *Vieilloti* (Cass.) — 1 ♂ Mexico.
16. *olivaceus* (Gir.) — 1 St. Mexico.
17. *maculosus* (Gm.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂ jun., 1 ♀ New-York.
18. *dominicus* (L.) — 2 ♂ Nord-America.

Subfam. *Thraupinae*.

Genus *Hemithraupis* Cab. 1850.

1. *ruficapilla* (Vieill.) [*Hylophilus ruficeps* Wied] — 3 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Bahia.
2. *flavicollis* (Vieill.) [*Sylvia melanoxantha* Lcht.] — 2 ♂, 2 ♀ Bahia.
3. *guirra* (L.) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♂ Surinam; 1 ♂ Brasilien.
4. *albigularis* (Scl.) — 2 ♂ Bogota.

Genus *Nemosia* Vieill. 1816.

1. *pileata* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Bahia.

Genus *Hypothlypis* Cab. 1847.

1. *velia* (L.) [*Tanagrella iridina* Hartl.] — 1 St. Porto Cabello.
2. *cyanomelas* (Wied.) [*H. velia* Cab. Mus. Hein. I. p. 22] — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Bahia.

Genus *Tachyphonus* Vieill. 1816.

1. *melaleucus* (Sparrm.) [*Tanagra nigerrima* Gm.] — 3 ♂, 3 ♀ Brasilien.
2. *luctuosus* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).
3. *cristatus* (Gm.) — 4 ♂, 1 ♂ juv., 1 juv., 1 ♀ Brasilien.
4. *surinamus* (L.) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♂ Guiana.
5. *coronatus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Trichothraupis* Cab. 1850.

1. *quadriviridis* (Vieill.) — 4 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Eucometis* Scl. 1856.

1. *albicollis* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Surinam; 1 ♂ Porto Cabello.

Genus *Pogonothraupis* Cab. 1848.

1. *atricapilla* (Gm.) — 1 ♂ Mexico.
2. *aurantia* (Lafr.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Vera Paz (Guatemala).

Genus *Phoenicophilus* Strickl. 1851.

1. *palmarum* (L.) — 1 ♂ S. Domingo.

Genus *Lamprotes* Sws. 1837.

1. *loricatus* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.

Genus *Sericossypha* Less. 1845.

1. *albicristata* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Orthogonys* Strickl. 1844.

1. *viridis* (Spix) — 2 St. Brasilien.

Genus *Phoenicotheraupis* Cab. 1850.

1. *rubica* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *rubicoides* (Lafr.) — 1 ♂ Duennas (Guatemala): 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Mexico; 2 ♀ Guatemala.

Genus *Phoenicosoma* Sws. 1837.

1. *rubra* (L.) — 4 ♂ Nord-America.
2. *aestiva* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Carolina; 1 ♂, 1 ♀ Esmeraldas (Ecuador); 1 ♂, 1 ♀ Pallatanga (Ecuador); 1 ♂, 1 ♂ jun. Bogota.
3. *saira* (Spix) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Peru; 1 ♂ juv. Caracas.
4. *hepatica* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Xalapa; 1 ♂ jun., 1 ♀ Mexico.
5. *rubriceps* (Gray) — 2 ♂ Columbien; 1 ♂ Bogota.
6. *erythrocephala* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
7. *erythromelaena* (Leht.) [*Pyrranga bivittata* Lafr., *Ph. leucoptera* Trud.] — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa (Mexico); 1 ♀ Guatemala.
8. *ardens* (Tsch.) — 1 ♂, 1 ♀ Pallatanga (Ecuador); 1 ♂ Azuna (Ecuador); 1 ♂ Bogota.
9. *bidentata* (Sws.) — 1 ♂ Xalapa; 1 ♂, 1 ♂ jun. Duennas (Guatemala).

Genus *Rhamphocelus* Desm. 1805.

1. *brasilius* (L.) — 2 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♂ juv. Brasilien.
2. *dorsalis* Bp. — 1 ♂, 1 ♂ [var.] Brasilien.
3. *jacapa* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Surinam; 1 ♂ Guiana.
4. *unicolor* Scl. — 1 ♂ Porto Cabello.
5. *venezuelensis* Lafr. — 2 ♂, 2 ♀ Porto Cabello; 1 ♀ Caracas.
6. *Luciani* Lafr. — 1 ♂ Ost-Peru.
7. *dimidiatus* Lafr. — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Granada; 1 ♂, 1 ♀ Baranquilla; 1 ♂ jun. Bogota.
8. *Passerini* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Guatemala.
9. *flammigerus* (Jard. et Selby) — 2 ♂ Neu-Granada.
10. *icteronotus* Bp. — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Esmeraldas (Ecuador); 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Phlogothraupis* Scl. 1873.

1. *sanguinolenta* (Less.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ Para.

Genus *Spindalis* Jard. 1837.

1. *nigricephala* (Jameson) — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Thraupis* Boie 1826.

1. *episcopus* (L.) [*Tanagra serioptera* Sws.] — 3 ♂ Cayenne; 1 ♀, 1 jun. Surinam.
2. *glaucocolpa* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 28] — 1 ♂ Caracas.
3. *coelestis* (Spix) — 2 ♂ Peru; 1 ♂ Oberer Amazonen-Strom.
4. *cana* (Sws.) — 1 ♂ Venezuela; 2 ♂ Porto Cabello; 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
5. *diaconus* (Less.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ Costarica; 1 ♂ Guatemala; 1 ♀ Baranquilla (Neu-Granada).
6. *sayaca* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
7. *cyanoptera* (Vieill.) — 1 ♂ Rio-Grande.
8. *ornata* (Sparrm.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Brasilien.
8. *olivascens* (Leht.) — 1 ♂ Surinam; 1 St. Brasilien.
10. *melanoptera* Hartl. — 1 St. Surinam; 1 St. Mexico; 1 St. Bogota.
11. *abbas* (Leht.) [*Tanagra vicarius* Less.] — 3 ♂, 1 ♀ Xalapa.

12. *auricrissa* (Scl.) — 3 ♂ Bogota; 1 ♂ Peru; 1 ♂ jun. Colombien.
13. *Darwini* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Peru; 1 ♂ Calacali (Ecuador).
14. *striata* (Gm.) — 3 ♂ Brasilien; 1 ♀ Rio Grande.
15. *olivicyanea* (Lafr.) — 2 ♂ Caracas.

Genus *Dubusia* (!) Bp. 1850.

1. *taeniata* (Boiss.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Buthraupis* Cab. 1851.

1. *cucullata* (Jard.) — 1 ♂ Peru; 1 ♂ Colombien.
2. *eximia* (Boiss.) — 2 ♂ Colombien; 1 ♂ Bogota.

Genus *Poecilothraupis* Cab. 1851.

1. *lunulata* (Du Bus) — 1 ♂, 1 St. Colombien; 3 ♂ Bogota.

Genus *Iridornis* Less. 1844.

1. *Dubusia* (Bp.) — 2 ♂ Colombien; 2 ♂ Bogota.

Genus *Callispiza* Gray 1840.

1. *tatao* (L.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Guiana.
2. *yeni* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Peru; 1 ♂ Matos (Ecuador).
3. *tricolor* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀, 1 juv. Brasilien.
4. *festiva* (Shaw.) — 2 ♂, 1 juv. Brasilien.
5. *coelicolor* (Scl.) — 1 ♂ Neu-Granada; 2 ♂ Bogota.
6. *cyaneiventris* (Vieill.) [*Tanagra citrinella* Temm.] — 1 ♂ Brasilien.
7. *thoracica* (Temm.) — 2 ♂ Brasilien.
8. *Schranksi* (Spix) — 1 ♂ Rio Napo (Ecuador); 1 ♂ Matos (Ecuador); 2 ♀ Peru.
9. *punctata* (L.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♂ Matos (Ecuador).
10. *guttata* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 26] — 1 ♂, 1 ♀ Roraima-Gebirge. (Guiana); 2 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂, 1 ♀ Caracas.
11. *graminea* (Spix) — 1 ♂ Cayenne.
12. *aurulenta* (Lafr.) — 3 ♂ Bogota; 1 ♂ Ecuador; 1 ♀ Colombien.
13. *Sclateri* (Lafr.) — 1 ♂ Neu-Granada.

14. *pulchra* (Tsch.) — 1 jun. Peru.
15. *Arthusi* (Less.) — 2 St. Caracas.
16. *ritriolina* „Leht.“ Cab.* [Mus. Hein. I. p. 28] — 1 ♂ Columbien;
1 ♂ Puellaro (Ecuador); 4 St. Bogota.
17. *cayana* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂ [var. *minor*] Cayenne;
2 ♀ Cayenne.
18. *flava* (Gm.) — 3 ♂, 2 ♀, 2 ♂ jun., 2 juv. Brasilien.
19. *pretiosa* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 27] — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Rio
Grande do Sul; 1 ♂ Süd-America.
20. *cyanoptera* (Sws.) — 2 ♂, 1 ♀ Columbien; 1 ♂, 1 ♂ jun. Neu-
Granada.
21. *gyrola* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Guiana.
22. *gyroloides* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Neu-Granada; 2 ♂ Bogota;
1 ♀ Rio Napo (Ecuador).
23. *Desmaresti* Gray — 1 ♂ Venezuela.
24. *brasiliensis* (L.) — 3 ♂, 1 ♀, 1 jun. Bahia.
25. *flaviventris* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.
26. *boliviana* (Bp.) — 1 ♂ Ucayali.
27. *ruficervix* (Prév.) — 1 ♂ Bogota; 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
28. *atricapilla* (Lafr.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Caracas; 1 ♀
[*Procnias Heinei* Cab.* Mus. Hein. I. p.
31] Columbien.
29. *nigroviridis* (Lafr.) — 3 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Columbien.
30. *cyanescens* (Scl.) — 2 ♂ Caracas.
31. *lavrata* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico.
32. *nigricincta* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 juv. Bogota.
33. *cyaneicollis* (Lafr. et d'Orb.) — 2 ♂ Neu-Granada; 3 ♂ Bogota;
1 ♀ Esmeraldas (Ecuador).
34. *Hammahiae* (Cass.) — 1 ♂ Neu-Granada.
35. *labradorides* (Boiss.) — 2 ♂ Bogota.
36. *rufigenis* (Scl.) — 1 ♂, 1 jun. Caracas.
37. *Parzudakii* (Lafr.) — 2 ♂ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada.
38. *venusta* (Scl.) — 2 St. Bogota.

Genus *Chlorochrysa* Bp. 1851.

1. *calliparea* (Tsch.) — 1 ♂ Matos (Ecuador).

Subfam. Euphoninae.

Genus *Pipridea* Sws. 1827.

1. *melanonota* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Diva* Scl. 1854.

1. *Vassori* (Boiss.) — 1 ♂ Columbien; 1 ♂ Peru; 1 ♂, 2 jun. Bogota.

Genus *Procnias* Ill. 1811.

1. *tersa* (L.) — 2 ♂, 2 ♀, 1 ♀ [var. *minor*] Brasilien.
2. *occidentalis* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Neu-Granada.

Genus *Triglyphidia* Rehb. 1850.

1. *viridis* (Vieill.) — 2 St. Brasilien.
2. *longipennis* (Du Bus) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
3. *frontalis* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♀ Caracas.
4. *Pretrei* (Lafr.) — 1 ♀ Bogota.
5. *occipitalis* (Du Bus) — 1 ♀ Mexico.

Genus *Euphona* Desm. 1805.

1. *elegantissima* (Bp.) — 1 ♂, 2 ♀ Mexico.
2. *nigricollis* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♂ Puellaro (Ecuador);
1 ♂ Bogota; 1 ♂ Caracas.

Genus *Acroleptes* Bp. 1854.

1. *minutus* (Cab.) — 1 ♂ Bogota.
2. *concinus* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Bogota.
3. *affinis* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Costa Rica.
4. *violaceicollis* Cab. — 1 ♂ jun. Brasilien.
5. *serrirostris* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♀ Bolivien.
6. *xanthogaster* (Sund.) — 3 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien.

7. *brevirostris* (Bp.) — 1 St. Neu-Granada.

8. *ruficeps* (Lafir. et d'Orb.) — 1 St. Columbien.

Genus *Hypophaea* Bp. 1854.

1. *chalybea* (Mikan) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Phonasca* Cab. 1860.

1. *violacea* (L.) — 4 ♂, 1 ♀ Bahia.

2. *crassirostris* (Scl.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Bogota; 1 ♂ jun.
Columbien; 1 ♀ Venezuela.

3. *brachyptera* Cab. — 1 ♂ juv. Caracas.

4. *melanura* (Scl.) — 1 ♂ Barra do Rio Negro.

Genus *Iliolopha* Bp. 1854.

1. *cayana* (L.) — 1 St. Cayenne.

2. *pectoralis* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).

3. *Gouldi* (Scl.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ juv. Guatemala.

Fam. Sylviadae.

Subfam. Accentorinae.

Genus *Accentor* Behst. 1802.

1. *alpinus* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Schweiz.

Genus *Tharrhaleus* Kaup 1829.

1. *modularis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Pommern; 1 ♂ jun. Harz.
2. *strophiatius* (Hodgs.) — 1 ♂ Himalaya.
3. *montanellus* (Pall.) — 1 ♂ Amur.

Genus *Ephthianura* Gould 1837.

1. *albifrons* (Jard. et Selby) — 1 ♂ Süd-Australien; 2 ♂, 1 ♀ Australien.
2. *aurifrons* Gould — 1 ♂ Australien.

Subfam. Sylvianae.

Genus *Geobasileus* Cab. 1850.

1. *chrysorrhous* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Phyllopneuste* Meyer 1831.

1. *sibilatrix* (Behst.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 juv. Harz.
2. *trochilus* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 1 St. [*Ph. Eversmanni* Bp.] Kasan.
3. *tristis* (Blyth) — 1 ♂ Etawah (Himalaya).
4. *rufa* (Behst.) — 2 ♂ Pommern; 1 ♀, 1 ♂ jun. Harz; 1 ♀ Smyrna.
5. *Bonellii* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♀ Süd-Frankreich; 1 juv. Attica; 1 ♂ Nordost-Africa.
6. *borealis* Blas. — 1 ♂ Sibirien; 1 ♂ Kultuk (Baikal-See); 1 St. [*S. silvicultrix* Swinh.] Amoy.

Genus *Phyllobasileus* Cab. 1850.

1. *calendula* (L.) — 2 ♂ Nord-America.
2. *superciliosus* (Gm.) — 1 ♂ Mark; 1 ♂ Amur; 1 ♀ Amoy.
3. *proregulus* (Pall.) — 1 ♂ Kultuk (Baikal-See).

Genus *Regulus* Cuv. 1800.

1. *cristatus* Koch — 4 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *satrapa* Leht. — 2 ♂ Nord-America.
3. *ignicapillus* (Temm.) — 1 ♂ Sachsen; 2 ♀ Harz.

Genus *Acanthiza* Vig. et Horsf. 1825.

1. *diemenensis* Gould — 1 ♂ Australien; 1 ♀ Vandiemensland.
2. *reguloides* Vig. et Horsf. — 1 St. Süd-Australien.
3. *wropygialis* Gould — 1 St. Australien.

Genus *Pyrrholaemus* Gould 1840.

1. *brunneus* Gould — 1 ♂ West-Australien.

Genus *Origma* Gould 1837.

1. *rubricata* (Lath.) — 1 ♂ Australien.

Genus *Sericornis* Gould 1837.

1. *humilis* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Australien.
2. *osculans* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Australien.
3. *citreigularis* Gould — 1 ♂ Australien.

Genus *Culicivora* Sws. 1827.

1. *caerulea* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa; 1 ♀ Nord-America.
2. *dumicola* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.
3. *mexicana* (Bp.) — 1 ♂ Mexico.
4. *bilineata* (Bp.) — 1 ♂ Esmeraldas (Ecuador).

Genus *Melizophilus* Leach 1816.

1. *provincialis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Europa.
2. *melanocephalus* (Gm.) — 1 ♂ Spanien; 1 ♂, 3 ♀ Griechenland.
3. *mystaceus* (Ménétr.) [*nigricapillus* Cab.* Mus. Hein. I. p. 35] —
1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
4. *sardus* (Marm.) — 1 ♂, 1 ♀ Italien.

Genus *Sylvia* Scop. 1769.

1. *cinerea* Behst. — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Griechenland.
2. *affinis* Blyth — 1 St. Sirinagur (Ostindien).
3. *nisoria* (Behst.) — 1 ♂ Griechenland; 1 ♀ Harz.
4. *subalpina* Bonelli — 4 ♂, 1 ♀ Süd-Europa.
5. *conspicillata* Marm. — 2 ♂ Süd-Frankreich; 1 ♀ Italien.
6. *curruca* (L.) — 1 ♂ Harz; 1 ♂, 1 ♀ Griechenland; 1 ♂ jun.,
1 juv. Smyrna.
7. *orphea* Temm. — 2 ♂ Süd-Europa.

Genus *Epilais* Kaup 1829.

1. *atricapilla* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Smyrna.
2. *hortensis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Hiddensee (Pommern).
3. *Rüppelli* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Smyrna.

Subfam. Calamoherpinae.

Genus *Hypolais* Brehm 1828.

1. *icterina* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Halle; 1 ♂ Sardinien.
2. *pallida* (Hempr. et Ehr.) [*Salicaria elaeica* Linderm.] — 1 ♂,
1 ♀ Griechenland; 1 ♂ Attica; 1 St.
Süd-Europa; 1 ♂ Wadi-Arab (Nubien);
2 St. Nordost-Africa.
3. *polyglotta* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Marocco; 1 ♂, 1 ♀ Algier; 1 ♀
Süd-Frankreich.
4. *olivetorum* (Strickl.) — 1 ♂ Griechenland; 1 ♂ Syrien; 1 juv.
Attica.
5. *opaca* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Valencia; 1 ♂ Algier.

Genus *Iduna* Keys. et Blas. 1844.

1. *caligata* (Leht.) — 1 St. Kasan; 2 ♂ Etawah (Himalaya).

Genus *Acrocephalus* Naum. 1811.

1. *arundinaceus* (L.) — 2 ♂ Harz; 2 ♂, 1 jun. Galizien.
2. *orientalis* (Temm. et Schleg.) — 1 ♂ Amoy; 1 ♂ Johore (Malacca).
3. *stentoreus* (Hempr. et Ehr.) — 1 St. [*A. brunnescens* Jerd.]
Arabien; 1 St. Java; 1 St. Borneo.
4. *longirostris* (Gould) — 1 St. West-Australien.
5. *fasciolatus* Gray — 1 St. Morty-Insel.
6. *streperus* (Vieill.) [*M. salicaria* L. ?, *M. arundinacea* Gm.] —
1 ♂ Halle; 1 ♂ Berbera (Somali-Land);
1 ♀ Sarepta; 1 ♂ [*C. hydrophilus* Brehm] Thü-
ringen; 1 ♂ [*C. piscinarum* Brehm] Thüringen.
7. *palustris* (Bechst.) — 1 ♂ Muddelsee (Pommern).

Genus *Locustella* Kaup 1829.

1. *naevia* (Bodd.) [*L. Rayi* Gould] — 1 ♂, 1 ♀ Europa; 1 ♂ Süd-
Frankreich; 1 jun. Galizien.
2. *fluviatilis* (Meyer et Wolf) — 2 ♂ Europa; 1 ♂ Galizien.
3. *luscinioides* (Savi) — 1 ♂, 1 ♀ Holland; 1 ♂ Galizien.

Genus *Calamodus* Kaup 1829.

1. *schoenobaenus* (L.) — 2 ♂, 1 juv. Europa; 1 ♂ Galizien.
2. *aquaticus* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Europa; 1 ♀ juv. Syrien.

Genus *Luscinola* Gray 1841.

1. *melanopogon* (Temm.) — 1 ♂ Italien.
2. *fuscata* (Blyth) — 1 ♂ Sibirien.

Genus *Ptenoedus* Cab. 1850.

1. *rufescens* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-
Australien.
2. *cruralis* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Agrobates* Sws. 1837.

1. *galactodes* (Temm.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 St. [var. *minor pallidior*]
Egypten; 1 ♂ [*Agrobates rufus* Brehm]
Spanien; 1 ♂ Griechenland.
2. *minor* (Cab.)* [Mus. Hein. I. p. 39] — 1 ♂ Abessinien.
3. *familiaris* (Ménétr.) — 1 ♂, 1 ♀ Griechenland.

Genus *Thamnobia* Sws. 1831.

1. *fulicata* (L.) — 1 ♂ Ost-Indien; 1 jun. Java.
2. *coryphaea* (Gray) — 1 ♂ Süd-Africa.
3. *cambayensis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Belaspoor (Ostindien).
4. *paena* (Smith) — 1 St. Kaffernland.

Genus *Cercotrichas* Boie 1831.

1. *erythroptera* (Gm.) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♀ Chartum; 1 ♂, 1 ♀
Nubien.
2. *luctuosa* (Lafr.) — 1 St. Egypten.

Subfam. Malurinae.

Genus *Malurus* Vieill. 1816.

1. *cyaneus* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Australien; 1 ♂ Darling
(Neu-Süd-Wales); 1 ♀ West-Australien.
2. *splendens* (Quoy et Gaim.) — 2 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *elegans* Gould — 2 ♂ West-Australien.
4. *melanotus* Gould — 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♂ Darling (Neu-
Süd-Wales).
5. *Lamberti* Vig. et Horsf. — 3 ♂ Australien.
6. *melanocephalus* Vig. et Horsf. — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv.
Australien.

Genus *Stipiturus* Less. 1831.

1. *malachurus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Sphemura* Leht. 1823.

1. *brachyptera* (Lath.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.

Genus *Sphenocacus* Strickl. 1841.

1. *africanus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♀ Cap.
2. *punctatus* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Poodytes* Cab. 1850.

1. *gramineus* (Gould) — 1 ♂ West-Australien.

Genus *Calamanthus* Gould 1837.

1. *fuliginosus* (Vig. et Horsf.) — 1 St. Van Diemensland; 1 ♀ [var.] Australien.

Genus *Bradypterus* Sws. 1837.

1. *cetti* (Marm.) — 3 ♂, 1 ♀ Italien.
2. *brachypterus* (Vieill.) — 1 St. Süd-Africa.
3. *canturians* (Swinh.) — 1 ♂ West-Formosa.

Genus *Drymoecca* Sws. 1827.

1. *macroura* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♀ Natal.
2. *pallida* Smith — 1 St. Kaffernland.
3. *gracilis* (Rüpp.) — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂ Senegal.
4. *clamans* Rüpp. — 1 St. Nordost-Africa.
5. *thoracica* (Shaw) — 1 St. Süd-Africa.
6. *mystacea* Rüpp. — 1 St. Chartum.
7. *Strangei* Fras. — 1 St. West-Africa.

Genus *Hemipteryx* Sws. 1837.

1. *textrix* (Vieill.) — 1 St. Cap.

Genus *Cisticola* Less. 1831.

1. *schoenicola* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Italien; 2 St. Süd-Frankreich;
1 St. Süd-Europa; 2 St. Nordost-Africa.
2. *lugubris* (Rüpp.) — 1 St. Abessinien.

3. *Levaillanti* (Smith) — 1 ♂ Süd-Africa.
4. *ruficeps* (Rüpp.) — 1 ♀ Sennaar.
5. *cursitans* (Frankl.) — 1 St. Sunda-Inseln; 1 St. Java; 1 St. West-Africa.

Genus *Hylia* Cass. 1859.

1. *superciliaris* (Temm.) — 1 St. Camma (West-Africa).

Genus *Oligura* Rüpp. 1845.

1. *rufescens* (Vieill.) — 1 St. Süd-Africa.
2. *microua* Rüpp. — 1 ♀ Blauer Fluss; 1 ♀ Sennaar.

Genus *Eremomela* Sund. 1850.

1. *elegans* (v. Heugl.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Orthotomus* Horsf. 1820.

1. *edela* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *sepium* Horsf. — 1 ♂, 1 jun. Java.
3. *longicauda* (Gm.) — 1 St. Ost-Indien.

Genus *Daseocharis* Cab. 1850.

1. *familiaris* (Horsf.) — 1 ♂ Java; 2 St. Sunda-Inseln.

Genus *Drymoipus* Bp. 1854.

1. *latrunculus* (Temm.) — 1 St. Borneo.
2. *Blythi* (Bp.) — 1 St. Java.
3. *polychrous* (Temm.) — 1 St. Bengalen; 1 St. Java.
4. *inornatus* (Sykes) — 1 St. Kangra (Ostindien).

Genus *Decurus* Hodgs. 1841.

1. *fuliginosus* Hodgs. — 1 St. Nepal.
2. *atrogularis* (Moore) — 1 St. Darjeeling.

Genus *Megalurus* Horsf. 1820.

1. *palustris* Horsf. — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 St. Sunda-Inseln.
-

Fam. Hirundinidae.

Genus *Hirundo* L. 1735.

1. *rustica* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. [var. *alba*] Harz.
2. *gutturalis* Scop. — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Java.
3. *Riocouri* Sav. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Cairo; 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Nordost-Africa.
4. *rufa* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂ Brasilien.
5. *javanica* Sparrm. — 2 ♂ Sunda-Inseln.
6. *neoxena* Gould — 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♂ juv. West-Australien.
7. *ruficeps* Leht. — 1 ♂, 1 ♀ Nubien; 1 ♂ jun., 1 juv. Nordost-Africa.
8. *filifera* Steph. — 1 ♂ Ost-Indien.

Genus *Cecropis* Boie 1826.

1. *capensis* (Gm.) — 1 St. Süd-Africa.
2. *daurica* (L.) — 1 St. Sunda-Inseln.
3. *rufula* (Temm.) — 1 ♂ Aidin (Klein-Asien).
4. *senegalensis* (L.) — 1 St. Senegal; 1 ♂ Cordofan.

Genus *Atticora* Boie 1844.

1. *fasciata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
1. *cyanoleuca* (Vieill.) — 1 ♂, 2 St. Brasilien.

Genus *Petrochelidon* Cab. 1850.

1. *nigricans* (Vieill.) — 1 St. Australien; 2 St. West-Australien.
2. *melanogastra* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 St. Champlain-See.

3. *lunifrons* (Say) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
4. *fulva* (Vieill.) — 1 St. Cuba.
5. *leucoptera* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne.
6. *leucorrhoea* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
7. *Meyeni* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 48] — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Pygochelidon* Baird 1865.

1. *cinerea* (Gm.) — 1 ♀ Quito.

Genus *Tachycineta* Cab. 1850.

1. *thalassina* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
2. *bicolor* (Vieill.) — 1 St. Cuba.

Genus *Psalidoprocne* Cab. 1850.

1. *cypselina* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 48] — 1 St. Süd-Africa.
2. *velox* (Vieill.) — 1 St. Süd-Africa.

Genus *Cheramoecca* Cab. 1850.

1. *leucosterna* (Gould) — 1 ad., 1 jun. West-Australien.

Genus *Cotyle* Boie 1822.

1. *riparia* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Darsin (Pommern); 1 St. Braunschweig.
2. *palustris* (Steph.) — 1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
3. *minor* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 49] — 1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
4. *serripennis* (Aud.) — 1 St. Nord-America.
5. *fucata* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Paraguay.
6. *flavigastra* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
7. *uropygialis* (Lawr.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
8. *fuligula* (Lcht.) — 1 St. Süd-Africa.
9. *rupestris* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♀ Pyrenäen.
10. *obsoleta* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 50] — 1 ♂ West-Africa; 1 ♀ Nordost-Africa; 1 pull. Nubien.

Genus *Progne* Boie 1826.

1. *purpurea* (L.) — 1 ♂ Cuba; 1 ♂, 1 juv. Nord-America; 1 juv. Brasilien.

2. *chalybea* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂ Guiana.
3. *dominicensis* (Gm.) — 2 St. Brasilien.
4. *domestica* (Vieill.) — 1 St. Rio Grande.
5. *tapera* (L.) — 1 ♂ Brasilien.
6. *fusca* (Vieill.) — 1 St. Rio-Grande.

Genus *Chelidon* Boie 1822.

1. *urbica* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. [var. *alba*] Harz.

Fam. Muscicapidae.

Subfam. Muscicapinae.

Genus *Muscicapa* Briss. 1760.

1. *atricapilla* L. — 3 ♂, 3 ♀ Harz.
2. *collaris* Behst. — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 2 ♂. 2 ♀, 1 pull.
Galizien.

Genus *Xanthopygia* Blyth. 1847.

1. *narcissina* (Temm.) — 1 ♂ Amur.

Genus *Hemichelidon* Hodgs. 1845.

1. *sibirica* (Gm.) — 1 St. Sumatra.

Genus *Hemipus* Hodg. 1845.

1. *picatus* (Sykes) — 1 St. Nepal.

Genus *Butalis* Boie 1826.

1. *grisola* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 St. Egypten.
2. *griseosticta* (Swinh.) — 1 St. Amoy; 1 ♀ Morty-Insel.

Genus *Microeca* Gould 1840.

1. *assimilis* Gould — 1 ♀ West-Australien.
2. *fascicans* (Lath.) — 1 St. Australien.
3. *flavovirescens* Gray — 1 St. Mysol.

Genus *Alseonax* Cab. 1850.

1. *adustus* (Boie) [*Muscicapa undulata* Vieill.] — 1 St. Süd-Africa.
2. *latirostris* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien; 1 ♂ Java.
3. *rufescens* Jerd. — 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♂ Java.

Genus *Erythrosterina* Bp. 1838.

1. *parva* (Behst.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun.,
2 adolesc., 2 juv. Galizien.
2. *albicilla* (Pall.) [*Muscicapa leucura* Sws.] — 2 ♀ Nepal.

Genus *Muscicapula* Blyth 1843.

1. *maculata* (Tick.) — 1 St. Nepal.

Genus *Glaucomyias* Cab. 1850.

1. *melanops* (Vig.) — 1 ♂, 1 St. Sumatra.

Genus *Eumyias* Cab. 1850.

1. *indigo* (Horsf.) — 3 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Dimorpha* Hodg. 1841 [*Siphia (?)* Hodg. 1837].

1. *hyacinthina* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Timor.

2. *rubeculoides* (Vig.) — 1 St. Himalaya; 1 St. Ostindien.
3. *elegans* (Temm.) — 1 St. Sumatra.
4. *banyumas* (Horsf.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Java.
5. *Tickelliae* (Blyth) — 1 ♂ Siam.

Genus *Xenogenys* Cab. 1850.

1. *azurea* (Temm.) — 2 ♂, 1 juv. Java.

Genus *Prosorinia* Hodgs. 1841 [*Cochoa* (!) Hodgs. 1836].

1. *purpurea* Hodgs. — 2 St. Nepal.

Genus *Chaitaris* Hodgs. 1841 [*Niltava* (!) Hodgs. 1837].

1. *grandis* (Blyth) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Nepal.
2. *sundara* Hodgs. — 1 ♂ Nepal; 1 ♀, 1 ♂ juv. Ostindien.

Genus *Melanopepla* Cab. 1850.

1. *atronitens* (Lcht.) — 1 St. Kaffernland.

Genus *Melaenornis* Gray 1840.

1. *edolioides* (Sws.) — 1 St. Abessinien.

Subfam. Bombycillinae.

Genus *Myiadestes* Sws. 1838.

1. *obscurus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
2. *ralloides* (Lafr. et d'Orb.) [*M. griseiventer* Cab.] — 1 St. Bogota.
3. *solitarius* Baird — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Ptilogonyx* Sws. 1824.

1. *cinereus* Sws. — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.

Genus *Phainopepla* Sel. 1858.

1. *nitens* (Sws.) — 2 ♂ Mexico.

Genus *Bombycilla* Vieill. 1807.

1. *garrula* (L.) — 2 ♂, 4 ♀ Harz.
2. *cedrorum* Vieill. — 1 ♂ Nord-America; 2 ♂, 2 ♀ Mexico.

Subfam. **Myiagrinae.**

Genus *Cryptolopha* Sws. 1837.

1. *Burki* (Burt.) — 1 ♂, 1 St. Java.

Genus *Culicicapa* Swinh. 1871.

1. *ceylonensis* (Sws.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♂ Nepal; 1 ♂ Java;
1 St. Chamba (Ostindien).

Genus *Hypothymis* Boie 1826.

1. *azurea* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Himalaya; 1 ♂, 1 ♀ [*Muscicapa occipitalis* Vig.] Sumatra; 1 ♀ juv. Java.
2. *puella* (Wall.) — 1 ♂ Sula-Inseln.

Genus *Myiagra* Vig. et Horsf. 1826.

1. *rubecula* (Lath.) — 2 ♀, 1 ♂ juv. Australien.
2. *latirostris* Gould — 1. St. Timor.
3. *galeata* Gray — 1 ♂ Ceram.

Genus *Philentoma* Eyton 1845.

1. *velata* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca; 1 ♂ Sumatra.
2. *pyrrhoptera* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra; 1 ♂, 1 ♀ Borneo.

Genus *Monarcha* Vig. et Horsf. 1826.

1. *melanopsis* (Vieill.) — 1 ♂ Australien.

2. *inornata* (Garn.) — 1 St. Amboina.
3. *nigrimentum* Gray — 1 ♀ Amboina.

Genus *Piezorhynchus* Gould 1840.

1. *aruensis* Salvad. — 1 ♂ Neu-Guinea.
2. *alecto* (Temm.) — 1 ♂ Ternate.
3. *Gouldi* (Gray) — 1 ♂ Australien.
4. *bimaculatus* (Gray) — 1 ♂ Gilolo.

Genus *Arses* Less. 1831.

1. *telescopthalmus* (Garn.) — 1 ♂ Waigiou; 1 ♀ Mysol.

Genus *Todopsis* Bp. 1854.

1. *cianocephala* (Qu. et Gaim.) — 2 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Seisura* Vig. et Horsf. 1826.

1. *inquieta* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Sauloprocta* Cab. 1850.

1. *melanoleuca* (Qu. et Gaim.) — 1 St. West-Australien; 1 St. Ternate; 1 ♂ Waigiou.

Genus *Leucocerca* Sws. 1838.

1. *javanica* (Sparrm.) — 1 ♂, 1 St. Java; 1 ♂ Johore (Malacca).
2. *perlata* (S. Müll.) [*L. rhombifer* Cab.* Mus. Hein. I. p. 57] —
1 ♂ Sunda-Inseln.
3. *albicollis* (Vieill.) — 1 jun. Ostindien.

Genus *Rhipidura* Vig. et Horsf. 1825.

1. *Preissi* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 57] — 2 St. West-Australien.
2. *rufiventris* (Vieill.) — 1 ♂ Timor.
3. *assimilis* Gray — 1 ♀ Matabello (Banda-Gruppe).
4. *setosa* (Qu. et Gaim.) — 1 St. Mysol.

5. *maculipectus* Gray — 1 ♂ Neu-Guinea.
6. *semicollaris* Müll. et Schleg. — 1 ♂ Timor.
7. *phoenicura* Müll. et Schleg. — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ Amboina;
1 ♀ Oceanien (?).

Genus *Neomyias* Sharpe 1879.

1. *euryura* (S. Müll.) — 1 ♂ Tapor (Java).

Genus *Trochocercus* Cab. 1850.

1. *cyanomelas* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Süd-Africa.

Genus *Terpsiphone* Glog. 1827.

1. *paradisi* (L.) — 2 ♀, 1 ♂ jun. Ostindien.
2. *affinis* (Hay, Blyth) — 1 ♂, 1 ♀ Borneo; 1 ♂ Malacca.
3. *cristata* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♂ juv. Süd-Africa;
1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. [*M. melanogastra* Sws.]
Senegal; 1 ♂ West-Africa; 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂
jun. [*T. Ferreti* Guérin] Abessinien.
4. *borbonica* (Gm.) — 1 ♂ Insel Bourbon.
5. *tricolor* (Fras.) — 1 St. Gabun.
6. *princeps* (Temm.) — 1 St. Amoy.
7. *atrochalybea* (Thoms.) — 1 St. Insel S. Thomé.

Genus *Bias* Less. 1831.

1. *musicus* (Vieill.) — 1 ♀ Gabun.

Genus *Batis* Boie 1833.

1. *capensis* (L.) — 1 ♀ Kaffernland.
2. *pririt* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
3. *senegalensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Senegal.

Genus *Platystira* Jard. et Selby 1830.

1. *cyanea* (S. Müll.) — 2 ♂ West-Africa; 1 ♀ Senegal.

Genus *Stenostira* Cab. et Bp. 1850.

1. *plumbea* Hartl. — 1 ♂ West-Africa.

Fam. Laniidae.

Subfam. Vireoninae.

Genus *Vireo* Vieill. 1807.

1. *noveboracensis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ Florida.
2. *Huttoni* Cass. — 1 ♂ Mexico.
3. *Belli* Aud. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Vireolanus* Du Bus 1850.

1. *pulchellus* Scl. et Salv. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Phyllomanes* Cab. 1847.

1. *olivaceus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *flavoviridis* (Cass.) — 1 ♂, 1 St. Guatemala.
3. *gilvus* (Vieill.) — 1 ♀ Oaxaca.
4. *Josephae* (Scl.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
5. *flavifrons* (Vieill.) — 1 ♂ Mexico.
6. *solitarius* (Wils.) — 1 St. Mexico.
7. *chivi* (Vieill.) — 1 ♂, 4 St. Brasilien.

Genus *Hylophilus* Temm. 1823.

1. *poecilotis* (Wied) — 3 St. Brasilien.

2. *ochraceiceps* Scl. — 1 St. Mexico; 1 St. Guatemala.
3. *decurtatus* (Bp.) — 1 St. Guatemala.

Genus *Cyclorhis* Sws. 1824.

1. *guianensis* (Gm.) — 1 St. Brasilien; 1 St. Caracas; 1 St. Venezuela.
2. *flavipectus* Scl. — 2 St. Caracas.
3. *flaviventris* Lafr. — 2 St. Xalapa; 1 St. Duennas (Guatemala).
4. *ochrocephala* Tsch. — 1 St. Brasilien.
5. *viridis* (Vieill.) — 1 ♂ Süd-Brasilien; 1 ♀ Paraguay.
6. *nigrirostris* Lafr. — 1 St. Neu-Granada.
7. *virenticeps* Scl. — 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).
8. *subflavescens* Cab. — 1 St. Costa Rica.

Subfam. Pachycephalinae.

Genus *Hyloterpe* Cab. 1847.

1. *philomela* Boie — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ Sumatra.
2. *orpheus* Verr. — 1 ♂ Coupang (Timor).
3. *sulfuriventris* Wald. — 1 St. Celebes.

Genus *Pachycephala* Sws. 1826.

1. *rufiventris* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien; 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
2. *gutturalis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. West-Australien; 1 St. Schwanenfluss.
3. *melanura* Gould — 1 ♂ Australien; 1 ♂ Ternate; 1 ♀ Gilolo.
4. *griseiceps* Gray — 1 St. Mysol; 1 St. Waigiou.
5. *glaucura* Gould — 1 ♂ Australien.
6. *griseonota* Gray — 1 St. Mysol.
7. *callope* Müll. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Timor.
8. *olivacea* Vig. et Horsf. — 1 St. Van Diemensland.
9. *macrorhyncha* Strickl. — 1 ♂ Amboina.

Genus *Eopsaltria* Sws. 1831.

1. *australis* (Lath.) — 2 ♂ Australien.

2. *griseogularis* Gould — 1 St. West-Australien.

Genus *Falcunculus* Vieill. 1816.

1. *frontatus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Australien.

2. *Gouldi* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 66] — 2 St. Port Philipp (Victoria).

Genus *Pnigocichla* Cab. 1850.

1. *harmonica* (Lath.) — 1 St. Australien; 1 St. Murray (Süd-Australien).

2. *rufogastra* (Gould) — 1 ♂ Ost-Australien.

Genus *Oreoica* Gould 1837.

1. *cristata* (Lewin) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Australien.

Genus *Bulestes* Cab. 1850.

1. *torquatus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Port Albert (Gippsland);
4 ♀ Australien.

2. *leucopterus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Cracticus* Vieill. 1816.

1. *robustus* (Lath.) — 1 juv. Neu Süd-Wales.

2. *cassicus* (Bodd.) — 2 St. Neu-Guinea.

Genus *Pityriasis* Less. 1837.

1. *gymnocephala* (Temm.) — 1 ♀ Sarawak (Borneo).

Subfam. **Malaconotinae.**

Genus *Myiolestes* Cab. 1850.

1. *obscurus* (Horsf.) — 1 ♂ Borneo; 2 ♀ Java; 1 ♀ Johore.

Genus *Colluricincla* Vig. et Horsf. 1826.

1. *megarrhyncha* (Qu. et Gaim.) — 1 St. Neu-Guinea; 1 St. Mysol.

Genus *Tephrodornis* Sws. 1831.

1. *gularis* (Raffl.) — 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♀ Java; 1 ♂ Johore.
2. *pondiceriana* (Gm.) — 1 St. Ostindien.
3. *superciliosa* Sws. — 1 St., 1 juv. Java.
4. *sylvicola* Jerd. — 1 ♀ Malacca.

Genus *Fraseria* (!) Bp. 1854.

1. *ocrea* (Strickl.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Sigmodus* Temm. 1850.

1. *caniceps* Temm., Bp. — 1 ♂ Guinea.

Genus *Prionops* Vieill. 1816.

1. *plumatus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ West-Africa; 2 ♂, 1 ♀ Senegal.
2. *poliocephalus* (Stanl.) — 1 ♂, 2 ♀ Abessinien.
3. *talacoma* Smith — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Chaumonotus* Gray 1837.

1. *Sabinei* (Gray) — 1 ♂ Gold-Küste.

Genus *Spasornis* v. d. Hoeven 1856 [*Vanga* (!) Vieill. 1816].

1. *curvirostris* (Gm.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Dryoscopus* Boie 1826.

1. *cubla* (Shaw) — 2 ♂, 1 ♀ Port Natal; 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Süd-Africa.
2. *gambensis* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Senegal.

Genus *Rhynchastatus* Bp. 1853.

1. *carbonarius* (Cass.) — 1 ♀ Gabun.

Genus *Sigelus* Cab. 1850.

1. *silens* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Malaconotus* Sws. 1824.

1. *barbarus* (L.) — 2 ♂ Senegal.
2. *cruentus* (Hempr. et Ehr.) — 1 ♂ Abessinien.
3. *atrococcineus* (Burch.) — 1 ♂ Senegal.
4. *erythrogaster* (Rüpp.) — 1 ♂ Nilquellen.
5. *aethiopicus* (Gm.) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♀ Cordofan.
6. *boulboul* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland; 1 ♂ Port Natal; 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Nicator* Hartl. et Finsch 1870.

1. *chloris* (Val.) — 1 ♂ Guinea; 1 ♀ West-Africa.

Genus *Telephonus* Sws. 1831.

1. *baobakiri* (Shaw) — 4 ♂, 1 ♂ jun. Cap.
2. *gutturalis* (Daud.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun. Port Natal.

Genus *Chlorophoneus* Cab. 1850.

1. *rubiginosus* (Sund.) — 1 ♂ Port Natal; 1 St. Kaffernland.
2. *olivaceus* (Shaw) — 1 St. Port Natal.
3. *sulfureipectus* (Less.) [*Malaconotus similis* Smith] — 1 ♂ Port Natal; 1 ♂ West-Africa.

Genus *Archolestes* Cab. 1850.

1. *olivaceus* (Vieill.) [*Lanius icterus* Cuv.] — 2 St. Senegal; 1 St. Algoa-Bay; 1 ♂ [*Malaconotus hypopyrrhus* Hartl.] Port Natal.

Genus *Pomatorhynchus* Boie 1826.

1. *erythropterus* (Shaw) — 2 ♂, 1 ♀ Port Natal; 1 ♂ [*Lanius senegalus* L.] Senegal; 1 ♂, 1 ♀ [*Lanius cucullatus* Temm.] Nord-Africa.
2. *remigialis* (Hartl. et Finsch) — 1 ♂ Blauer Fluss (Sennaar); 1 ♂ Keren (Abessinien).
3. *trivirgatus* (Smith) — 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Harpolestes* Cab. 1850.

1. *longirostris* (Sws.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Pteruthius* Sws. 1831.

1. *erythropterus* (Vig.) — 1 ♂ Nepal.
2. *flaviscapis* (Temm.) — 2 St. Java.

Genus *Nilaus* Sws. 1827.

1. *brubru* (Lath.) — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂ Sennaar; 1 ♀ Senegal.

Subfam. Laniinae.

Genus *Laniellus* Sws. 1831.

1. *leucogrammicus* (Reinw.) — 1 ♂, 1 St. Java.

Genus *Enneoctonus* Boie 1826.

1. *collurio* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., 1 Nest mit 6 Jungen, Harz; 1 ♂ Egypten; 1 ♀ jun. Keren (Abessinien).
2. *cristatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♀ Nepal.
3. *isabellinus* (Ehr.) — 1 ♂, 1 ♀ Arabien; 1 ♂ Chartum.
4. *superciliosus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ jun., 1 ♀ Malacca.
5. *magnirostris* (Less.) — 1 ♂, 2 ♀, 2 ♂ juv., 1 ♀ jun. Java; 1 ♂ jun. Padang (Sumatra).
6. *brachyurus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Japan.
7. *senator* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂, 1 ♂ juv. [*E. badius* Hartl.] Bona (Algier); 1 ♂ [*L. rutilans* Temm.] Senegal.
8. *minor* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♀ Harz.

Genus *Leucometopon* Bp. 1853.

1. *nubicum* (Leht.) — 1 ♂, 1 juv. Nubien; 1 ♂, 1 ♂ jun. Cordofan.

Genus *Lanius* L. 1758.

1. *excubitor* L. — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 1 ♂ Krim.
2. *major* Pall. — 1 ♂ Wolga.
3. *Homeyeri* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Wolga.
4. *leuconotus* Br. [*L. lathora* Sykes] — 2 ♂ Nordost-Africa; 1 ♀
Keren (Abessinien).
5. *algeriensis* Less. — 1 ♂ Algier; 1 ♂ Marocco.
6. *meridionalis* Temm. — 1 ♂ Spanien.
7. *ludovicianus* L. — 1 ♂ Nord-America.
8. *excubitoroides* Sws. — 1 ♂ Californien; 1 ♂ Oaxaca (Mexico);
1 ♀ Mexico.
9. *collaris* L. — 3 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Süd-Africa; 1 ♂ jun. Cap.
10. *humeralis* Stanl. [*L. fuscus* Cab.* Mus. Hein. I. p. 74] — 1 ♂
Abessinien; 1 ♀ Nubien.
11. *erythronotus* (Vig.) — 1 ♂ Ostindien.
12. *bentet* Horsf. — 4 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 pull. Java.
13. *nigriceps* (Frankl.) — 1 ♂ Bengalen; 1 ♂ Nepal; 1 ♂ jun.
Luzon.
14. *schach* L. — 1 ♂ China.
15. *tephronotus* (Vig.) — 1 ♂ Bengalen; 1 ♀ Nepal.

Genus *Urolestes* Cab. 1850.

1. *melanoleucus* (Smith) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♀ Cap.

Genus *Corvinella* Less. 1831.

1. *corvina* (Shaw) — 1 ♂, 1 St. Senegal.

Fam. Liotrichidae.

Subfam. Napodinae.

Genus *Drymocataphus* Blyth 1849.

1. *capistratus* (Temm.) — 1 ♂, 1 St. Java.
2. *capistratoides* (Temm.) [*Bessethera barbata* Cab. Mus. Hein. I. p. 76] — 1 ♂, 2 St. Borneo.
3. *poliogenys* (Müll.) — 1 St. Borneo; 1 St. Sumatra.
4. *epilepidotus* (Temm.) 1 St. Java.

Genus *Trichastoma* Blyth 1842.

1. *rostratum* Blyth — 1 St. Malacca.
2. *pyca* (Boie) — 1 St. Sumatra.
3. *concretum* (Müll.) — 1 St. Java; 1 St. Borneo.
4. *mystacale* (Temm.) — 1 St. Sumatra.
5. *umbratile* (Müll.) — 1 St. Borneo; 1 ♂ Johore (Malacca).

Genus *Aegithina* Vieill. 1816.

1. *tiphia* (L.) — 1 St. Bengalen; 1 St. Madras; 1 ♀ Insel Salanga (Malacca).
2. *zeylonica* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♂ jun., 1 St. Ceylon.
3. *scapularis* Horsf. — 1 ♀ Java.
4. *viridis* Temm. — 1 St. Borneo.
5. *Lafresnaye* Hartl. — 1 ♂ Johore (Malacca).

Genus *Dumetia* Blyth 1849.

1. *albogularis* (Blyth) — 1 St. Thibet.

Genus *Pyctorhis* Hodgs. 1844.

1. *sinensis* (Gm.) — 1 St. Belaspoor (Ostindien).

Genus *Mixornis* Hodgs. 1845.

1. *gularis* (Horsf.) — 2 ♂ Sumatra; 1 ♂ Johore (Malacca).
2. *javanica* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 77] — 2 St. Java.
3. *melanothorax* (Temmm.) — 1 St. Java.
4. *rubricapilla* (Tick.) — 1 St. Nepal.
5. *pyrrhoptera* (Boie) — 1 ♂, 1 ♀ Borneo; 1 jun. Sumatra.

Genus *Napodes* Cab. 1850.

1. *pileata* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *thoracica* (Temmm.) — 1 ♂ Java.
3. *poliocephala* (Temmm.) — 1 ♂ Malacca.
4. *maculata* (Temmm.) — 1 ♂, 1 ♀ Borneo.
5. *leucotis* (Strickl.) — 1 St. Malacca.
6. *leucostigma* (Müll.) — 1 St. Borneo.
7. *nigricollis* (Temmm.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♀ Borneo.
8. *grammicephala* (Kuhl) — 1 St. Java.

Genus *Malacopteron* Eyton 1839.

1. *rufifrons* (Licht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 65] — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *coronatum* (Müll.) — 1 St. Sumatra.
3. *magnum* Eyt. — 1 ♂ Borneo; 1 ♂ Johore (Malacca).

Genus *Napothera* Boie 1835.

1. *pyrrhopyga* (Less.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♀ Sumatra.
2. *bicolor* (Less.) — 1 ♂ Borneo; 1 ♀ Sumatra.

Genus *Brachypteryx* Horsf. 1820.

1. *montana* Horsf. — 1 juv. Java.
2. *albifrons* Boie — 1 ♂ Java.
3. *murina* (Temmm.) — 1 ♂ Waigiou.

Genus *Microcercus* Fitz. 1864.

1. *lepturus* (Kuhl) — 1 St. Borneo.

Genus *Phoebastria* Hodg. 1844.

1. *cyaniventris* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.
2. *caudata* (Blyth) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Turdinus* Blyth 1844.

1. *macrodactylus* (Strickl.) — 1 ♂ Java; 1 ♂, 1 ♀ Malacca.

Genus *Macronus* Jard. et Selby 1835.

1. *ptilosus* Jard. et Selby. — 2 ♂, 1 ♀ Java.
2. *euryzonus* (Müll.) — 1 St. Borneo.

Genus *Alethe* Cass. 1859.

1. *castanea* Cass. — 1 St. West-Africa.

Subfam. Troglodytinae.

Genus *Troglodytes* Vieill. 1807.

1. *parvulus* Koch — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *americanus* Aud. — 1 juv. Nord-America.
3. *aëdon* Vieill. — 1 St. Duennas (Guatemala).
4. *furvus* (Gm.) — 1 St. Pallatanga (Ecuador).
5. *hortensis* Less. — 1 ♂ Valdivia.
6. *brunneicollis* Scl. — 1 ♀ La Parada (Mexico).
7. *solstitialis* Scl. — 1 ♂ Bogota; 1 St. Nanegal (Ecuador).
8. *striatulus* Lafr. — 1 ♂ jun., 1 ♀ Bogota.
9. *intermedius* Cab. — 1 St. Costa Rica; 1 ♂ Totulepec (Mexico).
10. *hiemalis* Vieill. — 2 ♂, 1 St. Georgien.

Genus *Cistothorus* Cab. 1850.

1. *stellaris* (Leht., Naum.) — 1 St. Florida.

Genus *Telmatodytes* Cab. 1850.

1. *arundinaceus* (Vieill.) — 1 ♀ Nord-America.
2. *Bewicki* (Aud.) — 1 St. Nord-America; 1 ♂ Oaxaca (Mexico).

Genus *Thryophilus* Baird 1864.

1. *rufalbus* (Lafr.) — 1 St. Neu-Granada; 1 St. Duennas (Guatemala).

Genus *Thryothorus* Vieill. 1816.

1. *ludovicianus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Georgien.
2. *venezuelanus* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 78] — 1 ♀, 1 Nest mit 4 Jungen Venezuela.
3. *albipectus* (Baird) — 1 St. Babahoyo (Ecuador).
4. *longirostris* Vieill. — 1 St. Brasilien; 1 St. Bahia.
5. *platensis* (Lath.) — 1 St. Süd-America; 1 St. Brasilien.
6. *maculipectus* Lafr. — 1 ♂ Mexico.
7. *modestus* Cab. — 1 St. Costa Rica.

Genus *Salpinctes* Cab. 1847.

1. *mexicanus* (Sws.) — 1 ad., 2 jun. Mexico.
2. *obsoletus* (Say) — 1 ♂ Oaxaca (Mexico).

Genus *Cyphorhinus* Cab. 1844.

1. *musicus* (Bodd.) [*Turdus cantans* Gm.] — 1 St. Guiana; 1 ♂ Cayenne.
2. *modulator* (d'Orb.) — 1 St. Peru.

Genus *Henicorhina* Scl. et Salv. 1868.

1. *leucosticta* (Cab.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ Rio Napo (Ecuador).
2. *leucophrys* (Tsch.) — 1 ♂, 1 jun. Bogota; 1 St. Peru.

Genus *Pheugopedius* Cab. 1850.

1. *genibarbis* (Sws.) Cab.* [Mus. Hein. I. p. 79] — 3 St. Brasilien.

Genus *Presbys* Cab. 1850.

1. *canifrons* (Lafr.) — 1 ♂ Columbien.
2. *unirufus* (Lafr.) — 2 St. Bogota.
3. *unibrunneus* (Lafr.) — 1 St. Pichincha.
4. *peruanus* Cab. — 1 St. Bogota.

Genus *Campylorhynchus* Spix 1824.

1. *variegatus* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ var. Brasilien; 1 ♀ Bahia.
2. *zonatus* (Less.) — 1 St. Xalapa.
3. *zonatoides* Lafr. — 1 St. Peru.
4. *nuchalis* Cab. — 2 St. Venezuela.
5. *capistratus* (Less.) — 1 St. Escuintla (Guatemala).
6. *megalopterus* (Lafr.) — 1 ♀ Mexico.

Genus *Helcodytes* Cab. 1850.

1. *griseus* (Sws.) — 1 St. Guiana.
2. *minor* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 80] — 1 St. Venezuela.

Genus *Donacobius* Sws. 1831.

1. *atricapillus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂, 1 St. Venezuela

Genus *Harporhynchus* Cab. 1847.

1. *longirostris* (Lafr.) — 1 St. Mexico.
2. *rufus* (L.) — 2 St. Süd-Carolina.
3. *redivivus* (Gamb.) — 1 St. Californien.
4. *vetulus* (Wagl.) — 2 St. Mexico.

Genus *Melanotis* Bp. 1850.

1. *caerulescens* (Sws.) — 2 ♂ Mexico.
2. *hypoleuca* Hartl. — 1 St. Duennas (Guatemala).

Genus *Rhamphocinclus* Sel. 1859.

1. *brachyurus* (Vieill.) — 1 St. Martinique.

Genus *Galeoscoptes* Cab. 1850.

1. *carolinensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ Xalapa.

Genus *Mimus* Boie 1826.

1. *lividus* (Lcht.) — 2 St. Brasilien.
2. *polyglottus* (L.) — 1 St. Texas; 1 St. Mexico.
3. *columbianus* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 82] — 1 ♂ Columbien;
1 ♀ Venezuela.
4. *calandria* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂, 1 ♀ Paraguay.
5. *saturninus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
6. *thenca* (Mol.) — 1 St. Chile.
7. *longicaudatus* Tsch. — 1 St. Peru.

Subfam. Crateropodinae.

Genus *Pomatostomus* Cab. 1850.

1. *temporalis* (Vig. et Horsf.) — 1 St. Australien.
2. *superciliosus* (Vig. et Horsf.) — 1 St. West-Australien.
3. *Isidori* (Less.) — 1 St. Neu-Guinea.

Genus *Pomatorhinus* Horsf. 1820.

1. *montanus* Horsf. — 1 ♂, 1 St. Java.
2. *Horsfieldi* Sykes — 1 St. Malabar; 1 St. Ostindien.
3. *ruficollis* Hodg. — 1 St. Himalaya.
4. *erythrogeus* Vig. — 1 St. Himalaya.
5. *musicus* Swinh. — 1 St. Formosa.

Genus *Argya* Less. 1831.

1. *squamiceps* (Rüpp.) — 1 ♂ Arabien.
2. *acaciae* (Licht.) — 1 ♂, 1 ♀ Nubien; 1 ♂ Chartum.
3. *fulva* (Desf.) — 1 ♂ El Fayd (Algier).
4. *rubiginosa* (Rüpp.) — 1 jun. Abessinien.

Genus *Malacocercus* Sws. 1832.

1. *striatus* Sws. — 1 St. Ostindien.
2. *malabaricus* Jerd. — 1 St. Ostindien.
3. *rufescens* Blyth — 1 ♂ Ceylon.
4. *cinereifrons* (Kel.) — 1 ♂ Ceylon.

Genus *Chatarrhaea* Blyth 1856.

1. *caudata* (Dum.) — 2 St. Belaspoor (Ostindien).

Genus *Crateropus* Sws. 1831.

1. *leucocephalus* Rüpp. — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar; 1 jun. Ost-Africa.
2. *leucopygius* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.
3. *Reinwardti* Sws. — 1 St. Casamanze (West-Africa).
4. *atripennis* Sws. — 1 ♂ Casamanze (West-Africa).

Genus *Hypochloreus* Cab. 1850.

1. *atriceps* (Less.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Psophodes* Vig. et Horsf. 1826.

1. *crepitans* (Lath.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ jun. Süd-Australien.
2. *nigrogularis* Gould — 1 ♀ West-Australien.

Genus *Cinclosoma* Vig. et Horsf. 1825.

1. *punctatum* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Van Diemensland; 1 ♂ Australien.

2. *castanotum* Gould — 2 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *cinnamomeum* Gould — 1 ♂ Central-Australien.

Genus *Janthocincla* Gould 1835.

1. *rufigularis* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 jun. Himalaya.
2. *mitrata* (Müll.) — 1 ♂ Sumatra.
3. *caerulea* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Trochalopteron* Hodgs. 1844.

1. *squamatum* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *phoeniceum* (Blyth) — 1 ♂ Darjeeling.

Genus *Pterocyclus* Gray 1846.

1. *erythrocephalus* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya.
2. *chrysopterus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
3. *lineatus* (Vig.) — 1 St. Ostindien.
4. *variegatus* (Vig.) — 1 ♂ Nepal.
5. *affinis* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Heterornis* Hodgs. 1841 [*Cutia* (!) Hodgs. 1836].

1. *nipalensis* Hodgs. — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.

Genus *Grammatoptila* Rehb. 1850.

1. *striata* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya; 1 St. Nepal.

Genus *Leucodioptron* „Schiff“ Bp. 1853.

1. *taicanum* (Swinh.) — 1 St. Formosa.

Genus *Garrulax* Less. 1831.

1. *leucolophus* (Hardw.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Nepal; 1 ♀ Darjeeling.
2. *albogularis* (Gould) — 1 ♂ Himalaya.

3. *rufifrons* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
4. *pectoralis* (Gould) — 2 ♂ Nepal; 1 jun. Malacca.

Genus *Rectes* Rehb. 1850.

1. *uropygialis* Gray — 1 St. Mysol.
2. *leucorhynchus* Gray — 1 St. Waigiou.
3. *ferrugineus* (S. Müll.) — 1 St. Neu-Guinea.
4. *cerviniventris* Gray — 1 St. Waigiou.
5. *cirrhocephalus* (Less.) — 1 St. Neu-Guinea.

Genus *Cissa* Boie 1826.

1. *thalassina* Temm. — 1 ♂ Java.

Genus *Urocissa* Cab. 1850.

1. *sinensis* (L.) — 1 ♂ China.
2. *speciosa* (Shaw) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Nepal.
3. *flavirostris* (Blyth) — 1 ♂ Darjeeling.
4. *caerulea* Gould — 1 ♂ Formosa.
5. *magnirostris* (Blyth) — 1 ♂ Himalaya.
6. *ornata* (Wagl.) — 1 ♂ Ceylon.

Subfam. Liotrichinae.

Genus *Alcippe* Blyth 1844.

1. *solitaria* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 87] — 1 St. Sumatra; 1 St. Java.
2. *dumetoria* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 88] — 1 ♂, 2 ♀ Java.
3. *affinis* Blyth — 1 ♀ Johore (Malacca).

Genus *Actinodura* Gould 1836.

1. *nipalensis* (Hodgs.) — 1 St. Himalaya.
2. *Egertoni* Gould — 1 St. Nepal.

Genus *Liothrix* Sws. 1831.

1. *lutea* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *argentauris* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.
3. *cyanuroptera* (Hodgs.) — 1 St. Nepal.
4. *strigula* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 St. Chamba (Ostindien).
5. *ignitincta* (Hodgs.) — 1 St. Thibet.
6. *castaneiceps* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Lioptilus* Cab. 1850.

1. *nigricapillus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 St. Süd-Africa.
- — — — —

Fam. Paridae.

Subfam. Aegithalinae.

Genus *Pamurus* Koch 1816.

1. *biarmicus* (L.) — 2 ♂ Deutschland; 1 ♂ Holland; 2 ♂, 1 ♀,
1 ♀ jun., 1 juv. Galizien; 1 ♀ juv. Sarepta.

Genus *Aegithalus* Boie 1822.

1. *pendulinus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Europa; 1 ♂ Galizien.

Genus *Anthoscopus* Cab. 1850.

1. *minutus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Subfam. Parinae.

Genus *Orites* Moehr. 1752.

1. *caudatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.

Genus *Aegithaliscus* Cab. 1850.

1. *erythrocephalus* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya; 1 St. Simla (Ostindien).

Genus *Psaltrites* Cab. 1881 [*Psaltriparus* (!) Bp. 1851].

1. *melanotis* (Hartl.) — 1 ♂ Capulacapa (Mexico); 1 ♀ La Parada (Mexico).
2. *minimus* (Towns.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Chamaea* Gamb. 1847.

1. *fasciata* Gamb. — 1 ♂ Californien.

Genus *Cyanistes* Kaup 1829.

1. *caeruleus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 juv. Harz.
2. *cyaneus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Europa.
3. *ultramarinus* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Africa; 1 St. Tanger.

Genus *Lophophanes* Kaup 1829.

1. *cristatus* (L.) — 2 St. Harz.
2. *galeatus* (Leht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 90 Anm.] — 1 St. Mexico.

Genus *Poecile* Kaup 1829.

1. *palustris* (L.) — 3 ♂, 3 ♀ Harz; 1 ♂ Gothenburg; 1 ♂, 1 ♀

[*Parus fruticeti* Wallengr.] Stockholm; 1 ♂ Galizien;
1 St. Thüringen.

2. *cincta* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Norwegen.

3. *borealis* (Selys) — 1 St. Schweden; 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Stockholm; 1 ♂ [*P. alpestris* Bailly] Nord-Europa.

4. *lugubris* (Natt.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀ juv. Albanien.

5. *atricapilla* (L.) — 1 St. Nord-America.

6. *carolinensis* (Aud.) — 1 ♀ Illinois.

7. *meridionalis* (Scl.) — 1 St. La Parada (Mexico).

Genus *Machlolophus* Cab. 1850.

1. *spilonotus* (Blyth) — 1 ♂ Himalaya.

2. *melanolophus* (Vig.) — 2 ♂, 1 ♀ Himalaya.

Genus *Parus* L. 1735.

1. *major* L. — 3 ♂, 2 ♀, 1 juv. Harz; 1 ♂ Klein-Asien.

2. *ater* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 juv. Harz.

3. *cinereus* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Java; 1 ♂ var. *continent.* Himalaya.

4. *cinerascens* Vieill. — 1 ♂ Süd-Africa.

5. *Ledouci* Malh. — 1 ♂ Algier.

6. *minor* Temm. et Schleg. — 1 ♂ Japan.

7. *varius* Temm. et Schleg. — 1 ♂ Japan.

8. *elegans* Less. — 1 ♂ Manilla.

9. *monticolus* Vig. — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Baeolophus* Cab. 1850.

1. *bicolor* (L.) — 2 ♂ Georgien.

Genus *Pentheres* Cab. 1850.

1. *niger* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

2. *leuconotus* (Guér.) — 1 ♂ Woggara (Ost-Africa).

3. *leucopterus* (Sws.) — 1 ♂ Senegal.

4. *leucomelas* (Rüpp.) — 1 ♀ Sennaar.

Genus *Melanochlora* Less. 1839.

1. *flavocristata* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.

2. *sultanea* (Hodgs.) — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Paradoxornis* Gould 1836.

1. *flavirostris* Gould — 1 ♂ Nepal.

Genus *Bathyrhynchus* Bp. 1850.

1. *caniceps* (Blyth) — 1 ♂ Thibet.

Subfam. Sittinae.

Genus *Dendrophila* Sws. 1837.

1. *frontalis* (Horsf.) — 1 ♂ Borneo; 2 St. Java.
2. *azurea* (Less.) — 1 ♂ Central-Asien.

Genus *Sittella* Sws. 1837.

1. *chrysoptera* (Lath.) — 1 St. Süd-Australien.
2. *pileata* Gould — 1 ♀ West-Australien.

Genus *Sitta* L. 1735.

1. *europaea* L. — 2 ♂ Stockholm; 1 ♀, 1 St. Schweden; 1 ♀ Scandinavien.
2. *caesia* Meyer et Wolf — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Smyrna.
3. *syriaca* Ehr. — 1 ♂ Dalmatien; 1 St. Attica.
4. *himalayensis* Jard. et Selby — 1 St. Nepal; 1 St. Himalaya.
5. *carolinensis* Lath. — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ Illinois; 1 ♀ Süd-Carolina; 1 St. Georgien.
6. *aculeata* Cass. — 1 ♂, 1 ♀ Californien.
7. *pusilla* Lath. — 1 ♂, 1 ♀ Georgien.
9. *pygmaea* Vig. — 1 St. Mexico.
10. *Krueperi* v. Pelz. — 1 ♂ Smyrna.
11. *amurensis* Sws. — 1 St. Amur.

Fam. Certhiidae.

Subfam. Certhiinae.

Genus *Certhia* L. 1735.

1. *familiaris* L. — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 2 St. [*C. Costae* Bailly] Savoyen;
1 ♂ [*C. longicauda* Brandt] Sibirien.
2. *americana* Bp. — 1 ♂, 1 St. Nord-America; 1 ♂ Georgien.
3. *mexicana* Rehb. — 1 ♂ La Parada (Mexico).
4. *himalayana* Vig. — 1 St. Himalaya.
5. *nepalensis* Hodgs. — 1 St. Nepal.

Subfam. Climacterinae.

Genus *Tichodroma* Ill. 1811.

1. *mauraria* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Schweiz; 1 ♂ Italien.

Genus *Climacteris* Temm. 1820.

1. *leucophaea* (Lath.) — 1 ♂, 2 ♀ Australien.
2. *rufa* Gould — 1 St. West-Australien.
3. *erythrope* Gould — 1 St. Australien.

Genus *Orthonyx* Temm. 1820.

1. *spinicauda* Temm. — 1 ♂ Australien.
 2. *ochrocephalus* (Gm.) — 1 ♂, 1 St. Neu-Seeland.
-

Fam. Dacnidae.

Subfam. Dacninae.

Genus *Conirostra* d'Orb. et Lafr. 1837.

1. *sitticolor* Lafr. — 2 ♂ Neu-Granada; 2 ♂, 2 ♀ Bogota; 1 ♀ Bolivien.
2. *Fraseri* Scl. — 1 ♂ juv. Chillanes (Ecuador).
3. *albifrons* Lafr. — 2 St. Bogota; 1 ♂ juv. Pallatanga (Ecuador).

Genus *Dacnis* Cuv. 1817.

1. *caerebicolor* Scl. — 1 ♂, 2 ♀ Bogota; 1 ♂ Ucayali (Peru); 2 St. Cayenne.
2. *melanotis* Strickl. — 1 ♂ Bogota.
3. *cayana* (L.) — 3 ♂, 2 ♀, 3 ♂ jun. Brasilien.
4. *plumbea* (Lath.) — 1 ♂ Venezuela; 1 ♀ Brasilien [?].
5. *egregia* Scl. — 1 ♂, 2 ♀ Bogota.
6. *spiza* (L.) — 2 ♂, 2 ♂, 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♂ Peru; 1 ♂, 2 St. Bogota; 2 ♀ Caracas.
7. *speciosa* (Wied) — 2 ♂, 1 jun. Brasilien.

Genus *Arbelorhina* Cab. 1847.

1. *cyanea* (L.) — 3 ♂, 4 ♀, 1 ♂ jun., 1 jun. Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ [*Caereba carneipes* Scl.] Tuxtla (Mexico).
2. *brevipes* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 96] — 1 ♂ Porto Cabello.
3. *eximia* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 96] — 2 ♂ Porto Cabello.
4. *caerulea* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 ♀ Guiana; 2 ♂ Hab. ?.
5. *nitida* (Hartl.) — 1 ♂ Bogota.
6. *longirostris* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 96] — 2 ♂, 3 ♀ Caracas.

7. *brevirostris* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 96] — 1 ♂ Porto Cabello.
8. *lucida* (Scl. et Salv.) — 1 St. Guatemala.

Genus *Certhiola* Sund. 1836.

1. *luteola* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 96] — 1 ♂ Rio Napo
(Ecuador); 1 St. Bogota; 1 St. Porto
Cabello; 1 St. Cayenne.
2. *chloropyga* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 97] — 5 St. Bahia; 1 St.
Brasilien.
3. *guianensis* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 97] — 1 St. Guiana.
4. *mexicana* Scl. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Diglossa* Wagl. 1832.

1. *baritula* Wagl. — 2 ♂ Mexico.
2. *hyperythra* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 97] — 1 ♂ Caracas.
3. *similis* Lafr. — 1 ♀, 1 St. Bogota.
4. *albilateralis* Lafr. — 2 ♂, 1 ♀ Bogota.
5. *Lafresnaye*i (Boiss.) — 3 St. Bogota.
6. *humeralis* (Fras.) — 1 St. Bogota.
7. *personata* (Fras.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Bogota.
8. *carbonaria* (Lafr. et d'Orb.) — 1 St. Bolivien.
9. *major* Cab. — 1 St. Guiana.

Subfam. Drepaninae.

Genus *Dicaeum* Cuv. 1817.

1. *cruentatum* (L.) — 1 ♂ Nepal; 1 ♂ Malacca; 1 ♀ Ostindien.
2. *flammeum* (Sparrm.) — 1 ♂, 1 ♀ Sunda-Inseln; 1 ♂, 1 ♀ Java.
3. *sanguinolentum* Temm. — 1 St. Java.
4. *minimum* (Tick.) — 1 St. Ostindien.
5. *trigonostigma* (Scop.) — 1 ♂ Malacca.
6. *chrysorrhoeum* Temm. — 1 St. Malacca.
7. *Mackloti* Temm. — 1 ♂ West-Timor.

8. *celebicum* Müll. — 1 ♂ Menado (Celebes).
9. *erythrothorax* Less. — 1 St. Waigiou.
10. *schistaceiceps* Gray — 1 ♂ Gilolo.
11. *hirundinaceum* (Shaw) — 2 ♂, 1 ♀ West-Australien; 1 juv. Australien.

Genus *Melanocharis* Scl. 1858.

1. *nigra* (Less.) — 1 ♂, 1 juv. Mysol.

Genus *Pardalotus* Vieill. 1816.

1. *punctatus* (Lath.) — 2 ♂, 2 ♀ Australien; 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. West-Australien.
2. *striatus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *affinis* Gould — 1 ♂ Van Diemensland.
4. *quadragintus* Gould — 1 St. Van Diemensland.

Genus *Prionochilus* Strickl. 1841.

1. *percussus* (Temm.) — 1 St. Sumatra; 1 St. Java.
2. *maculatus* (Temm.) — 1 ♂ Borneo; 1 ♀ Malacca; 1 ♂ Johore (Malacca).

Genus *Drepanis* Temm. 1820.

1. *coccinea* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 jun. Oahu (Sandwichs-Inseln).

Genus *Himatione* Cab. 1850.

1. *sanguinea* (Gm.) — 1 ♂ Oahu (Sandwichs-Inseln).
-

Fam. Nectarinidae.

Subfam. Nectarininae.

Genus *Anthodiacta* Cab. 1850.

1. *collaris* (Vieill.) — 2 ♂ Port Natal.
2. *cyanolaema* (Jard.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Hedydipna* Cab. 1850.

1. *metallica* (Leht.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Abessinien; 1 ♀ Sennaar.
2. *platura* (Vieill.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Panaeola* Cab. 1850.

1. *pulchella* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 2 ♂ jun. Senegal; 1 ♂ Nordost-Africa.

Genus *Cinnyris* Cuv. 1817.

1. *splendida* (Shaw) — 1 ♂ West-Africa.
2. *habessinica* (Ehr.) — 2 ♂ Abessinien.
3. *amethystina* (Shaw) — 4 ♂ Port Natal; 1 ♂ jun. Süd-Africa.
4. *gutturialis* (L.) — 1 ♂ Port Natal.
5. *senegalensis* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 4 ♂ jun. Senegal.
6. *afra* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Süd-Africa.
7. *chalybea* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Süd-Africa.
8. *venusta* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Senegal.
9. *fusca* (Vieill.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Aidemonia* Rehb. 1854.

1. *cuprea* (Shaw) — 1 West-Africa.

Genus *Nectarinia* Ill. 1811.

1. *famosa* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Hermotimia* Rehb. 1854.

1. *auriceps* (Gray) — 1 St. Morty-Insel.
2. *notata* (S. Müll.) — 1 ♂ Madagascar.

Subfam. *Ptiloturinae*.

Genus *Aethopyga* Cab. 1850.

1. *siparaja* (Raffl.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂ Sumatra.
2. *eximia* (Horsf.) — 2 ♀ Java.
3. *nipalensis* (Hodgs.) — 1 St. Himalaya.
4. *seheriae* (Tick.) — 1 ♂ Nepal.
5. *saturata* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Chalcoparia* Cab. 1850.

1. *phoenicotis* (Temm.) — 1 ♂ Malacca.

Genus *Chalcostetha* Cab. 1850.

1. *aspasia* (Less.) — 1 ♀ Mysol.
2. *zenobia* (Less.) — 1 St. Ceram.
3. *pectoralis* (Temm.) — 1 pull. Johore (Malacca).

Genus *Anthobaphes* Cab. 1850.

1. *violacea* (L.) — 4 ♂ Cap.

Genus *Ptiloturus* Sws. 1837.

1. *cafer* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 pull. Cap.

Subfam. **Arachnotherinae.**

Genus *Anthothreptes* Sws. 1831.

1. *malaccensis* (Scop.) — 1 ♂, ♀, 1 ♂ jun. Java; 1 ♀ Borneo.
2. *leypogrammica* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
3. *orientalis* Hartl. — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Leptocoma* Cab. 1850.

1. *zeylonica* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *sperata* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Philippinen.
3. *Hasselti* (Temmm.) — 1 ♂ Malacca.

Genus *Cyrtostomus* Cab. 1850.

1. *jugularis* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Philippinen.
2. *pectoralis* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
3. *solaris* (Temmm.) — 1 ♂ Timor.
4. *frenatus* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Mysol; 1 ♂ jun., 1 ♀ Morty-Insel.

Genus *Arachnechthra* Cab. 1850.

1. *lotenia* (L.) — 1 ♂ Pondichery; 1 ♀ Bengalen.
2. *currucaria* (L.) — 2 ♂ jun., 1 juv. Ostindien.

Genus *Arachnothera* Temm. 1826.

1. *robusta* Müll. et Schleg. — 1 ♂ Borneo.
 2. *uropygialis* Gray — 1 St. Ostindien.
 3. *longirostris* (Lath.) — 1 ♂ jun. Java; 1 ♀ Malacca.
 4. *affinis* (Horsf.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂, 1 ♀ Java.
 5. *magna* (Hodgs.) — 1 ♂ Himalaya.
 6. *flavigastra* (Eyt.) — 3 St. Malacca.
 7. *chrysogenys* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra.
- . . . —

Fam. Brachypodidae.

Subfam. Pycnonotinae.

Genus *Pycnonotus* Kuhl 1826.

1. *capensis* (L.) — 1 ♂, 1 St. Süd-Africa.
2. *obscurus* (Temm.) — 1 ♂ Marocco; 1 St. [var. *alba*] Nord-Africa.
3. *arsinoë* (Lcht.) — 2 St. Nordost-Africa.
4. *nigricans* (Vieill.) — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂ Port Natal; 1 St. Damaraland.
5. *ashanteus* (Bp.) — 1 St. West-Africa.

Genus *Loedorus* Rehb. 1850.

1. *analís* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀, 2 St. Java.
2. *goiavier* (Scop.) — 1 ♂ Manilla.
3. *luteola* (Less.) — 1 St. Ceylon.
4. *simplex* (Less.) — 1 St. Borneo; 1 jun. Sumatra; 1 ♂ juv. Johore (Malacca).
5. *plumosa* (Blyth) — 1 St. Java; 1 ♂ Sumatra; 1 ad. Ins. Sallanga (Malacca).
6. *Salvadorii* (Sharpe) — 1 St. Java; 1 St. Borneo.
7. *Finlaysoni* (Strickl.) — 1 ♂, 1 juv. Sunda-Inseln.
8. *cyaniventris* (Blyth) — 1 St. Sumatra.
9. *bimaculata* (Horsf.) — 2 St. Java.
10. *sinensis* (Gm.) — 1 St. China.

Genus *Jole* Blyth 1844.

1. *olivacea* Blyth — 1 ♂ Johore (Malacca).
2. *brunnescens* (Müll.) — 1 St. Java.

Genus *Brachypus* Sws. 1824.

1. *haemorrhous* (Gm.) — 2 ♂ Ostindien.
2. *pygaeus* (Hodgs.) — 1 ♂ Ostindien.
3. *aurigaster* (Vieill.) — 1 ♂, 2 St. Ostindien [?]; 1 St. Java.

Genus *Otocompsa* Cab. 1850.

1. *jocosa* (L.) — 1 St. Nepal; 1 St. Ostindien.
2. *leucogenys* (Gray) — 2 ♂ Himalaya.

Genus *Spizixos* Blyth 1845.

1. *canifrons* Blyth — 1 ♂ Nepal.

Genus *Hemixus* Hodgs. 1845.

1. *flavala* Hodgs. — 1 St. Assam.

Genus *Trachycomus* Cab. 1850.

1. *ochrocephalus* (Gm.) — 1 ♂, 1 St. Java.

Genus *Alcurus* Hodgs. 1843.

1. *flaviventer* (Tick.) — 1 ♂ Himalaya.
2. *striatus* (Blyth) — 2 St. Nepal.

Genus *Sphagias* Cab. 1850.

1. *dispar* (Horsf.) — 1 ♂ Java.

Genus *Prosecusa* Rehb. 1850.

1. *melanocephala* (Gm.) — 1 ♂ Java; 1 ♂ Borneo; 1 St. Ostindien [?].
2. *atricapilla* (Vieill.) — 1 ♂ Ceylon.

Genus *Microtarsus* Eyton 1839.

1. *melanoleucus* Eyt. — 1 St. China; 1 St. Malacca; 1 St. Sumatra.

2. *tympanistrigus* (Müll.) — 1 St. Sunda-Inseln.

Genus *Phacelias* Heine [*Kelaartia* (!) „Blyth“ Gray 1869].

1. *penicillatus* Blyth — 1 ♂ Ceylon.

Subfam. Campephaginae.

Genus *Pericrocotus* Boie 1826.

1. *peregrinus* (L.) — 3 ♂, 3 ♀ Ostindien.
2. *brevirostris* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien; 1 ♂ Nepal.
3. *miniatus* (Temmin.) — 1 ♂ Java.
4. *speciosus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
5. *igneus* Blyth — 2 ♂ Borneo; 1 ♀ Johore (Malacca).
6. *minutus* Strickl. — 1 ♂ Borneo.
7. *cinereus* Lafr. — 1 St. Ostindien.

Genus *Lalage* Boie 1826.

1. *terat* (Bodd.) [*Turdus orientalis* Gm.] — 2 ♂, 1 ♂ jun. Ostindien; 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *tricolor* (Sws.) [*Ceblepyris humeralis* Gould] — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *atrovirens* Gray — 1 ♂, 1 ♀ Mysol.
4. *timoriensis* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Timor.
5. *leucomela* (Vig. et Horsf.) — 1 St. Neu-Süd-Wales.
6. *aurea* (Temmin.) — 1 ♂ Ternate; 1 ♂ Morty-Insel.

Genus *Grallina* Vieill. 1817.

1. *picata* (Lath.) [*Cracticus cyanoleucus* Vieill.] — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien; 1 ♂ Port Albert (Gippsland).

Genus *Volvocivora* Hodgs. 1837.

1. *fimbriata* (Temmin.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Sunda-Inseln; 2 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♀ Tapor (Java).

2. *lugubris* (Sund.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
3. *Sykesi* Strickl. — 1 St. Ostindien.

Genus *Oxynotus* Sws. 1831.

1. *ruficenter* Sws. — 1 ♂, 1 ♀ Mauritius.
2. *Newtoni* Poll. — 1 St. Madagascar.

Genus *Campephaga* Vieill. 1816.

1. *nigra* Vieill. — 1 ♂, 2 ♀ Kaffernland.
2. *phoenicea* (Lath.) — 1 ♂ West-Africa.
3. *xanthornoides* (Less.) — 1 ♂ Senegal.

Genus *Artamides* Hartl. 1865.

1. *bicolor* (Temm.) — 1 St. Celebes.

Genus *Ceblepyris* Cuv. 1817.

1. *caesia* Licht. — 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♀ Kaffernland.
2. *cinerea* (Müll.) 1 ♂ Madagascar.
3. *schisticeps* (Gray) — 1 ♂ Salavatty; 1 ♀ Mysol.
4. *plumbea* (Müll.) — 1 St. Mysol.
5. *melana* (Müll.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Coracina* Vieill. 1816.

1. *melanops* (Lath.) — 4 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.
2. *parvirostris* (Gould) — 1 ♂ Van Diemensland.
3. *personata* (Müll.) — 2 ♂, 1 ♀ Timor.
4. *larvata* (Müll.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Java.
5. *mentalis* (Vig. et Horsf.) — 1 St. Australien.
6. *Macei* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
7. *javensis* (Horsf.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.
8. *tenuirostris* (Jard.) — 1 St. Australien.
9. *melanotis* (Gray) — 1 ♂ Morty-Insel.
10. *papuensis* (Gm.) — 1 St. Neu-Guinea?
11. *melanolora* (Gray) — 1 ♂ Morty-Insel.

12. *leucopygia* (Bp.) — 1 ♂ Macassar; 1 St. Celebes.
13. *sumatrensis* (Müll.) [*Graucalus concretus* Hartl.] — 1 St. Borneo.
14. *lineata* (Sws.) — 1 St. Australien.

Genus *Pteropodocys* Gould 1846.

1. *phasianella* Gould — 1 St. Australien.

Genus *Irena* Horsf. 1820.

1. *cyanea* Begbie — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
2. *turcosa* Wald. — 1 ♂, 1 ♀ Java.
3. *cyanogastra* Vig. — 1 ♂ Philippinen.

Subfam. Dicrourinae.

Genus *Dicrourus* Vieill. 1816.

1. *lugubris* (Ehr.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♀ Ober-Egypten.
2. *divaricatus* (Lcht.) — 1 ♂ Blauer Fluss; 1 St. Sennaar.
3. *musicus* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Süd-Africa.
4. *leucophaeus* Vieill. [*Edolius cineraceus* Horsf.] — 3 St. Java.
5. *bilobus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Java.
6. *macrocerus* Vieill. — 1 St. Südwest-Formosa.
7. *albirictus* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 juv. Ostindien.
8. *leucogenys* (Wald.) [*D. leucoparaeus* Cab.* in Mus. Hein. Mscr.] —
1 ♂, 1 ♀ Malacca; 1 St. [var. *salangensis* Rehw.,
regione parotica cinerea nec alba] Ins. Salanga
(Malacca).
9. *balicassius* (L.) — 1 ♂ Philippinen.
10. *carbonarius* (Müll.) — 1 ♂ Salavatty; 1 ♀ Mysol.
11. *densus* Temm. — 1 St. Timor.

Genus *Dicranostreptus* Rehb. 1850.

1. *megarhynchus* (Qu. et Gaim.) — 1 St. Waigiou.

Genus *Melisseus* Hodgs. 1841.

1. *remifer* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Dissemurus* Glog. 1842.

1. *setifer* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Sumatra; 1 ♀ Java.
2. *malabaricus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
3. *formosus* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 111] — 1 ♂ Java.
4. *brachyphorus* (Temm.) — 1 St. Borneo.

Genus *Trichometopus* Cab. 1850.

1. *hottentottus* (L.) — 2 ♂ Ostindien; 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *brevirostris* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 112] — 1 ♂ China.

Genus *Propopterus* Hodgs. 1841 [*Chaptia* (!) Hodgs. 1837].

1. *malayensis* Hay — 1 St. Malacca.

Subfam. Phyllornithinae.

Genus *Andropadus* Sws. 1831.

1. *importunus* (Vieill.) — 2 St. Süd-Africa.
2. *virens* Cass. — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Phyllostrephus* Sws. 1831.

1. *capensis* Sws. — 2 St. Kaffernland.

Genus *Ixonotus* Verr. 1851.

1. *guttatus* Verr. — 1 ♂ Gabun; 1 ♀ West-Africa.

Genus *Odonterus* Cab. 1851.

1. *gularis* (Hodgs.) — 1 St. Himalaya.
2. *nigrimentum* (Hodgs.) — 1 St. Tibet; 1 St. Himalaya.
3. *flavicollis* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Malacias* Cab. 1851.

1. *capistratus* (Vig.) — 2 St. Himalaya.

Genus *Microscelis* Gray 1840.

1. *virescens* (Temmm.) — 2 ♂ Java; 1 ♀ Sumatra.
2. *amaurotis* (Temmm.) — 1 St. Japan.

Genus *Hypsipetes* Vig. 1831.

1. *psaroides* Vig. — 1 St. Himalaya.
2. *McClellandi* Horsf. — 1 St. Nepal.
3. *olivaceus* Jard. et Selby — 1 ♂ Mauritius.
4. *nigerrimus* Gould — 1 St. Formosa.
5. *malaccensis* Blyth — 1 St. Malacca; 1 St. Borneo.

Genus *Criniger* Temmm. 1820.

1. *longirostris* Wall. — 1 St. Sula-Inseln.
2. *affinis* Hombr. et Jacq. — 1 St. Ceram.
3. *chloris* Finsch — 1 St. Gilolo.
4. *ictericus* Strickl. — 1 ♂ Ceylon.
5. *gularis* (Horsf.) — 1 St. Java.
6. *phaeocephalus* (Hartl.) — 2 St. Sumatra; 1 St. Borneo.
7. *minutus* (Hartl.) — 1 St. Sumatra; 1 St. Borneo.
8. *Finschi* Salvad. — 1 ♂ Johore (Malacca).
9. *Bemmeleni* Finsch — 1 St. Borneo.
10. *gutturalis* (Müll.) — 1 St. Borneo.
11. *pallescens* (Hartl.) — 1 St. West-Africa.
12. *canicapillus* (Hartl.) — 1 St. Casamanze (West-Africa); 1 St. West-Africa.
13. *nivosus* Temmm. — 1 ♂ West-Africa; 1 ♀ Casamanze (West-Africa).

Genus *Phyllornis* Boie 1822.

1. *icterocephala* Temmm. — 1 ♂ Sumatra.
2. *aurifrons* Temmm. — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ Nepal.
3. *malabarica* (Gm.) — 1 ♀ Ceylon.
4. *cyanopogon* Temmm. — 1 ♂, 1 ♀ Borneo; 1 ♂, 1 St. Sumatra.

5. *Hardwicki* (Jard.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Ostindien; 1 ♂ Nepal; 1 ♂, 1 ♀ Darjeeling.
6. *Jerdoni* Blyth — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun. Sumatra.
7. *cochinchinensis* (Gm.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ Malacca.

Fam. Meliphagidae.

Subfam. Melithreptinae.

Genus *Zosterops* Vig. et Horsf. 1825.

1. *Gouldi* Bp. — 1 St. West-Australien.
2. *javanica* (Horsf.) — 2 St. Java.
3. *japonica* Temm. — 1 St. Japan.
4. *lateralis* Temm. — 1 St. Java.
5. *palpebrosa* (Temm.) — 1 St. Ostindien; 1 St. Ceylon.
6. *nigrifrons* Temm. — 1 St. Celebes.
7. *citrinella* Müll. — 1 St. Timor.
8. *capensis* Sund. — 1 St. Süd-Africa; 1 St. Cap.
9. *senegalensis* Bp. — 1 St. Ost-Africa.
10. *madagascariensis* (L.) — 1 St. Süd-Africa.
11. *borbonica* (Gm.) — 1 St. Bourbon.

Genus *Melithreptus* Vieill. 1816.

1. *chloropsis* Gould — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. West-Australien.
2. *gularis* (Gould) — 2 St. Australien.

3. *validirostris* (Gould) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ Van Diemensland.
4. *melanocephalus* Gould — 2 St. Van Diemensland.
5. *lunulatus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Australien.

Subfam. Myzomelinae.

Genus *Acanthorhynchus* Gould 1837.

1. *tenuirostris* (Lath.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.
2. *superciliosus* Gould — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Myzomela* Vig. et Horsf. 1826.

1. *sanguinolenta* (Lath.) — 3 St. Australien.
2. *nigra* Gould — 1 ♀ West-Australien.
3. *cardinalis* (Gm.) — 1 St. Neu-Hebriden; 1 St. Upolu.
4. *jugularis* Peale — 1 ♀ Viti-Inseln.
5. *eques* (Less.) — 1 ♂ Mysol; 1 jun. Salavatty.

Genus *Lichnotentha* Cab. 1851.

1. *picata* (Gould) — 1 ♀ West-Australien.

Genus *Melilestes* Salvad. 1875.

1. *Novae Guineae* (Less.) — 1 St. Mysol; 1 St. Waigiou.
2. *megarhynchus* (Gray) — 1 St. Mysol.

Genus *Glycyphila* Sws. 1837.

1. *fulvifrons* (Lewin) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
2. *albifrons* Gould — 1 ♂ West-Australien.

Subfam. Meliphaginae.

Genus *Meliornis* Gray 1840.

1. *Novae Hollandiae* (Lath.) — 1 ♂, 1 jun. Neu-Süd-Wales; 4 St. Port Albert (Gippsland); 1 ♂, 1 ♀ jun. Van Diemensland.
2. *longirostris* (Gould) — 1 St. West-Australien.
3. *sericea* (Gould) — 1 St. Neu-Süd-Wales.
4. *mystacalis* (Gould) — 1 St. West-Australien.

Genus *Lichmera* Cab. 1851.

1. *australasiana* (Shaw) — 2 ♂, 2 ♀ Australien.
2. *ocularis* (Gould) — 1 ♂ West-Australien.

Genus *Ptilotis* Sws. 1837.

1. *auricomis* (Lath.) — 1 ♂, 1 St. Australien.
2. *sonora* Gould — 1 ♂ West-Australien.
3. *flavigula* Gould — 1 ♂, 1 St. Van Diemensland; 1 St. Australien.
4. *plumula* Gould — 1 ♀ West-Australien.
5. *penicillata* Gould — 2 ♂, 1 ♀ Australien; 1 ♂ Neu-Süd-Wales.
6. *sonoroides* Gray — 1 St. Neu-Guinea.
7. *leucotis* (Lath.) — 1 St. Australien.
8. *analoga* Rchb. — 1 St. Salavatty; 1 St. Mysol; 1 St. Samoa-Inseln [?].
9. *fusca* Gould — 1 St. Neu-Süd-Wales.
10. *chrysops* (Lath.) — 1 ♂ Australien.
11. *reticulata* (Temm.) — 1 St. Timor.
12. *maculata* (Müll.) — 1 St. Timor.

Genus *Xanthotis* Rchb. 1852.

1. *polygramma* Gray — 1 St. Mysol.
2. *chrysotis* (Less.) — 1 ♂ Waigiou.

Genus *Lichenostomus* Cab. 1851.

1. *occidentalis* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 119] — 1 St. West-Australien.

Genus *Pogonornis* Gray 1846.

1. *cincta* (Du Bus) — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Meliphaga* Lewin 1808.

1. *phrygia* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 St. Neu-Süd-Wales.

Genus *Prothemadera* Gray 1840.

1. *Novae Seelandiae* (Gm.) — 3 St. Neu-Seeland.

Genus *Acanthogenys* Gould 1837.

1. *ruficularis* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Anthornis* Gray 1840.

1. *melanura* (Sparrm.) — 2 St. Neu-Seeland.

Genus *Plectorhynchus* Gould 1837.

1. *lanceolatus* Gould — 1 St. Australien.

Genus *Anthochaera* Vig. et Horsf. 1826.

1. *inauris* Gould — 1 ♂ Van Diemensland.
2. *carunculata* (Lath.) — 2 St. West-Australien; 1 St. Port Albert (Gippsland).

Genus *Melitograis* Sund. 1872.

1. *gilolensis* (Temm.) — 2 St. Gilolo.

Genus *Anellobia* Cab. 1851.

1. *mellivora* (Lath.) — 1 St. Australien; 1 St. Van Diemensland; 2 St. Port Albert (Gippsland).

2. *lunulata* (Gould) — 1 St. West-Australien.

Genus *Manorhina* Vieill. 1825.

1. *melanophrys* (Lath.) — 2 St. Australien.
2. *garrula* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Van Diemensland.
3. *obscura* (Gould) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂ Schwanenfluss
(West-Australien).

Genus *Entomyza* Sws. 1837.

1. *cyanotis* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Philemon* Vieill. 1816.

1. *fuscicapillus* (Wall.) — 2 St. Morty-Insel.
2. *subcorniculatus* (Hombr. et Jacq.) — 1 ♂, 1 ♀ Ceram.
3. *inornatus* Gray — 1 St. Timor.

Genus *Tropidorhynchus* Vig. et Horsf. 1826.

1. *timoriensis* Müll. — 1 St. Timor.
 2. *Novae Guineae* Müll. — 1 St. Mysol; 1 St. Waigiou.
 3. *corniculatus* (Lath.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ Port Albert
(Gippsland); 1 ♀ Australien.
-

Fam. Alaudidae.

Subfam. Calandritinae.

Genus *Otocorys* Bp. 1839.

1. *alpestris* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Schweden; 1 ♂ Schweiz; 1 ♀ Nord-Europa.
2. *cornuta* (Wils.) — 1 ♂ Nord-America; 1 St. [*minor* Gir.] Californien.
3. *chrysolaema* (Wagl.) — 1 ♂, 1 juv. Mexico.
4. *peregrina* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
5. *bilopha* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. West-Asien; 1 ♂ Nord-Africa.

Genus *Calandritis* Cab. 1851.

1. *cinerea* (Gm.) — 1 St. Kaffernland.
2. *sibirica* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Sibirien.
3. *brachydactyla* (Leisl.) — 2 St. Griechenland; 1 St. Süd-Europa.
4. *pispoletta* (Pall.) — 1 ♀ Kirgisen-Steppe.
5. *Kollyi* (Temm.) — 2 St. Nordost-Africa.
6. *minor* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 123] — 1 St. Nordost-Africa.
7. *Heinei* v. Hom.* — 1 ♂, 1 ♀ Wolga.

Subfam. Alaudinae.

Genus *Melanocorypha* Boie 1828.

1. *calandra* (L.) — 2 St. Griechenland; 1 St. Nord-Africa.
2. *alboterminata* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 124] — 1 St. Abessinien.
3. *tatarica* (Gm.) — 1 ♂, 1 jun. Tartarei.
4. *mongolica* (Pall.) — 1 St. Amur.

Genus *Rhamphocorys* Bp. 1853.

1. *Clot-Bey* (Temm.) — 1 ♀ Algier.

Genus *Coraphites* Cab. 1847.

1. *leucotis* (Stanl.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Nord-Africa.
2. *nigriceps* (Gould) — 1 ♂, 2 ♀ Nordost-Africa.
3. *melanauchen* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 124] — 1 ♂, 1 jun. Africa.
4. *griseus* (Scop.) — 2 St. Ostindien.

Genus *Alanda* L. 1735.

1. *arvensis* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 pull., 1 St. [var. *alba*], 1 St. [var. *brunnea*] Harz.

Genus *Galerita* Boie 1828.

1. *cristata* (L.) — 3 St., 1 St. [var. *albescens*] Harz; 1 St. [*G. microcristata* v. Hom.] Abessinien.
2. *abyssinica* Bp. — 1 ♂ Ost-Africa.
3. *flava* Brehm — 1 ♂ Chartum; 1 ♀ Egypten.
4. *macrorhyncha* Tristr. — 1 ♂ Algier.
5. *Theklæ* Brehm — 1 ♂ Toledo.
6. *arborea* (L.) — 3 ♂, 2 ♀ Harz.

Genus *Ammomanes* Cab. 1851.

1. *deserti* (Leht.) — 3 St. Nordost-Africa; 1 ♂ Constantine; 1 ♀ Nubien.
2. *pallida* (Ehr.) — 1 ♂ Nordost-Africa.

Genus *Megalophonus* Gray 1841.

1. *guttatus* (Lafr.) — 1 St. Süd-Africa.
2. *apiatus* (Vieill.) — 1 St. Cap.
3. *ruficeps* Rüpp. — 1 St. Woggara (Nordost-Africa).

Genus *Geocoraphus* Cab. 1847.

1. *javanicus* (Horsf.) — 1 St. Java.
2. *phoenicurus* (Frankl.) — 1 St. Ostindien.

Genus *Chersomanes* Cab. 1851.

1. *garrula* (Smith.) — 1 St. Süd-Africa.
2. *Duponti* (Vieill.) — 1 ♂ Algier.

Genus *Alaemon* Blas. et Keys. 1840.

1. *desertorum* (Stanl.) — 1 ♂, 2 ♀ Nordost-Africa; 1 ♂ Candia;
1 ♂ Nubien; 1 ♂ Constantine.

Fam. Fringillidae.

Subfam. Emberizinae.

Genus *Centrophanes* Kaup 1829.

1. *lapponicus* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Lappland; 1 ♂ Labrador; 1 ♀
Russland.
2. *ornatus* (Towns.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Plectrophanes* Meyer 1822.

1. *nivalis* (L.) — 1 ♂ 3 ♀ Harz; 1 ♂ Schweden; 1 ♂ Island; 1 ♀
Norwegen; 1 jun. Grönland.

Genus *Crithophaga* Cab. 1851.

1. *miliaria* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Harz.

Genus *Emberiza* L. 1748.

1. *citrinella* L. — 2 ♂, 1 ♀ Harz.

2. *cirlus* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Harz; 1 ♂, Süd-Frankreich.
3. *elegans* Temm. — 1 ♂, 2 ♀ Amur.
4. *cia* L. — 2 ♂ Harz; 1 ♂ Sierra Nevada; 1 ♀ Algier
5. *Stracheyi* Moore — 1 ♂, 1 ♀ Altai.
6. *cioides* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Japan; 1 ♂, 1 ♀ Amur.
7. *cinerea* Strickl. — 1 ♂, ♀ Smyrna.
8. *pithyornus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 1 ♂ var. Sibirien.
9. *variabilis* Temm. — 1 ♂ Japan.
10. *spodocephala* Pall. — 1 ♀ Amur; 1 ♂, 1 ♂ jun. Udscoi (Nord-Asien).
11. *pusilla* Pall. — 2 ♂ Russland; 1 ♀ Amur.

Genus *Glycospina* Cab. 1851.

1. *hortulana* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Nord-Europa; 1 ♂ Altai.
2. *caesia* (Rüpp.) — 1 ♂ Griechenland; 1 ♂ Sennaar; 1 ♂ Nord-
ost-Africa.

Genus *Polymitra* Cab. 1851.

1. *flaviventris* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♂ Sennaar.
2. *striolata* (Lcht.) — 2 ♂, 1 ♀ Nubien.
3. *capistrata* (Lcht.) Cab.* [Mus. Hein. I. p. 129] — 1 ♂ Kaffern-
land; 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Cynchramus* Boie 1826.

1. *schoenichus* (L.) — 2 ♂, 1 ♂, 1 ♀ juv. Harz.
2. *Pallasi* Cab. — 1 ♂ Sibirien; 1 ♀ Kultuk (Baikal-See); 1 ♀ Amur.
3. *pyrrhuloides* (Pall.) — 1 ♂ Süd-Frankreich; 1 ♂ Astrachan; 1 ♂
Altai.

Genus *Euspiza* Bp. 1832.

1. *melanocephala* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Dalmatien; 1 ♂ Griechenland.
2. *luteola* (Lath.) — 1 St. Sibirien; 2 ♂ Himalaya; 2 ♂ Altai.
3. *rutila* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Udscoi (Nord-Asien).

Genus *Gubernatrix* Less. 1839.

1. *crstatella* (Vicill.) — 1 ♂ Montevideo; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Hypocentor* Cab. 1851.

1. *aureolus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Russland; 1 ♂ Sibirien; 1 ♂ Jrtysch (Sibirien).
2. *rusticus* (Pall.) — 1 ♂ Archangel; 1 ♂ jun., 1 ♀ Sibirien.
3. *fucatus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Amur.

Subfam. Passerellinae.

Genus *Passerculus* Bp. 1838.

1. *savanna* (Wils.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂, 1 ♀ Florida.
2. *alaudinus* Bp. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Passerella* Sws. 1837.

1. *iliaca* (Gm.) 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Süd-Carolina.
2. *Townsendi* (Aud.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Zonotrichia* Sws. 1831.

1. *albicollis* (Gm.) 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♀ Georgien.
2. *pileata* (Bodd.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Caracas; 1 ♀ Rio Grande;
1 juv. Venezuela; 3 St. Bogota.
3. *leucophrys* (Forst.) — 1 ♂ Nord-America.
4. *mystacalis* Hartl. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Ammodromus* Sws. 1827.

1. *maritimus* (Wils.) — 1 St. Nord-America.

Genus *Peucaea* Aud. 1839.

1. *ruficeps* (Cass.) — 1 St. Mexico.

Genus *Haemophila* Sws. 1837.

1. *rufescens* Sws. — 2 St. Mexico.
2. *superciliosa* Sws. — 1 ♂ Mexico.
3. *humeralis* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 132] — 1 St. Mexico.

Genus *Coturniculus* Bp. 1838.

1. *passerinus* (Wils.) — 1 ♀ Cuba.
2. *manimbe* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 St. Bahia.

Genus *Euspina* Cab. 1851.

1. *americana* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Nord-America.

Genus *Spinities* Cab. 1851.

1. *socialis* (Wils.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
2. *pallidus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Oaxaca (Mexico).
3. *pusillus* (Wils.) — 1 ♂, 1 ♀ Georgien.
4. *monticolus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♀ Georgien.

Genus *Chondestes* Sws. 1831.

1. *grammaca* (Say) — 1 ♂, 1 ♀ Oaxaca (Mexico).

Genus *Poocetes* Baird 1858.

1. *gramineus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Georgien; 1 ♀ Chile.

Genus *Melospiza* Baird 1858.

1. *melodia* (Wils.) — 1 ♂ Georgien; 1 ♀ Nord-America.
2. *fallax* (Baird) — 1 ♂ Mexico.
3. *palustris* (Wils.) — 1 ♂ Florida; 1 ♂ Georgien; 1 ♀ Ohio.

Genus *Helospiza* Baird 1858.

1. *Lincolni* (Aud.) — 1 St. Mexico.

Genus *Junco* Wagl. 1831.

1. *cinereus* Sws. — 1 ♂ La Parada (Mexico).

Genus *Niphaea* Aud. 1839.

1. *hiemalis* (L.) — 3 ♂ Nord-America.

2. *oregona* (Towns.) — 1 ♂ Sitka; 1 ♀ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Californien.

Genus *Phrygilus* Cab. 1844.

1. *Gayi* (Eyd. et Gerv.) — 4 ♂, 1 ♀, 1 jun. Chile.
2. *unicolor* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Chimborazo, 15000'.
3. *alaudinus* (Kittl.) — 1 ♂ Riobamba (Ecuador); 1 ♀ Chile.

Genus *Rhopospina* Cab. 1851.

1. *fruticeti* (Kittl.) — 2 ♂, 2 jun. Chile.

Genus *Hedyglossa* Cab. 1851.

1. *diuca* (Mol.) — 2 ♂, 1 ♀ Chile.
2. *speculifera* (Lafr. et d'Orb.) — 1 St. Peru.

Subfam. Pitylinae.

Genus *Tardivola* Sws. 1827.

1. *marginalis* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *macrura* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Limnospiza* Cab. 1851.

1. *platensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Rio-Grande.
2. *minor* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 136] — 1 St. Brasilien.

Genus *Donacospiza* Cab. 1851.

1. *albifrons* (Vieill.) — 1 ♂ Rio-Grande.

Genus *Embernagra* Less. 1831.

1. *chrysoma* Scl. — 1 ♂ Esmeraldas (Ecuador).
2. *striaticeps* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
3. *chloronota* Salv. — 1 St. Guatemala.

Genus *Chlorura* ScL. 1861.

1. *rufivirgata* (Lawr.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Poospiza* Cab. 1847.

1. *lateralis* (Nordm.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Brasilien.
2. *thoracica* (Nordm.) — 2 ♂, 2 ♀ Süd-Brasilien.
3. *bilineata* (Cass.) — 1 ♂ Mexico.
4. *Belli* (Cass.) — 1 ♀ Colorado-Fluss.
5. *schistacea* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 137] — 1 St. Brasilien.

Genus *Leucopygia* Sws. 1837.

1. *ruficollis* (Lcht.) — 1 St. Brasilien.

Genus *Thlypopsis* Cab. 1851.

1. *fulviceps* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 138] — 2 ♂, 1 ♂ juv. Caracas.
2. *fulvescens* (Strickl.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Pyrrhocoma* Cab. 1851.

1. *ruficeps* (Strickl.) — 1 ♂, 2 St. Brasilien.

Genus *Hemispingus* Cab. 1851.

1. *superciliaris* (Lafr.) — 1 St. Columbien; 2 St. Bogota.
2. *atripileus* (Lafr.) — 2 St. Bogota.
3. *rubrirostris* (Lafr.) — 3 St. Bogota.
4. *melanotis* (ScL.) — 1 St. Bogota.
5. *verticalis* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Chlorospingus* Cab. 1851.

1. *leucophrys* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 139] — 2 St. Xalapa;
1 St. Cordova (Mexico).
2. *canigularis* (Lafr.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Pipilopsis* Bp. 1850.

1. *semirufa* (Boiss.) — 2 St. Bogota; 2 ♂ Caracas.

Genus *Melozone* Rehb. 1850 [*Pyrgisoma* Puch. 1851].

1. *biarcuata* (Prév.) — 1 St. Duennas (Guatemala).
2. *rubricata* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 140 Anm.] — 1 ♂ Mexico.
3. *Cabanisi* (Scl. et Salv.) — 1 St. Costa-Rica.

Genus *Pipilo* Vieill. 1816.

1. *erythrophthalmus* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Nord-America.
2. *maculatus* (Sws.) — 2 ♂ Californien; 1 ♂ Mexico.
3. *oregonus* Bell. — 1 ♂ Mexico.
4. *macronyx* (Sws.) — 1 St. Mexico.
5. *rutilus* (Lcht.) — 1 ♀ Mexico.
6. *fuscus* (Sws.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Atlapetes* Wagl. 1831.

1. *albinuchus* (Lafr. et d'Orb.) — 2 St. Mexico.
2. *pallidinuchus* (Boiss.) — 1 St. Columbien; 2 St. Bogota.
3. *pileatus* Wagl. — 1 ♂ Mexico.
4. *latinuchus* (Du Bus) — 1 ♀ Puellaro (Ecuador).
5. *schistaceus* (Boiss.) — 2 St. Bogota.

Genus *Compsocoma* Cab. 1851.

1. *Victorini* (Lafr.) — 4 St. Bogota.
2. *sumptuosa* (Less.) — 1 ♀ Puellaro (Ecuador); 1 St. Bolivien.

Genus *Buarremon* Bp. 1850.

1. *assimilis* (Boiss.) — 1 St. Mexico; 2 St. Bogota.
2. *brunneinuchus* (Lafr.) — 2 St. Columbien; 2 St. Bogota.
3. *xanthogenys* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 141] — 2 St. Caracas.
4. *virenticeps* Bp. — 1 St. Mexico.

Genus *Arremon* Vieill. 1816.

1. *silens* (Bodd.) — 3 St. Brasilien; 1 St. Bahia.

2. *erythrorhynchus* Schl. — 1 ♂ Nanegal (Ecuador).
3. *semitorquatus* Sws. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
4. *aurantiistrois* Lafr. — 1 St. Mexico.

Genus *Schistochlamys* Rehb. 1850.

1. *leucophaea* (Lcht.) — 1 ♂, 4 St. Brasilien.
2. *atra* (Gm.) — 1 ♂ Surinam; 1 St. Brasilien.

Genus *Chlorornis* Rehb. 1850.

1. *prasina* (Less.) — 1 St. Columbien; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Saltator* Vieill. 1816.

1. *magnus* (Gm.) — 4 St. Brasilien; 1 St. Bogota.
2. *atriceps* Less. — 1 St. Mexico.
3. *gigantodes* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 142] — 1 St. Mexico.
4. *magnoides* Lafr. — 1 St. Vera Paz (Guatemala).
5. *olivascens* Cab. — 3 St. Guiana; 1 St. Venezuela; 1 St. Caracas; 1 St. [var.] Venezuela.
6. *Vigorsi* Gray — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 St. Escuintla (Guatemala); 2 St. Yucatan.
7. *Azarae* d'Orb. — 1 St. Ost-Peru.
8. *similis* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂, 3 St. Brasilien.
9. *striatipectus* Lafr. — 2 St. Bogota.
10. *martinicensis* Bp. — 1 ♂ Martinique.
11. *orenocensis* Lafr. — 1 St. Venezuela.
12. *atricollis* Vieill. — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Orchesticus* Cab. 1851.

1. *occipitalis* (Natt.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 143] — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Pitylus* Cuv. 1817.

1. *grossus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 St. Esmeraldas (Ecuador).
2. *caerulescens* (Vieill.) — 4 St., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Caryothraustes* Rchb. 1850.

1. *viridis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *brasiliensis* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 144] — 2 ♂ Brasilien; 3 St. Bahia.
3. *poliogaster* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Cissopis* Vieill. 1816.

1. *leveriana* (Gm.) — 1 St. Cayenne; 1 St. Guiana.
2. *major* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 144] — 3 St. Brasilien.

Genus *Cardinalis* Bp. 1831.

1. *virginianus* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Carolina.
2. *phoeniceus* Gould — 1 ♂ Trinidad.

Genus *Calyptrophorus* Cab. 1847.

1. *cucullatus* (Lath.) — 2 ♂ Brasilien.
2. *dominicanus* (L.) — 2 ♂, 2 St. Brasilien.

Genus *Coccopsis* Rchb. 1850.

1. *gularis* (L.) — 2 St. Venezuela.
2. *nigrogenys* (Lafr.) — 1 ♂, 1 juv. Porto Cabello.

Genus *Coryphospingus* Cab. 1851.

1. *cristatus* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *pileatus* (Wied) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *cruentus* (Less.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Euethia* Rchb. 1850.

1. *lepida* (L.) — 1 ♂ Cuba.
2. *pusilla* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Sycalis* Boie 1828.

1. *brasiliensis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♀ jun. Brasilien;

1 ♂ [var. *rostro majore, alis longioribus*]
Peru.

2. *Hilarii* (Bp.) — 1 ♀ Brasilien.

3. *columbiana* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 147] — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello

4. *luteola* (Sparrm.) — 1 St. Valdivia.

Genus *Tiaris* Sws. 1827.

1. *ornata* (Wied.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Volatinia* Rehb. 1850.

1. *jacarina* (L.) — 1 ad., 2 jun. Brasilien; 1 ad., 1 juv. Venezuela;
1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Haplospiza* Cab. 1851.

1. *unicolor* (Leht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 147] — 1 ♂ jun. Rio
Grande.

2. *homochroa* (Scl.) — 1 ♂ juv., 1 jun. Bogota.

Genus *Spiza* Bp. 1828.

1. *cyanea* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ jun. Nord-America?.

2. *ciris* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Carolina; 1 ♂ jun. Nord-America.

3. *versicolor* (Bp.) — 1 ♂ Mexico.

4. *Leclancheri* (Lafr.) — 1 ♂ jun. Mexico.

5. *amoena* (Say) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Stephanophorus* Strickl. 1841.

1. *caeruleus* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Catamblyrhynchus* Lafr. 1842.

1. *diadema* Lafr. — 2 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Sporophila* Cab. 1844.

1. *hypoleuca* („Ill.“ Leht.) — 2 ♂ Brasilien.

2. *intermedia* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 149] — 1 ♂ Venezuela;
1 St. [var. gula, speculo, crisso albis]
Bogota.
3. *plumbea* (Wied) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
4. *albogularis* (Spix) — 1 ♂ Brasilien.
5. *ornata* (Lcht.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 St. Bahia.
6. *caerulescens* (Vieill.) — 1 St. Brasilien.
7. *gutturalis* (Lcht.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 St.
Columbien; 1 St. Bogota.
8. *luctuosa* (Lafr.) — 1 ♂ Columbien; 1 ♂ Neu-Granada.
9. *collaria* (L.) — 2 ♂ Surinam; 1 ♀ Cayenne.
10. *lineola* (L.) — 2 ♂ Cayenne; 1 ♂ Trinidad.
11. *lineata* (Gm.) — 1 ♂ jun. Brasilien.
12. *Morelleti* („Puch.“ Bp.) — 1 ♀ Mexico.
13. *minuta* (L.) — 1 ♂, 1 St. Cayenne.
14. *nigroaurantia* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
15. *hypoxantha* (Lcht.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 150 Anm.] — 1 ♂
Montevideo.
16. *torqueola* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Mexico.

Genus *Catamenia* Bp. 1851.

1. *analís* (Lafr. et d'Orb.) — 1 St. Bolivien.
2. *analoides* (Lafr.) — 1 ♂ jun. Neu-Granada.

Genus *Oryzoborus* Cab. 1851.

1. *torridus* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ Rio Grande; 1 ♂,
1 ♀ [var. *minor*] Bogota.
2. *crassirostris* (Gm.) — 1 ♂ Guiana.
3. *aethiops* Sel. — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Loxigilla* Less. 1831.

1. *noctis* (L.) — 1 ♂ Martinique.

Genus *Coccoborus* Sws. 1837.

1. *caeruleus* (L.) — 2 ♂, 2 jun., 1 juv. Mexico.

2. *cyaneus* (L.) — 1 ♂, 2 ♂ jun. Bahia; 1 ♀ Yucatan.

Genus *Cyanocompsa* Cab. 1861.

1. *concreta* (Du Bus) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
2. *parellina* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
3. *cyanoides* (Lafr.) — 1 St. Cayenne.

Genus *Hedymeles* Cab. 1851.

1. *ludoviciana* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ Rock-Port (Ohio); 1 ♂ jun. Mexico; 1 ♂, 1 ♂ juv. Bogota.
2. *melanocephala* (Sws.) — 2 ♂ Nord-America; 2 ♀, 1 ♂ juv. Mexico; 1 jun. Bogota.

Genus *Pheucticus* Rehb. 1850.

1. *aureoventris* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Columbien; 1 ♂, 1 ♂ juv. Bogota; 1 ♂ Peru.
2. *chrysopeplus* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Peru; 1 ♂ Calacali (Ecuador).

Subfam. **Fringillinae.**

Genus *Fringilla* L. 1735.

1. *caelebs* L. — 3 ♂, 1 ♀, 1 ♀ [var. *albescens*], 1 Nest mit 3 Jungen, Harz.
2. *spodiogenys* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Marocco; 1 ♂ Tanger.
3. *montifringilla* L. — 4 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Wolga.

Genus *Montifringilla* Brehm 1828.

1. *nivalis* (L.) — 3 ♂ Schweiz.

Genus *Fringillanda* Hodgs. 1844.

1. *nemoricola* Hodgs. — 1 St. Ostindien.

Genus *Leucosticte* Sws. 1831.

1. *griseinucha* (Brandt) — 1 ♂, 1 juv. Insel S. Paul (Russ. Nord-America).
2. *brunneinucha* (Brandt) — 1 ♂, 1 ♀ Kamtschatka.
3. *arctoa* (Pall.) — 1 ♂ Russ. Nord-America; 1 ♀ Sibirien.

Genus *Passer* L. 1735.

1. *domesticus* (L.) — 5 ♂, 2 ♀, 1 ♂ [var. *variegata*], 1 ♂ [var. *pallida*], 1 St. [var. *alba*], 1 ♂ [var. *albo-variegata*] Harz; 1 ♀ [*Pyrgita intercedens* Brehm*] Chemnitz.
2. *Italiae* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Italien; 1 ♂ Lombardei.
3. *rufidorsalis* Brehm* — 1 ♂ Chartum.
4. *salicicolus* (Vieill.) — 1 ♂ Spanien; 1 ♂ Nil-Delta; 2 ♀, 1 ♂ jun. Nordost-Africa; 1 ♂ Constantine.
5. *arcuatus* (Gm.) — 1 St. Kaffernland; 1 St. Süd-Africa.
6. *indicus* Jard. et Selby — 1 St. Ostindien.
7. *montanus* (L.) — 3 ♂ Harz; 1 ♂ Manilla.
8. *rutilans* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Japan.

Genus *Pyrgitopsis* Bp. 1840.

1. *simplex* (Sws.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♀ Gold-Küste.
2. *Swainsoni* Rüpp. — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 ♂ Sennaar; 1 ♂ Senegal; 2 ♂ Abessinien.

Genus *Corospiza* Bp. 1850.

1. *Lichtensteini* (v. Heugl.) — 1 ♂ Sennaar.

Genus *Chrysospiza* Cab. 1851.

1. *lutea* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar; 1 ♂, 1 ♂ juv. Chartum.

Genus *Xanthodira* Sund. 1850.

1. *petronioides* (Lafr.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Petronia* Kaup 1829.

1. *stulta* (Gm.) — 1 ♂, 1 jun. Süd-Europa; 1 ♂ Griechenland; 1 ♂ Parnass.
2. *brachydactyla* (Hempr. et Ehr.) Cab. [Mus. Hein. I. p. 157] — 1 St. Abessinien.

Genus *Gymnorhis* Hodgs. 1844.

1. *flavicollis* (Frankl.) — 1 ♂ Decan.

Genus *Ligurinus* Koch 1816.

1. *chloris* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *chloroticus* (Licht., Bp.) — 1 St. Persien.
3. *kawarahiba* (Temm.) — 1 St. Japan.
4. *sinicus* (L.) — 1 St. China.

Genus *Mycerobas* Cab. 1847.

1. *melanoxanthus* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.

Genus *Hesperiphona* Bp. 1850.

1. *vespertina* (Coop.) — 1 ♂ Mexico.
2. *icteroides* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.

Genus *Eophona* Gould 1851.

1. *melanura* (Gm.) — 1 ♀ Amoy; 1 jun. Ostindien.
2. *personata* (Schleg.) — 1 ♂ Japan.

Genus *Coccothraustes* Behst. 1802.

1. *vulgaris* Pall. — 2 ♂ Harz; 1 ♀ Alger.

Genus *Carduelis* Cuv. 1799 — 1800.

1. *elegans* Steph. — 2 ♂, 2 juv. Harz.

Genus *Astragalinus* Cab. 1851.

1. *tristis* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ juv. Georgien.
2. *mexicanus* (Sws.) — 2 ♂, 1 ♀ Mexico; 2 St. Columbien.
3. *columbianus* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 159] — 1 ♂, 1 ♂ jun. Columbien; 1 ♂, 3 ♀ Bogota.

Genus *Chrysomitris* Boie 1828.

1. *pinus* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Schlesien.
2. *spinescens* (Licht., Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Columbien; 1 ♂ Bogota.
3. *notata* (Du Bus) — 1 ♂, 2 ♀ Mexico.
4. *pinus* (Wils.) — 1 St. Nord-America.
5. *magellanica* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Brasilien.
6. *barbata* (Mol.) — 1 ♂ Valdivia.
7. *atrata* (Lafr. et d'Orb.) — 2 ♂ Cordilleren von Chile.

Genus *Hypacanthis* Cab. 1851.

1. *spinoides* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Ostindien?

Genus *Aegiothus* Cab. 1851.

1. *linarius* (L.) — 4 ♂, 2 ♀ Harz.
2. *canescens* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Grönland.

Genus *Cannabina* Brehm 1828.

1. *linota* (Gm.) — 3 ♂, 3 ♀, 1 juv. Harz. .
2. *flavirostris* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Pommern.

Genus *Oraegithus* Cab. 1854.

1. *pusillus* (Pall.) — 2 St. Ostindien.

Genus *Citrinella* Bp. 1838.

1. *brumalis* (Scop.) — 1 St. Süd-Europa.

Subfam. Pyrrhulinae.

Genus *Serinus* Koch 1816.

1. *hortulanus* Koch — 3 ♂, 2 ♀, 1 ♂ juv. Süd-Europa.
2. *canicollis* (Sws.) — 1 ♂ Mauritius; 2 St. Süd-Africa.
3. *canarius* (L.) — 9 ♂, 1 ♀ Harz (aus Gefangenschaft).

Genus *Crithologus* Cab. 1851.

1. *alaris* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Crithagra* Sws. 1827.

1. *flaviventris* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
2. *chrysopyga* Sws. — 1 ♂ Mauritius.
3. *sulphurata* (L.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Bycanetes* Cab. 1851.

1. *githagineus* (Licht.) — 1 ♂ Nordost-Africa; 1 St. Sennaar.

Genus *Carpodacus* Kaup 1829.

1. *erythrinus* (Pall.) — 3 ♂ Sibirien.
2. *purpureus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Georgien.
3. *frontalis* (Say) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂, 1 ♀ Californien; 1 ♀ [*C. rhodocolpus* Cab.* Mus. Hein. I. p. 166] Mexico.
4. *roseus* (Pall.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Amur.

Genus *Uragus* Keys. et Blas. 1840.

1. *sibiricus* (Pall.) — 1 ♂ Sibirien.
2. *sanguinolentus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ juv. Amur.

Genus *Pyrrhula* Cuv. 1799—1800.

1. *rubicilla* Pall. — 4 ♂, 2 ♀, 1 hermaphr. Harz.

2. *erythrocephala* Vig. — 2 ♂ Himalaya.
3. *orientalis* Schleg. — 1 ♂, 1 ♀ St. Japan.
4. *cineracea* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Amur.

Subfam. Loxianae.

Genus *Pinicola* Vieill. 1807.

1. *enucleator* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Harz; 2 ♂ Russland; 1 ♀ Archangel.
2. *canadensis* (Brehm) — 1 ♂ Labrador; 1 ♀ Illinois.

Genus *Haematospiza* Blyth 1844.

1. *sipahi* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.

Genus *Loxia* L. 1758.

1. *curvirostra* L. — 1 ♂, 3 ♀, 2 jun. Harz.
 2. *pityopsittacus* Behst. — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
 3. *balearica* v. Hom.* — 1 ♂ juv. Mallorca.
 4. *americana* (Wils.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
 5. *leucoptera* Gm. — 2 ♂, 1 ♀ Nord-America.
 6. *mexicana* Strickl. — 1 ♂ Mexico.
-

Fam. Ploceidae.

Subfam. Spermostinae.

Genus *Habropyga* Cab. 1847.

1. *astrild* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
2. *cinerea* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa.
3. *melopoda* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal.
4. *natalensis* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 170] — 1 ♂ Natal.

Genus *Sporaeginthus* Cab. 1851.

1. *subflavus* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal.
2. *amandava* (L.) — 2 ♂, 2 ♀, 2 jun. Ostindien.

Genus *Aegintha* Cab. 1851.

1. *temporalis* (Lath.) — 1 ♂ Australien; 2 ♂ Port Albert (Gippsland).

Genus *Zonaeginthus* Cab. 1851.

1. *nitidus* (Lath.) — 1 St. Australien.

Genus *Uraeginthus* Cab. 1851.

1. *phoenicotis* (Sws.) — 1 ♂, 2 ♀ Senegal; 1 ♂ Melpes (Cordofan).
2. *granatinus* (L.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Lagonosticte* Cab. 1851.

1. *rubricata* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♂ Natal.
2. *minima* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal.
3. *senegala* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Senegal.
4. *caerulescens* (Vieill.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Zonogastris* Cab. 1851.

1. *citerior* (Strickl.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ Keren (Abessinien); 1 ♀ Süd-Africa.

2. *melba* (L.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Hypargus* Rehb. 1863.

1. *niveiguttatus* (Ptrs.) — 1 ♂ Mozambique.

Genus *Stagonopleura* Rehb. 1850.

1. *guttata* (Shaw) — 1 ♂ Australien; 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♀ Port-Albert.
2. *castanotis* (Gould) — 1 ♂, 2 ♀ West-Australien.

Genus *Donacola* Gould 1841.

1. *castanothorax* Gould — 1 ♂ Cap York.

Genus *Poëphila* Gould 1842.

1. *cincta* Gould — 1 ♂ Liverpool-Ebene (Australien).

Genus *Erythrura* Sws. 1837.

1. *prasina* (Sparrm.) — 1 ♀ Java.
2. *trichroa* (Kittl.) — 1 ♂ Timor.

Genus *Sporothlastes* Cab. 1847.

1. *fasciatus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♂, 1 ♀ Africa; 1 ♂ [var.] Africa.
2. *erythrocephalus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Spermestes* Sws. 1837.

1. *cucullatus* Sws. — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ Insel S. Thomé.
2. *poënsis* (Fras.) — 1 ♂ Gabun.
3. *fuscans* Cass. — 1 ♂, 1 ♀ Sarawak (Borneo).

Genus *Amauresthes* Rehb. 1863.

1. *fringilloides* (Lafr.) — 1 ♂ Zanzibar.

Genus *Uroloncha* Cab. 1851.

1. *striata* (L.) — 1 ♂ Ostindien.
2. *melanopygia* (Rehb.) — 1 ♂, 1 ♀ Borneo.
3. *cantans* (Gm.) — 2 St. Nubien; 2 St. Sennaar.
4. *molucca* (L.) — 1 St. Morty-Insel; 1 St. Formosa.

5. *punctularia* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Ostindien; 1 ♂ juv. Malacca;
1 pull. Java.
6. *undulata* (Lath.) — 1 ♂, 1 St. Ostindien.
7. *topela* (Swinh.) — 1 St. Südwest-Formosa.

Genus *Dermophrys* Hodgs. 1841.

1. *malacca* (L.) — 2 St. Ostindien.
2. *atricapilla* (Vieill.) — 1 St. Borneo.
3. *maja* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.
4. *malabarica* (L.) — 1 St. Saihatti (Ostindien).

Genus *Oryzornis* Cab. 1851.

1. *oryzivora* (L.) — 3 ♂, 2 St. [var.] Ostindien; 1 juv. Java.

Genus *Nigrita* Strickl. 1842.

1. *bicolor* Hartl. — 1 ♂ Gold-Küste.
2. *canicapilla* (Strickl.) — 1 ♂ Gold-Küst

Subfam. Viduanae.

Genus *Hypochera* Bp. 1850.

1. *nitens* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀, 1 juv. Senegal.
2. *ultramarina* (Gm.) — 2 ♂, 1 jun., 2 juv. Nordost-Africa.

Genus *Vidua* Cuv. 1799 — 1800.

1. *principalis* (L.) — 2 ♂ Senegal.

Genus *Linura* Rehw. 1882.

1. *Fischeri* Rehw.* — 1 ♂ Uşegua (Ost-Africa).

Genus *Steganura* Rehb. 1850.

1. *paradisica* (L.) — 3 ♂ Süd-Africa; 1 ♂ jun. Abessinien.
2. *sphenura* (Verr.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Chera* Gray 1849.

1. *caffra* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Cap.

Genus *Penthetria* Cab. 1847.

1. *macrocerca* (Leht.) — 1 ♂, 1 juv. Abessinien.
2. *macrura* (Gm.) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♂ Gold-Küste.
3. *axillaris* (Smith) — 1 ♂ [Uebergangskleid] Mozambique.
4. *laticauda* (Leht.) — 1 ♂, 1 juv. Abessinien.
5. *ardens* (Bodd.) — 2 ♂ Cap.
6. *albonotata* (Cass.) — 1 ♂ Lindi (Ost-Africa).

Genus *Orynx* Rehb. 1850.

1. *capensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Süd-Africa.
2. *approximans* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 177] — 1 ♂ Süd-Africa.
3. *xanthomelas* (Rüpp.) — 1 ♂ Maudera (Ost-Africa).

Genus *Calyphantria* Heine 1860.

1. *erythrocephala* (Gm.) — 1 ♂ juv. Mauritius.

Genus *Euplectes* Sws. 1829.

1. *oryx* (L.) — 2 ♂ Süd-Africa.
2. *franciscanus* (Isert.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Nordost-Africa;
1 ♂ Chartum.
3. *abyssinicus* (Gm.) — 1 ♂ Senegal.
4. *flammiceps* Sws. — 1 ♂ West-Africa.
5. *nigriventris* Cass. — 1 ♂ Zanzibar.
6. *diadematus* Rchw.* — 1 ♂ Malindi (Ost-Africa).

Subfam. Ploceinae.

Genus *Philetaerus* Smith 1837.

1. *socius* (Lath.) — 1 ♂ Kaffernland.

Genus *Sporopipes* Cab. 1847.

1. *lepidopterus* (Leht.) — 1 ♂ Kaffernland.
2. *frontalis* (Vieill.) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♀ Melpes (Cordofan).

Genus *Coryphegnathus* Rehb. 1840.

1. *albifrons* (Vig.) — 2 juv. Port Natal.
2. *capitalbus* Bp. — 1 ♂ Guinea-Küste.

Pyrenestes Genus Sws. 1837.

1. *ostrinus* (Vieill.) — 1 ♂ juv. Gabun.
2. *coccineus* Cass. — 1 ♂, 1 ♀ Gabun.

Genus *Spermospiza* Gray 1840.

1. *haematina* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ Gambia.
2. *guttata* (Vieill.) — 1 ♂ West-Africa; 1 ♂ juv. Casamanze (West-Africa); 1 ♀ [*Sp. immaculosa* Rehw.] West-Africa.

Genus *Philagrus* Cab. 1851.

1. *mahali* (Smith) — 1 ♂ Kaffernland.

Genus *Hyphantica* Cab. 1851.

1. *sanguinirostris* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 3 jun. Senegal.
2. *erythrops* (Hartl.) — 1 ♂ Gabun.
3. *aethiopica* (Sund.) — 1 ♂ Chartum; 1 ♀ Sennaar.

Genus *Ploceus* Cuv. 1817.

1. *philippinus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ juv. Ostindien.
2. *baja* Blyth — 1 ♂, 1 ♂ juv., 2 ♀ Ostindien; 1 ♂ Java.
3. *hypoxanthus* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Sunda-Inseln.

Genus *Sitagra* Rehb. 1850.

1. *luteola* (Lcht.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂, 1 ♀ Gold-Küste.

Genus *Hyphantornis* Gray 1849.

1. *textor* (Gm.) — 1 ♂ West-Africa.
2. *nigriceps* Layard — 1 ♂, 1 ♀ Kipini (Ost-Africa).
3. *Cabanisi* Ptrs. — 1 ♂ jun. Mozambique.
4. *mariquensis* (Smith) — 1 ♀ Africa.
5. *galbula* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar; 1 ♂ Chartum.
6. *vitellinus* (Leht.) — 1 ♂ Chartum.
7. *nigrifrons* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 182] — 1 ♂ Kaffernland.
8. *capensis* (Smith) — 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♀ Cap.

9. *spilonotus* (Vig.) — 1 ♂ West-Africa; 1 ♂ Cap.
10. *aurifrons* (Temm.) — 1 jun. Cap.
11. *abyssinicus* (Gm.) — 1 ♀ Sennaar.
12. *Bojeri* Hartl. et Finsch — 1 ♂ Malindi (Ost-Africa).
13. *castanosoma* Rehw.* — 1 ♂ Berdera (Ost-Africa).
14. *nigerrimus* (Vieill.) — 1 St. West-Africa.

Genus *Hyphanturgus* Cab. 1851.

1. *ocularis* (Smith) — 1 ♀ Port-Natal.
2. *brachypterus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Senegal; 1 ♀ Casamanze (West-Africa).
3. *nigricollis* (Vieill.) — 1 ♀ [*H. melanoxanthus* Cab.] Malindi (Ost-Africa).
4. *aurantius* (Vieill.) — 1 ♂ juv. Congo.
5. *axillaris* (Heugl.) — 1 St. Sennaar.

Genus *Sycobrotus* Cab. 1851.

1. *bicolor* (Vieill.) — 2 ♂ Kaffernland.
2. *Kersteni* Hartl. et Finsch — 1 ♂ Engatana (Ost-Africa).

Genus *Anaplectes* Rehb. 1850.

1. *jonquillaceus* (Vieill.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Sycobius* Vieill. 1816.

1. *scutatus* Cass. — 1 ♂ Gold-Küste.
2. *nitens* (J. E. Gray) — 1 ♂ West-Africa.
3. *melanotis* (Lafr.) — 1 ♂ juv. West-Africa.

Genus *Textor* Temm. 1822.

1. *alecto* Temm. — 2 ♂ Abessinien.
2. *Dinemelli* Horsf. — 1 ♂ Nubien.

Fam. Icteridae.

Subfam. Icterinae.

Genus *Hyphantes* Vieill. 1816.

1. *Baltimorae* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ juv. New-Jersey.
2. *costototl* (Gm.) — 1 ♂ Californien; 1 ♂ S. Francisco; 1 ♂ juv. La Parada (Mexico).

Genus *Xanthornus* Cuv. 1799—1800.

1. *spurius* (L.) — 3 ♂, 4 ♀, 1 ♂ jun. Nord-America.
2. *affinis* (Lawr.) — 1 ♂ Mexico.
3. *bonana* (L.) — 1 ♂ Martinique.
4. *prothemelas* (Strickl.) — 1 ♂ Mexico.
5. *maculialatus* (Cass.) — 1 ♂ Mexico.
6. *Wagleri* (Scl.) — 2 ♂ juv. Mexico; 1 ♂ Xalapa.
7. *auricapillus* (Cass.) — 2 ♂, 1 ♀ Porto-Cabello.
8. *chrysocephalus* (L.) — 1 ♂ Guiana.
9. *cayanensis* (L.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♂ Guiana.
10. *dominicensis* (L.) — 1 St. Haïti.
11. *Parisorum* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Mexico.

Genus *Icterus* Briss. 1760.

1. *melanocephalus* Wagl. — 2 ♂ Mexico; 2 ♂ Xalapa.
2. *Auduboni* Giraud — 1 ♂ Cordova (Mexico).
3. *Giraudi* Cass. — 2 ♂ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Venezuela.
4. *mesomelas* Wagl. — 1 ♂ Cordova (Mexico); 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).
5. *vulgaris* Daud. — 1 ♂ Caracas.
6. *jamacai* (Gm.) — 3 ♂ Brasilien.

7. *croconotus* (Wagl.) — 2 ♂ Guiana; 1 ♂ Venezuela.
8. *gularis* (Wagl.) — 1 ♂ Xalapa.
9. *xanthornus* (L.) — 1 ♂, 1 jun. Guiana; 1 ♂ Venezuela.
10. *pustulatus* (Wagl.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Archiplanus* Cab. 1851.

1. *albirostris* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Rio-Grande.

Genus *Cassiculus* Sws. 1827.

1. *melanicterus* (Bp.) — 1 St. Mexico.
2. *leucorhamphus* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
3. *flavicrissus* (Scl.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Cassicus* Briss. 1760.

1. *haemorrhous* Daud. — 4 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *icteronotus* Vieill. — 3 ♂, 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Venezuela; 1 ♂ Caracas.
3. *uropygialis* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Ostinops* Cab. 1851.

1. *cristatus* (Gm.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ Venezuela; 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *viridis* (Bodd.) — 2 ♀ Venezuela; 1 ♂ Surinam.
3. *Alfredi* (Desm.) — 1 ♂ Bolivien.
4. *atrocastaneus* Cab. — 1 ♀ Nanegal (Ecuador).
5. *sincipitalis* Cab. — 2 ♀ Bogota.
6. *Yuracarium* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Bogota.
7. *Montezumae* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.

Subfam. **Agelaeinae.**

Genus *Dolichonyx* Sws. 1827.

1. *oryzivorus* (L.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂ Georgien.

Genus *Agelaius* Vieill. 1816.

1. *phoeniceus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Carolina; 1 ♂ jun. Nord-America.
2. *gubernator* (Wagl.) — 1 ♂ Californien.
3. *humeralis* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Cuba.
4. *tricolor* (Aud.) — 1 ♂ S. Francisco.

Genus *Xanthocephalus* Bp. 1850.

1. *icterocephalus* Bp. [*Icterus xanthocephalus* Bp.] — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Agelasticus* Cab. 1851.

1. *thilius* (Mol.) — 1 ♂, 2 ♀ Chile.
2. *xanthocarpus* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Peru.

Genus *Xanthosomus* Cab. 1851.

1. *icterocephalus* (L.) — 2 ♂ Cayenne; 1 ♂, 1 ♀ Baranquilla (Neu-Granada).
2. *frontalis* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Gymnomystax* Rehb. 1850.

1. *melanicterus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien; 1 ♂ Para.

Genus *Leistes* Vig. 1825.

1. *viridis* (Gm.) — 2 ♂ Brasilien.
2. *curaeus* (Mol.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Amblyramphus* Leach 1814.

1. *holosericeus* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Montevideo.

Genus *Amblycercus* Cab. 1851.

1. *Prevosti* (Less.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Costa-Rica; 1 ♀ Esmeraldas (Ecuador); 1 ♂ jun. Bogota.

Genus *Pedotribes* Cab. 1851.

1. *guianensis* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Guiana; 1 ♂ Venezuela;
1 St. Columbien.

Genus *Pezites* Cab. 1851.

1. *loyca* (Mol.) — 4 ♂, 2 ♀ [gula alba] Chile.
2. *brevirostris* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 191] — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂
Peru.

Genus *Sturnella* Vieill. 1816.

1. *ludoviciana* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ juv. Nord-America;
1 ♂ [*mexicana* Sc.] Mexico; 1 ♂, 1 ♀ [*meridionalis* Sc.] Bogota; 1 ♂ Columbien.
2. *hippocrepis* Wagl. — 1 ♀, 1 jun. Cuba.

Subfam. Scaphidurinae.

Genus *Molothrus* Sws. 1831.

1. *pecoris* (Gm.) — 1 ♂ Nord-America.
2. *aeneus* (Wagl.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Costa-Rica; 1 ♀ Duennas
(Guatemala).
3. *bonariensis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀, 2 ♂ jun. Brasilien; 1 ♂, 1 ♂ [var.]
Venezuela; 1 ♂ [var.] Ost-Peru (?); 2 ♂
[*Icterus sericeus* Leht.] Baranquilla (Neu-
Granada); 1 St. Porto-Cabello; 1 ♂ juv.
Cordova (Argentinien).
4. *atronitens* Cab. — 2 ♂ jun. Cayenne.
5. *brevirostris* Sws. — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Aphobus* Cab. 1851.

1. *chopi* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Macragelacus* Cass. 1866.

1. *subalaris* (Boiss.) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Lampropsar* Cab. 1847.

1. *guianensis* Cab. — 1 ♂ Guiana.
2. *dives* Cab. — 1 ♂ Mexico.
3. *Warszewiczi* Cab. — 1 St. Peru.

Genus *Cassidix* Less. 1831.

1. *oryzivora* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Surinam.
2. *atra* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Porto-Cabello; 1 ♂ Venezuela.

Genus *Scolecophagus* Sws. 1831.

1. *niger* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Nord-America; 1 ♂ jun. Texas.
2. *cyanocephalus* (Wagl.) — 1 ♂ Mexico.
3. *atroviolaceus* (d'Orb.) — 1 ♀ Cuba.

Genus *Chalcophanes* Wagl. 1827.

1. *quiscalus* (L.) — 3 ♂ Nord-America.
 2. *purpuratus* (Sws.) — 1 ♂ Georgien; 1 ♀ Nord-America.
 3. *major* (Vieill.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Florida; 1 ♂ juv. Tennessee.
 4. *macrurus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
 5. *baritus* (L.) — 1 ♂ Cuba.
 6. *lugubris* (Sws.) — 1 St. Brasilien.
 7. *tenuirostris* (Sws.) — 1 ♀ Mexico.
 8. *minor* Cab. — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 St. Surinam; 1 St. Angostura.
-

Fam. Sturnidae.

Subfam. Lamprotornithinae.

Genus *Pholidauges* Cab. 1851.

1. *leucogaster* (Gm.) — 2 ♂ West-Africa; 1 ♀ Senegal.
2. *Verreauxi* Boc. — 1 ♂, 1 ♀ Pangani (Ost-Africa).

Genus *Notauges* Cab. 1851.

1. *bicolor* (Gm.) — 1 ♀ Süd-Africa.
2. *chrysogaster* (Gm.) — 2 ♂ Abessinien.
3. *superbus* (Rüpp.) — 1 ♂ Barawa (Ost-Africa).

Genus *Lamprocolius* Sund. 1836.

1. *chalybaeus* (Ehrb.) — 1 ♂ Senegal.
2. *chalcurus* v. Nordm. — 1 St. Senegal.
3. *phoenicopterus* Sws. — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
4. *auratus* (Gm.) — 2 ♂ Senegal.
5. *splendidus* (Vieill.) — 1 ♂ Senegambien.
6. *ignitus* (Lcht.) — 1 ♂ Ilha do Principe (West-Africa).
7. *melanogaster* (Sws.) — 1 St. Usaramo (Ost-Africa).
8. *sycobius* (Lcht.) — 1 ♂ Lindi (Ost-Africa).

Genus *Urauges* Cab. 1851.

1. *aeneus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland (?); 1 ♂ Senegal.
2. *Eytoni* (Fras.) — 1 ♂ Senegal.
3. *purpureopterus* (Rüpp.) — 1 ♂ Sennaar; 2 ♂ Abessinien.
4. *Burchelli* (Smith) — 1 ♂ Kaffernland.

Genus *Onychognathus* Hartl. 1849.

1. *fulgidus* Hartl. — 1 ♂ Insel S. Thomé.

Genus *Streptocitta* Bp. 1850.

1. *albicollis* (Vieill.) — 2 ♂ Celebes.

Genus *Calornis* Gray 1841.

1. *panayensis* (Scop.) — 2 ♂ Manilla.
2. *insidiator* (Raffl.) — 2 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ Malacca.
3. *minor* (Müll., Bp.) — 2 ♂ Timor.
4. *neglecta* Wald. — 1 St. Celebes.
5. *obscura* (Forst.) — 1 ♂ Sula-Inseln; 2 ♂ Mysol; 1 ♀ juv. Salavatty.
6. *cantoroides* Gray — 1 ♂, 1 ♀ juv. Mysol.
7. *metallica* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap York.
8. *atrifusca* (Peale) — 1 ♀ Upolu (Samoa-Inseln).

Genus *Amydrus* Cab. 1851.

1. *morio* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap.
2. *Tristrami* ScL. — 1 ♂ Cap.

Genus *Pilorhinus* Cab. 1851.

1. *albirostris* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 St. Abessinien.

Genus *Aplonis* Gould 1836.

1. *brevirostris* (Peale) — 1 St. Uvea (Wallis-Inseln).

Genus *Enodes* Temm. 1838.

1. *erythrophrys* Temm. — 1 ♀ Menado.

Genus *Scissirostrum* Lafr. 1845.

1. *dubium* (Lath.) — 1 ♂ Celebes; 1 St. Ostindien.

Genus *Saroglossa* Hodgs. 1844.

1. *spiloptera* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya.

Subfam. Buphaginae.

Genus *Buphaga* L. 1766.

1. *africana* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 St. Süd-Africa.
2. *erythrorhyncha* (Stanl.) — 1 ♂ Nordost-Africa.

Subfam. Sturninae.

Genus *Sturnus* L. 1735.

1. *vulgaris* L. — 2 ♂, 2 ♀, 1 juv. Harz.
2. *Poltaratzkyi* Finsch — 1 ♂ Katon Karagai (Altai).
3. *unicolor* Marm. — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Sardinien.
4. *cineraceus* Temm. — 1 ♂, 1 juv. Amur.

Genus *Psarites* Cab., Bp. 1850.

1. *contra* (L.) — 1 ♂ Ostindien.
2. *jalla* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Laceryzon* Heine [*Gracupica* (!) Less. 1831].

1. *nigricollis* (Payk.) — 1 St. Amoy.

Genus *Pastor* Temm. 1815.

1. *roseus* (L.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Wolga; 1 ♀ Russland; 1 juv. Tamak (Krim).

Genus *Sturnia* Less. 1837.

1. *daurica* (Pall.) — 2 ♂, 1 ♀ Ostindien.

Genus *Temenuchus* Cab. 1851.

1. *pagodarum* (Gm.) — 1 ♂ Ostindien.
2. *malabaricus* (Gm.) — 2 ♂ Ostindien.

Genus *Acridotheres* Vieill. 1816.

1. *tristis* (L.) — 2 ♂ Ostindien.
2. *cristatellus* (L.) — 1 ♂ China.
3. *javanicus* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 205] — 1 ♂, 1 ♀ Java.
4. *fuscus* (Wagl.) — 1 ♂ Ostindien.
5. *ginginianus* (Lath.) — 1 St. Nepal.
6. *melanopterus* (Daud.) — 1 St. Java; 1 St. Borneo.

Genus *Dilophus* Vieill. 1816.

1. *carunculatus* (Gm.) — 1 ♂, 1 St. Cap; 1 ♀ Port-Natal.

Genus *Gymnops* Cuv. 1829.

1. *tricolor* (Müll.) — 1 ♂ Philippinen.

Subfam. Graculinae.

Genus *Gracula* L. 1758.

1. *religiosa* L. — 1 St. Decan.
2. *intermedia* Hay — 1 St. Nepal.
3. *javana* (Cuv.) — 3 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ Malacca.
4. *ptilogenys* Blyth — 1 ♂ Ceylon.

Genus *Eumathes* Heine [*Mino* (!) Less. 1828].

1. *Dumonti* (Less.) — 1 St. Neu-Guinea.

Genus *Melanopyrrhus* Bp. 1853.

1. *anais* (Less.) — 1 St. Neu-Guinea.

Genus *Basilornis* „Temm.“ Bp. 1850.

1. *celebensis* „Temm.“ Bp. — 1 ♂ Gorontalo (Celebes).
-

Fam. Paradiseidae.

Subfam. Oriolinae.

Genus *Artamus* Vieill. 1816.

1. *leucogaster* (Val.) — 1 St. Java; 2 St. Manilla; 1 St. Luzon;
1 St. Timor; 1 St. Mysol; 1 St. Morotai
(Molukken).
2. *melaleucus* (Forst.) — 1 ♂ Neu-Caledonien.
3. *fuscus* Vieill. — 1 ♂, 1 St. Ostindien; 1 ♀ jun. Nepal.
4. *personatus* Gould — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
5. *perspicillatus* (Temm., Bp.) — 1 St. Timor.
6. *sordidus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♂ juv. West-Australien.
7. *superciliosus* Gould — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Australien.

Genus *Analcipus* Sws. 1831.

1. *cruentus* (Wagl.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.
2. *Trailli* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ juv. Nepal.

Genus *Oriolus* L. 1766.

1. *galbula* L. — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun., 1 pull., 1 nid. Harz.
2. *kundoo* Sykes — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
3. *auratus* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀ jun. West-Africa; 1 ♀, 1 ♂ juv.
Senegal.
4. *notatus* Ptrs. — 1 ♂ Zanzibarküste.
5. *Broderipi* Bp. — 1 ♂ Lombok.
6. *hippocrepis* Wagl. — 2 ♂ Java; 1 ♂ Sumatra.
7. *temuirostris* Blyth — 1 ♂ Ostindien [?].

8. *indicus* Jerd. — 1 ♀ China.
9. *chinensis* L. [*acrorhynchus* Vig.] — 1 ♂, 1 ♀ Luzon; 1 ♀ China.
10. *frontalis* Wall. — 1 ♂ Sula-Inseln.
11. *larvatus* Licht. — 2 ♂ Kaffernland; 3 ♂ jun. Port Natal.
12. *monachus* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Abessinien.
13. *melanocephalus* L. — 2 ♂, 1 ♂ juv. Nepal.
14. *ceylonensis* Bp. — 1 ♂ Ceylon.
15. *xanthonotus* Horsf. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Java; 1 jun. Malacca.

Genus *Mimeta* Vig. et Horsf. 1826.

1. *viridis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀, 2 St. Australien.
2. *viridissima* Heine* [Journ. Orn. 1859 p. 403] — 1 ♂ ad., 1 jun.
Neu-Guinea.
3. *striata* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Mysol.
4. *viridifusca* Heine* [Journ. Orn. 1859 p. 405] — 2 St. Timor.
5. *Forsteni* Bp. — 2 St. Ceram.
6. *buruensis* (Quoy et Gaim.) — 1 St. Buru.

Genus *Sericulus* Sws. 1825.

1. *mellinus* (Lath.) — 2 ♂, 1 juv. Australien; 1 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Sphecotheres* Vieill. 1816.

1. *viridis* Vieill. — 1 ♂ jun. Timor.
2. *Salvadorii* Sh. — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♂ Timor [?].
3. *maxillaris* (Lath.) — 1 ♀ Australien.

Genus *Chlamydodera* Gould 1837.

1. *nuchalis* (Jard. et Selby) — 1 ♀ Australien.
2. *maculata* Gould — 1 ♂, 1 ♂ jun. Australien.

Genus *Ptilorhynchus* Kuhl 1820.

1. *holosericeus* Kuhl — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Ailuroedus* Cab. 1851.

1. *Smithi* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

2. *buccoides* (Temm.) — 1 ♂ Aru-Inseln.

Subfam. Paradiseinae.

Genus *Semioptera* Gray 1859.

1. *Wallacei* (Gray) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Batschian.

Genus *Cicinnurus* Vieill. 1816.

1. *regius* (L.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♀, 1 ♂ jun. Aru-Inseln.

Genus *Diphyllodes* Less. 1835.

1. *magnifica* (Penn.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Paradisea* L. 1735.

1. *apoda* L. — 3 ♂ Neu-Guinea.
2. *minor* Shaw — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Guinea.

Genus *Uranornis* Salvad. 1876.

1. *rubra* (Lac.) — 1 ♂ Waigiou.

Genus *Parotia* Vieill. 1816.

1. *sefilata* (Penn.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Subfam. Epimachinae.

Genus *Ptilorhis* Sws. 1825.

1. *paradisea* Sws. — 2 ♂, 2 ♀ Australien.

Genus *Craspedophora* Gray 1840.

1. *magnifica* (Vieill.) — 2 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Epimachus* Cuv. 1817.

1. *speciosus* (Bodd.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Astrapia* Vieill. 1816.

1. *nigra* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Guinea.

Genus *Seleucides* Less. 1835.

1. *nigricans* (Shaw) — 2 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Falculia* Geoffr. 1836.

1. *palliata* Geoffr. — 1 ♀ Somberano (Madagascar).

Subfam. Chalybaeinae.

Genus *Chalybaeus* Cuv. 1829 [*Manucodia* (!) Bodd. 1783].

1. *viridis* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Guinea.
2. *Keraudreni* (Less. et Garn.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
3. *ater* (Less.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♀ Waigiou.

Genus *Lycocorax* Bp. 1853.

1. *pyrrhopterus* (Temm.) Bp. — 1 ♀ Batschian.
2. *morotensis* Bernst. — 1 ♂ Morty-Insel.

Subfam. Eurycerotinae.

Genus *Euryceros* Less. 1830.

1. *Prevosti* Less. — 1 ♂ Antsondirina (Madagascar); 1 ♂ Ambomalaza (Madagascar).

Fam. Corvidae.

Subfam. Glaucopinae.

Genus *Crypsirhina* Vieill. 1816.

1. *varians* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Platysmurus* Rehb. 1850.

1. *leucopterus* (Temm.) — 2 ♂ Sumatra.
2. *aterrimus* (Temm.) — 1 ♂ Sumatra.

Genus *Dendrocitta* Gould 1833.

1. *rufa* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Bengalen.
2. *himalayensis* (Blyth) — 2 ♂ Ostindien.
3. *frontalis* McClell. — 1 ♂ Nepal.
4. *leucogastra* Gould — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Ostindien.

Genus *Cryptorhina* Wagl. 1827.

1. *afra* (L.) — 1 ♂, 1 St. West-Africa; 1 ♂ [*poecilorhyncha* Wagl.] Abessinien; 1 ♂ Sennaar.

Genus *Struthidea* Gould 1836.

1. *cinerea* Gould — 1 St. Neu-Süd-Wales.

Genus *Glaucopis* Gm. 1788.

1. *cinerea* Gm. — 1 St. Neu-Seeland.

Genus *Creadio* Vieill. 1816.

1. *carunculatus* (Gm.) — 2 St. Neu-Seeland.

Subfam. Garrulinae.

Genus *Platylophus* Sws. 1831.

1. *galericulatus* (Cuv.) — 2 St. Java.
2. *coronatus* (Raffl.) — 1 St. Borneo.
3. *ardesiacus* (Cab.*) [Mus. Hein. I. p. 219] — 1 St. Sumatra; 3 ♂,
1 ♂ jun. [*malaccensis* Cab.* Journ. Orn. 1866
p. 310] Malacca.

Genus *Perisoreus* Bp. 1831.

1. *infaustus* (L.) — 1 St., 1 ♂ jun. Schweden.
2. *canadensis* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ Labrador.

Genus *Garrulus* Briss. 1760.

1. *glandarius* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *japonicus* Schl. — 1 ♂ Japan.
3. *Brandti* Eversm. — 1 ♂ Altai.
4. *cervicalis* Bp. — 2 ♂, 2 ♀ Algier.
5. *bispecularis* Vig. — 1 ♂ Himalaya.
6. *Krynicky* Kalen. — 1 ♂ Smyrna.
7. *lanceolatus* Vig. — 2 St. Himalaya.

Genus *Cyanocitta* Strickl. 1845.

1. *cristata* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *Stelleri* (Gm.) — 1 ♂ Kamtschatka.
3. *coronata* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
4. *galeata* Cab.* [Mus. Hein. I. p. 222] — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Lophocorax* Kaup 1854.

1. *diadematus* (Bp.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Aphelocoma* Cab. 1851.

1. *californica* (Vig.) — 2 ♂, 1 ♀ S. Francisco (Californien).
2. *sordida* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
3. *ultramarina* (Bp.) — 1 ♂ juv. Mexico.

Genus *Cyanopoliis* Bp. 1849.

1. *cyaneus* (Pall.) — 1 ♂ Sibirien.
2. *Cooki* (Bp.) — 2 ♂, 1 jun. Spanien.

Genus *Cyanolyca* Cab. 1851.

1. *armillata* (Gray) — 1 ♂ Columbien.
2. *ornata* (Less.) — 2 ♂ Mexico.
3. *yucatanica* (Du Bois) — 1 ♂ Yucatan.
4. *melanocyanea* (Hartl.) — 1 St. Mexico.
5. *turcosa* (Bp.) — 1 ♂ Bogota.
6. *Beecheyi* (Vig.) — 1 ♂ Honduras.

Genus *Garrulina* Bp. 1834.

1. *nana* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico.
2. *unicolor* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Cyanocorax* Boie 1826.

1. *chrysops* (Vieill.) 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *cyanopogon* (Wied) — 1 St. Brasilien.
3. *affinis* v. Pelz. — 1 ♂ Neu-Granada.
4. *cayanus* (L.) — 1 ♂ Guiana.
5. *intermedius* Heine* [Journ. Orn. 1860 p. 116] — 1 ♂ Venezuela.
6. *mystacalis* (Geoffr.) [*C. uroleucus* Heine* Journ. Orn. 1860 p. 115] — 1 ♂ Bolivien.
7. *Slateri* Heine* [Journ. Orn. 1860 p. 115] — 1 ♂ Carthagera.

Genus *Xanthura* Bp. 1850.

1. *yncas* (Bodd.) — 1 ♂ Peru; 1 ♀ Bolivien.

2. *cyanocapilla* (Cab.) — 3 ♂, 1 ♀ Columbien; 1 ♂ Porto-Cabello.
3. *luxuosa* (Less.) — 1 ♂, 2 ♀ Xalapa.

Genus *Argurocitta* Heine 1860.

1. *cyanoleuca* (Wied) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Coronideus* Cab. 1851.

1. *violaceus* (Du Bus) — 1 ♂ [*Cyanocorax hyacinthinus* „Natt.“ Cab.*] Canuku-Gebirge (Guiana); 1 ♀ Bogota.
2. *caeruleus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Rio Grande.

Genus *Calocitta* Gray 1841.

1. *Bullocki* (Wagl.) — 1 ♂, 1 jun. Mexico.
2. *Collei* (Vig.) — 1 ♂ West-Küste von Mexico.

Genus *Psilorhynchus* Rüpp. 1837.

1. *morio* (Wagl.) — 2 ♂, 1 ♀ Xalapa.

Subfam. **Gymnorhininae.**

Genus *Gymnorhina* Gray 1840.

1. *tibicen* (Lath.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ West-Australien.
2. *leuconota* Gould — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
3. *hypoleuca* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Strepera* Less. 1831.

1. *graculina* (White) — 1 ♂ West-Australien.
2. *cuneicaudata* (Vieill.) — 1 ♂ West-Australien.

Subfam. Fregilinae.

Genus *Pyrhacorax* Vieill. 1816.

1. *alpinus* Vieill. — 1 St. Schweiz.

Genus *Cercoronus* Cab. 1847.

1. *melanorhamphus* (Vieill.) — 1 ♂ Australien; 1 pull. Neu-Süd-Wales.

Genus *Fregilus* Cuv. 1817.

1. *graculus* (L.) — 1 St. Schweiz.

Subfam. Corvinae.

Genus *Nucifraga* Briss. 1760.

1. *caryocatactes* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Harz.
2. *hemispila* Vig. — 1 ♂ Himalaya.
3. *multipunctata* Gould — 1 ♂ Kaschmir.

Genus *Pica* Briss. 1760.

1. *rustica* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ [*media* Blyth] China.
2. *mauritanica* Malh. — 1 ♂, 1 ♀ Algier.
3. *Nuttalli* (Aud.) — 1 ♂, 1 ♀ Californien.

Genus *Coloeus* Kaup 1829.

1. *monedula* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ var., 1 ♀ var. Harz.
2. *daurica* (Pall.) — 1 ♂ Altai.

Genus *Trypanocorax* „Kaup“ Bp. 1854.

1. *frugilegus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Harz.

Genus *Heterocorax* Sh. 1877.

1. *capensis* (Leht.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Corone* Kaup 1829.

1. *hiemalis* (Brehm) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *cornix* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun., 1 ♂ *rostrum monstrosum*, 1 ♀ var. *fusca*, 1 var. *albescens* Harz; 1 ♂ var. *Tangermünde* (Altmark).
3. *coronoides* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂ Australien.
4. *australis* (Gould) — 1 ♂ West-Australien.
5. *americana* (Aud.) — 1 St. Nord-America.
6. *mexicana* (Gm.) — 1 ♂ Mazatlan (Mexico).
7. *caurina* (Baird) — 1 ♀ Vancouver-Insel.
8. *umbrina* (Sund.) — 1 ♀ Ober-Egypten.
9. *validissima* (Schl.) — 1 ♂ Gilolo.
10. *valida* (Bp.) — 1 ♂ var. Sula-Inseln.
11. *enca* (Horsf.) — 2 St. Java; 1 St. Sunda-Inseln.
12. *philippina* (Bp.) — 1 St. Luzon.
13. *ossifraga* (Wils.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Microcorax* Sh. 1877.

1. *nasicus* (Temm.) — 1 ♂, 1 St. Cuba.

Genus *Amblycorax* Bp. 1850.

1. *violaceus* „Temm.“ Bp. — 1 St. Ceram.

Genus *Corvus* L. 1735.

1. *corax* L. — 1 ♂, 1 ♀ Harz.

2. *culminatus* Sykes — 1 ♂ Madras.
3. *macrorhynchus* Wagl. — 1 ♂ Java; 1 ♂ Johore (Malacca).

Genus *Pterocorax* Kaup 1854.

1. *scapulatus* (Daud.) — 1 ♂ Nord-Africa; 1 ♀ Süd-Africa ?.
2. *phaeocephalus* (Cab.*) [Mus. Hein. I. p. 232] — 2 ♂ Abessinien.
3. *torquatus* (Less.) — 1 ♂ Amoy.

Genus *Anomalocorax* Fitz. 1863.

1. *splendens* (Vieill.) — 1 St. Ostindien; 1 St. Madras.

Genus *Archicorax* Glog. 1842.

1. *albicollis* (Lath.) — 1 ♂ Süd-Africa.
2. *crassirostris* (Rüpp.) — 1 St. Nordost-Africa.

Genus *Gymnocorax* Sund. 1872 [*Gymnocorvus* (!)
Less. 1831].

1. *senex* (Less.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Ordo II. Clamatores.

Fam. Hypocnemididae.

Subfam. Eucichlinae.

Genus *Eucichla* Rchb. 1850.

1. *Boschi* (Müll. et Schl.) — 1 ♂ Sumatra.
2. *cyanura* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Java.
3. *Schwaneri* (Temmm.) — 1 ♂ Borneo.

Genus *Coloburiscus* Cab. et Heine 1859 [*Pitta* (!) Vieill. 1816].

1. *strepitans* (Temmm.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.
2. *cyanopectus* (Temmm.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♀ Malacca.
3. *malaccensis* (Scop.) — 1 ♂ Malacca.
4. *brachyura* (L.) — 1 ♂ Bengalen.
5. *concinna* (Gould) — 1 ♂ Lombok.
6. *cucullata* (Hartl.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
7. *Muelleri* (Bp.) — 1 ♀ Amboina.
8. *brevicauda* (Bodd.) — 1 ♂ Timor.
9. *Novae Guineae* (Müll. et Schl.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
10. *erythrogastra* (Cuv.) — 1 ♂ jun. Philippinen.
11. *rufiventris* Heine* [Journ. Orn. 1859 p. 406] — 1 ♂ Gilolo; 1 ♂ Batschian.

Genus *Phoenicicichla* Cab. et Heine 1859.

1. *granatina* (Temm.) — 1 ♂ Borneo; 1 ♀ Malacca.

Genus *Hydrornis* Blyth 1843.

1. *caerulea* (Raffl.) — 1 ♂ Sumatra.
2. *maxima* (Forst.) — 1 ♂ Gilolo.

Subfam. Paëctinae.

Genus *Paëctes* Sund. 1872 [*Philepitta* (!) Geoffr. 1838].

1. *jala* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Madagascar.

Subfam. Myiotherinae.

Genus *Myiotrichas* Boie 1831.

1. *imperatrix* („Natt.“ Lafr.) — 1 ♂ Rio Grande; 1 ♀ Brasilien.
2. *squamigera* (Prév.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Puellaro (Ecuador); 1 ♂ Bogota.
3. *guatemalensis* (Prév.) — 2 ♂ Mexico.
4. *monticola* (Lafr.) — 1 ♂ Peru; 1 St. Hab.?

Genus *Calobamon* Heine [*Pittasoma* (!) Cass. 1860].

1. *Michleri* Cass. — 1 ♂ Panama.

Genus *Chamaezosa* Vig. 1825.

1. *turdina* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 6] — 1 ♂ Columbien.
2. *ruficauda* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 6] — 1 ♂ Hab.?
3. *brevicauda* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Hypsibemon* Cab. 1847.

1. *ruficapillus* (Lafr.) — 1 ♂ Bogota.
2. *rufulus* (Lafr.) — 1 ♂, 2 ♀ Bogota.

Genus *Myrmornis* Herrm. 1783.

1. *analis* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Porto Cabello.
2. *cayanensis* (Bodd.) — 3 ♂ Brasilien.
3. *nigrifrons* (Gould) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂ Cayenne.
4. *moniliger* (Scl.) — 1 ♂ Mexico.
5. *pallidus* (Lawr.) — 1 ♂ Yucatan.

Subfam. Hypocnemidinae.

Genus *Conopophaga* Vieill. 1816.

1. *lineata* (Wied) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *melanops* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♀ Bahia.
3. *Maximiliani* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 8] — 3 ♂ Süd-Brasilien.

Genus *Corythopis* Sund. 1836.

1. *calcarata* (Wied) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Dasyptilops* Cab. et Heine 1859.

1. *albifrons* (Gm.) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♂ Guiana.

Genus *Anoplops* Cab. et Heine 1859.

1. *rufigula* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.

Genus *Myrmoborus* Cab. et Heine 1859.

1. *leucophrys* (Tschudi) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♂ Neu-Granada.
2. *obscurus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 9] — 1 ♂ jun. Cayenne.
3. *myiotherinus* (Spix) — 1 ♂ [*Hypocnemis melanosticta* Scl.] Neu-Granada; 1 ♀ [*H. melanolaema* Scl.] Bogota.
4. *angustirostris* (Cab.) — 1 St. Bogota.

Genus *Myrmonax* Cab. 1847.

1. *loricatus* (Lcht.) — 3 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *cinnamomeus* (Gm.) — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Hypocnemis* Cab. 1847.

1. *cantatrix* (Bodd.) — 1 ♂ Ost-Peru.

Genus *Pyriglena* Cab. 1847.

1. *leucoptera* (Vieill.) — 5 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *atra* (Sws.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Pernostola* Cab. et Heine 1859.

1. *funebis* (Lcht.) — 1 ♀ Surinam.
2. *nigrescens* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 10] — 1 ♂
Cayenne.

Fam. Eriodoridae.

Subfam. Eriodorinae.

Genus *Rhamphocaenus* Vieill. 1818.

1. *melamurus* Vieill. — 1 ♂ Brasilien.
2. *rufiventer* Bp. — 1 ♂ Bogota; 1 ♂ Coban (Guatemala).

Genus *Teremura* Cab. et Heine 1859.

1. *maculata* (Wied) — 1 ♂ Brasilien.
2. *caloptera* Scl. — 1 St. Pallatanga (Ecuador).

Genus *Ellipura* Cab. 1847.

1. *squamata* (Lcht.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *striata* (Spix) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien.
3. *ferruginea* (Lcht.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Formicivora* Sws. 1824.

1. *grisea* (Bodd.) — 4 ♂ Brasilien.
2. *rufatra* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.
3. *quixensis* (Corn.) — 1 ♂ Rio Napo (Ecuador).
4. *Boucardi* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
5. *intermedia* Cab. — 1 ♂ Bogota.

Genus *Myrmophila* Cab. et Heine 1859.

1. *brevicauda* (Sws.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *axillaris* (Vieill.) — 1 ♂ Cayenne.
3. *Menetriesi* (d'Orb.) — 1 ♂ Bogota; 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
4. *melana* (Scl.) — 1 ♂ Mexiana (Para).

Genus *Myrmotherium* Cab. et Heine 1859.

1. *pygmaeum* (Gm.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Rhopias* Cab. et Heine 1859.

1. *gularis* (Spix) — 1 ♂ Brasilien.

Subfam. **Thamnophilinae.**

Genus *Cercomacra* Scl. 1858.

1. *tyrannina* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂ juv. Bogota.
2. *nigricans* Scl. — 1 ♂, 1 ♂ juv. Babahoyo (Ecuador).

Genus *Dasycephala* Sws. 1831.

1. *cinerea* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *citrinopyga* Bp. — 1 ♂ Xalapa.
3. *uropygialis* Cab.* [Schomb. Reis. Guian. III. p. 686] — 1 ♀ Guiana.
4. *thamnophiloides* (Spix) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Thamnomanes* Cab. 1847.

1. *caesius* (Licht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Herpsilochmus* Cab. 1847.

1. *pileatus* (Licht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Dysithamnus* Cab. 1847.

1. *mentalis* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.
2. *semicinereus* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
3. *guttulatus* (Licht.) — 1 ♂ Brasilien.
4. *unicolor* Scl. — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Pygoptila* Scl. 1858.

1. *maculipennis* Scl. — 1 ♂ Cayenne.

2. *margaritata* Scl. — 1 ♂ Chanicuros (Peru).

Genus *Erionotus* Cab. et Heine 1859.

1. *caerulescens* (Vieill.) — 1 ♂ adol., 1 ♀ jun. Buenos-Ayres; 1 ♂ jun. Rio Grande; 1 ♂, 1 ♂ adol., 1 ♀ Brasilien.
2. *ambiguus* (Sws.) — 1 ♂ Brasilien.
3. *naevius* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♂ Guiana.

Genus *Hypolophus* Cab. et Heine 1859.

1. *cirrhatu*s (Gm.) — 1 ♂ Guiana; 2 ♂ Cayenne.
2. *albinuchalis* (Scl.) — 1 ♂ juv. Neu-Granada.
3. *pulchellus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 16] — 1 ♂ Carthagera.

Genus *Rhopochares* Cab. et Heine 1859.

1. *torquatus* (Sws.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
2. *argentinus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 17] — 1 ♂ Montevideo; 1 ♂ jun., 1 ♀ Buenos-Ayres.

Genus *Thamnophilus* Vieill. 1816.

1. *palliatu*s Licht. — 4 ♂, 3 ♀ Brasilien.
2. *doliatus* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien; 2 ♀ Cayenne.
3. *radiatus* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀ Mexiana (Para).
4. *affinis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 17] — 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Xalapa.
5. *multistriatus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ juv., 1 ♀ Neu-Granada.
6. *albicans* Lafr. — 1 ♂ Carthagera; 1 ♂ jun., 1 ♀ Bogota.
7. *immaculatus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♂ juv. Bogota.

Genus *Diallaetes* Rehb. 1850.

1. *maior* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.
2. *melanurus* (Gould) — 1 ♀ Neu-Granada.

3. *melanocrissus* (Scl.) — 1 ♂ Mexico.
4. *semifasciatus* Cab. — 1 ♀ Guiana.
5. *transandeanus* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Hypodaleus* Cab. et Heine 1859.

1. *guttatus* (Vieill.) — 1 ♂ juv. Brasilien.

Genus *Lochites* Cab. et Heine 1859.

1. *severus* (Licht.) — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *Leachi* (Such) — 1 ♂ Montevideo; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Thammarchus* Cab. et Heine 1859.

1. *cinereus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Rio Grande.

Genus *Biatas* Cab. et Heine 1859.

1. *nigripectus* (Lafr.) — 1 ♂ Brasilien.

Fam. Pteroptochidae.

Subfam. Pteroptochinae.

Genus *Scytalopus* Gould 1836.

1. *indigoticus* („Leht.“ Wied) — 1 ♂ Brasilien.
2. *senilis* (Lafr.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 St. [var. *maculis albis*] Bogota.
3. *griseicollis* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
4. *squamiger* (Lafr.) — 2 St. Bogota.

Genus *Triptorrhinus* Cab. 1847.

1. *paradoxus* (Kittl.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Araucana.

Genus *Acropternis* Cab. et Heine 1859.

1. *orthonyx* (Lafr.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Bogota.

Genus *Pteroptochus* Kittl. 1830.

1. *rubecula* Kittl. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Araucana.
2. *albicollis* Kittl. — 1 ♂ Araucana.

Genus *Hylactes* King 1830.

1. *megapodius* (Kittl.) — 1 ♂, 1 ♀ Araucana.
2. *Tarni* King — 1 ♂, 1 ♀ Araucana.

Subfam. Menurinae.

Genus *Menura* Davies 1802.

1. *Alberti* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Australien.
2. *superba* Davies — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Fam. Anabatidae.

Subfam. Furnariinae.

Genus *Geobates* Sws. 1837.

1. *pocillopterus* (Wied) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Geositta* Sws. 1837.

1. *cunicularia* (Vieill.) — 1 ♀ Patagonien.
2. *peruviana* Lafr. — 1 ♂ Peru.

Genus *Furnarius* Vieill. 1816.

1. *assimilis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 22] — 1 ♂ Brasilien.
2. *leucopus* Sws. — 1 ♂ Guiana; 1 ♂ Mexiana (Para).
3. *griseiceps* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 23] — 1 ♂ Peru.
4. *figulus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Bahia; 1 ♀ Brasilien.
5. *rufus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Rhodinocichla* Hartl. 1853.

1. *rosea* Hartl. — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Caracas.

Genus *Henicornis* Gray 1840.

1. *Gouldi* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 24], [*Eremobius phoeniceurus* Gould, *Enicornis melanura* Gray]
— 1 ♂ jun. Patagonien; 1 ♀ Chile.

Genus *Limnornis* Gould 1839.

1. *curvirostris* Gould — 1 ♀ Buenos-Ayres.

Genus *Coprotretis* Cab. et Heine 1859.

1. *dumetoria* (Geoffr. et d'Orb.) — 1 ♂ Patagonien.

Genus *Cillurus* Cab. 1844.

1. *minor* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 24] — 1 ♂ Araucana.

Genus *Lochmias* Sws. 1827.

1. *nematura* (Licht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Sclerurus* Sws. 1827.

1. *caudacutus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.
2. *mexicanus* Schl. — 1 ♂ Mexico.

Subfam. Synallaxinae.

Genus *Phleocryptes* Cab. et Heine 1859.

1. *melanops* (Vieill.) — 1 ♀ Chile.
2. *schoenobaenus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 26] — 1 ♂
Titicaca-See (Peru).

Genus *Schizura* Cab. 1847.

1. *Desmursi* (Gay) — 1 ♂ Chile.

Genus *Leptasthenura* Rehb. 1853.

1. *aegithaloides* (Kittl.) — 1 ♂ Chile; 1 ♂ Patagonien.

Genus *Synallaxis* Vieill. 1818.

1. *Spixi* Scl. — 2 ♂ Brasilien.
2. *guianensis* (Gm.) — 1 ♂ Cayenne.
3. *ruticilla* („Licht.“) Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 27] — 1 ♂
Buenos-Ayres.
4. *moesta* Scl. — 1 ♂, 1 jun. Bogota.
5. *curtata* Scl. — 1 ♂ Bogota.
6. *gularis* Lafr. — 1 ♂ Bogota.
7. *striaticollis* Lafr. — 1 ♂ Bogota.
8. *laemosticta* Scl. — 1 ♂ Neu-Granada.
9. *erythrothorax* Scl. — 1 ♂ Mexico.
10. *phryganophila* Vieill. — 1 ♀ Bolivien.
11. *castanea* Scl. — 1 ♂ Caracas.

Genus *Leptoxypura* Rehb. 1853.

1. *cinnamomea* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Margarornis* Rehb. 1853.

1. *squamigera* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada.
2. *brunnescens* Scl. — 1 ♀ Bogota.

Genus *Phacellodomus* Rehb. 1853.

1. *frontalis* (Leht.) — 1 ♂ Bahia.

Genus *Sphenopyga* Cab. 1847.

1. *anumbi* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Philydor* Spix 1824.

1. *superciliaris* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *Lichtensteini* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 29] — 1 ♂,
1 ♂ jun. Brasilien.
3. *rufus* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
4. *columbianus* Cab. et Heine — 1 ♂ Bogota.

Genus *Thripophaga* Cab. 1847.

1. *striolata* (Leht.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Thripadectes* ScL. 1861.

1. *flammulatus* (Eyt.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Otipne* Cab. et Heine 1859.

1. *Boissonneaui* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Caracas; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Homorus* Rchb. 1853.

1. *cristatus* (Spix) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Bolivien.

Genus *Ipoborus* Cab. et Heine 1859.

1. *sulphurascens* (Leht.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *montanus* (Tsch.) — 1 ♂ Brasilien.
3. *ferruginolentus* (Wied.) — 1 ♂ Bahia.
4. *cervinigularis* (ScL.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Xenicopsis* Cab. et Heine 1859.

1. *fusca* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *rufosuperciliata* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *variegiceps* (ScL.) — 1 ♂ Cordova (Mexico).
4. *temporalis* (ScL.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Xenops* „Hoffmannsegg“ Ill. 1811.

1. *rutilus* Leht. — 1 ♀ Brasilien.

2. *heterurus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 33] — 1 ♂ Columbien; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
3. *littoralis* ScL. — 1 ♂ Bogota.
4. *mexicanus* ScL. — 1 ♂ Mexico.
5. *genibarbis* Ill. — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Subfam. Dendrocolaptinae.

Genus *Sittosomus* Sws. 1827.

1. *erithacus* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *pectinicaudus* Cab. — 1 ♂ Mexico.
3. *olivaceus* (Wied) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Glyphorhynchus* Wied 1831.

1. *Castelnaudi* (Des Murs) — 1 St. Ecuador.
2. *cuneatus* Leht. — 1 St. [major ScL.] Mexico.

Genus *Pygarrhichus* „Leht.“ Burm. 1837.

1. *albigularis* (King) — 1 ♂, 1 ♀ Araucana.

Genus *Dendrocincla* Gray 1840.

1. *turdina* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *merulina* (Lafr.) — 1 ♀ Caracas.
3. *anabatina* ScL. — 1 ♀ Mexico.
4. *homochroa* ScL. — 1 St. Guatemala.
5. *atrirostris* (Lafr.) — 1 St. Nanegal (Ecuador).
6. *tyrannina* (Lafr.) — 1 St. Bogota.

Genus *Dentrexetastes* Eyt. 1851.

1. *Temmincki* (Lafr.) — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Dendrocolaptes* Herm. 1804.

1. *picumnus* (Leht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

2. *Sancti Thomae* (Lafr.) — 1 ♂ Acajutla (Mexico).

Genus *Xiphocolaptes* Less. 1840.

1. *albicollis* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *emigrans* ScL. et Salv. — 1 ♀ Guatemala.
3. *procerus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 36] — 1 ♂, 1 ♀
Caracas.
4. *promeroporhynchus* (Less.) — 1 ♂ Neu-Granada.
5. *fortis* Heine* [Journ. Orn. 1860 p. 185] — 1 ♂ Venezuela (?).
6. *validus* (Tsch.) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Dendroornis* Eyton 1852.

1. *guttata* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Bahia.
2. *rostripallens* Des Murs — 1 ♂ Napo (Ecuador).
3. *eburneirostris* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 St. [var. *rostro
breviore*] Guatemala.
4. *erythropygia* ScL. — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Guatemala.
5. *triangularis* (Lafr.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Dendroplex* Sws. 1827.

1. *picus* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀ Bahia; 1 ♂ Guiana.

Genus *Thripobrotus* Cab. 1847.

1. *squamatus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.
2. *falcinellus* („Lcht.“) Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 38] —
1 ♂ Montevideo; 1 ♀ Buenos-Ayres.
3. *lacrymiger* (Des Murs) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
4. *Lafresnayi* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 38] — 1 ♂
Caracas.
5. *affinis* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapá.
6. *tenuirostris* (Lcht.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
7. *lineaticeps* (Lafr.) — 1 ♂ jun. Venezuela.
8. *Warscewiczii* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 39] — 1 ♀
Peru.

9. *leucogaster* (Sws.) — 1 ♀ Mexico.
10. *Souleyeti* (Des Murs) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Xiphorhynchus* Sws. 1827.

1. *trochilirostris* (Leht.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Venezuela.
2. *procurvus* (Temm.) — 2 ♂ Brasilien.
-

Fam. Tyrannidae.

Subfam. Fluvicolinae.

Genus *Fluvicola* Sws. 1827.

1. *pica* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 2 ♂
Porto Cabello.
2. *climacura* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *atripennis* Scl. — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Dixiphia* Rehb. 1850.

1. *leucocephala* (L.) — 3 ♂ Brasilien.

Genus *Copurus* Strickl. 1841.

1. *colonus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *pocilonotus* Cab. — 1 ♀ Guiana.
3. *leuconotus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.

4. *fuscicapillus* Schl. — 1 St. Bogota.

Genus *Ictiniscus* Cab. et Heine 1859.

1. *retulus* (Licht.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Cybernetes* Such 1825.

1. *yetapa* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Psolidura* Glog. 1842.

1. *guirayetapa* (Vieill.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Montevideo.

Genus *Xenurus* Boie 1826.

1. *tricolor* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Hemipenthica* Cab. et Heine 1859.

1. *irupero* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Taenioptera* Bp. 1826.

1. *velata* (Licht.) — 1 ♂ Brasilien.

2. *dominicana* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Brasilien.

3. *nengeta* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Rio-Grande.

Genus *Pyrope* Cab. et Heine 1859.

1. *Kittlitz* Cab. et Heine — 1 ♂ juv. Chile; 1 ♀ Araucana.

Genus *Agriornis* Gould 1838.

1. *maritima* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Patagonien.

2. *solitaria* Schl. — 1 ♂ Puellaro (Ecuador); 1 jun. Quito.

Genus *Machetornis* Gray 1841.

1. *rixosa* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Sisopygis* Cab. et Heine 1859.

1. *icterophrys* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Rio-Grande.

Genus *Myiotheretes* Rehb. 1850.

1. *erythropygus* Scl. — 1 ♂ Panza (Chimborazo).

Genus *Chipolegus* Boie 1826.

1. *comatus* (Leht.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Rio-Grande.

Genus *Sericoptila* „Schiff“ Bp. 1854.

1. *nigerrima* (Vieill.) — 2 ♂ Rio-Grande.
2. *cyanostris* (Vieill.) — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Ptyonura* Gould 1841.

1. *flavinucha* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
2. *albifrons* Tsch. — 1 ♀ Panza (Chimborazo).

Genus *Ochthodiaeta* Cab. et Heine 1859.

1. *fumigata* (Boiss.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♀ Chillanes (Ecuador).

Genus *Ochthoeca* Cab. 1847.

1. *rufipectoralis* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Bolivien.
2. *fumicolor* Scl. — 1 ♂ Bogota.
3. *Lessoni* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Chillanes (Ecuador).
4. *diadema* (Hartl.) — 4 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Mecocerciscus* [*Mecocerculus* (!)] Scl. 1862.

1. *setophagoides* (Bp.) — 1 ♂, 1 St. [*fasciis alarum fulvescentibus* ♀?] Bogota.
2. *stictopterus* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Lichenops* Comm. 17??.

1. *perspicillata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Centrites* Cab. 1847.

1. *niger* (Bodd.) — 2 ♂ *Araucana*.

Subfam. *Triccinae*.

Genus *Platyrrhynchus* Desm. 1805.

1. *mystaceus* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♀ *Brasilien*.
2. *cancrominus* Scl. et Salv. — 1 ♂ *Mexico*; 1 St. *Vera Paz* (*Guatemala*).

Genus *Triccus* Cab. 1845.

1. *cinereus* (L.) — 1 ♂, 2 ♀ *Brasilien*; 1 ♂ *Cayenne*; 2 ♂ *Bogota*.
2. *Sclateri* Cab. et Heine* [*Mus. Hein. II. p. 50*] — 1 ♀ *jun. Peru*.
3. *poliocephalus* (Wied) — 1 ♂ *Brasilien*.
4. *granadensis* (Hartl.) — 1 ♂, 1 ♀ *Bogota*.
5. *schistaceiceps* (Scl.) — 1 ♂ *Mexico*.

Genus *Euscarthmus* Wied 1831.

1. *nidipendulus* Wied — 1 ♂, 1 ♀ *Brasilien*.
2. *fumifrons* (Hartl.) — 1 ♂, 1 ♀ *Brasilien*.
3. *limbatus* („Licht.“) Cab. et Heine* [*Mus. Hein. II. p. 51*] — 1 ♂ *Brasilien*.
4. *squamicristatus* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ *Bogota*; 1 ♂ *Nanegal*.

Genus *Orchilus* Cab. 1845.

1. *auricularis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ *Brasilien*.

Genus *Colopterus* Cab. 1847.

1. *pilaris* („Licht.“) Cab. — 1 ♂ *Cartagena*.

Genus *Phylloscartes* Cab. et Heine 1859.

1. *ventralis* (Temm.) — 1 ♀ *Brasilien*.

Genus *Serphophaga* Gould 1837.

1. *suberistata* (Vieill.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♂ juv. Brasilien.
2. *cinerea* (Strickl.) — 1 ♂ Bogota; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Oncostoma* Scl. 1862.

1. *cinereigulare* Scl. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Pogonotriccus* Cab. et Heine 1859.

1. *eximius* (Temm.) — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Anaeretes* Rehb. 1850.

1. *parulus* (Kittl.) — 2 ♂ Chile.
2. *agilis* (Scl.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Cyanotis* Sws. 1837.

1. *Azarae* („Lcht.“ Naum.) — 2 ♂ Bolivien; 1 ♂, 1 ♂ jun. Chile.

Subfam. Elaïninae.

Genus *Leptopogon* Cab. 1845.

1. *amaurocephalus* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *poliocephalus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 55] — 1 ♂
Neu-Granada.
3. *erythrops* Scl. — 1 St. Bogota.

Genus *Pipromorpha* Schiff 1854.

1. *oleaginea* (Lcht.) — 1 ♂ Peru; 1 ♂ Surinam; 1 ♀ Cayenne.
2. *rufiventris* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *assimilis* (Scl.) — 1 ♂ Cordova (Mexico).

Genus *Capsiempis* Cab. et Heine 1859.

1. *flaveola* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Mionectes* Cab. 1844.

1. *striaticollis* (Lafr. et d'Orb.) — 2 ♂ Bogota.
2. *olivaceus* Lawr. — 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Rhynchocyclus* Cab. et Heine 1859.

1. *flaviventer* (Spix) — 1 ♀ Bahia.
2. *brevirostris* (Cab.) — 1 ♂ Xalapa; 1 St. Vera-Paz (Guatemala).
3. *olivaceus* (Temm.) — 1 ♂ Brasilien.
4. *cinereiceps* Scl. — 1 ♀ Mexico.
5. *subbrunneus* (Scl.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Phyllomyias* Cab. et Heine 1859.

1. *brevirostris* (Spix) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *Burmeisteri* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 57] — 1 ♂
Brasilien.

Genus *Tyranniscus* Cab. et Heine 1859.

1. *nigricapillus* (Lafr.) — 2 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada.
2. *flavifrons* Cab. et Heine — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Tyrannulus* Vieill. 1816.

1. *elatus* (Lath.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♀ Bogota.
2. *semiflavus* Scl. et Salv. — 1 St. Guatemala.

Genus *Myiopatis* Cab. et Heine 1859.

1. *incanescens* (Wied) — 1 ♀ Brasilien.
2. *pusilla* Cab. et Heine — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Elaënea* Sund. 1836.

1. *pagana* (Lcht.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Cayenne.
2. *subpagana* Scl. et Salv. — 1 ♂ Duennas (Guatemala).

3. *modesta* Tsch. — 1 ♂ Chile.
4. *obscura* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♀ Brasilien.
5. *mesoleuca* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 60] — 1 ♀ Rio-Grande.
6. *Frantzi* Lawr. — 1 ♂ Bogota.
7. *placens* Scl. — 1 ♂ Mexico.
8. *subplacens* Scl. — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
9. *Cottae* Gosse — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Legatus* Scl. 1859.

1. *albicollis* (Vieill.) — 4 ♂, 1 ♀, 1 ♀ juv. Bahia; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Genus *Myiozetetes* Scl. 1859.

1. *similis* (Spix) — 2 ♂, 2 ♀, 1 ♀ juv. Brasilien; 1 ♀ Mexiana (Para).
2. *cayennensis* (L.) — 1 ♂ Cayenne.
3. *guianensis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 61] — 2 ♂ Guiana; 1 ♀ Surinam; 1 St. Bogota; 1 St. Babahoyo (Ecuador).
4. *columbianus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 62] — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♂ Cartagena.
5. *granadensis* Lawr. — 1 ♂ [*M. icterophrys* Heine* Journ. Orn. 1861 p. 197] Baranquilla; 1 ♂ Bogota.
6. *texensis* (Giraud) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.

Genus *Saurophagus* Sws. 1831.

1. *lictor* (Lcht.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Cayenne.
2. *derbianus* Kaup — 1 ♂ Mexico.
3. *rufipennis* Lafr. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Porto Cabello; 1 ♀ Caracas.
4. *sulphuratus* (L.) — 1 ♀ Guiana.
5. *Maximiliani* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 63] — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien.
6. *bellicosus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Montevideo; 1 ♂ Rio Grande.

Genus *Megarhynchus* Thunb. 1824.

1. *pitangua* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Brasilien.

2. *chrysocephalus* (Tsch.) — 1 ♂, 1 ♀ Venezuela; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
3. *mexicanus* (Lafr.) — 1 ♂ Mexico.

Subfam. Tyranninae.

Genus *Muscivora* Cuv. 1799—1800.

1. *regia* (Gm.) — 1 ♂ Guiana.
2. *Swainsoni* Pelz. — 1 ♂ Brasilien.
3. *mexicana* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Guatemala.

Genus *Phoneutria* Rchb. 1850.

1. *bellicosa* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Pyrhomyias* Cab. et Heine 1859.

1. *Heinei* (Cab.)* [Mus. Hein. II. p. 66], [*Tyrannula vieillotides* (!)
Lafr.] — 1 ♂ Caracas.
2. *cinnamomeus* (Lafr. et d'Orb.) — 2 ♂, 2 ♀ Bogota; 1 ♂ Neu-
Granada.

Genus *Mitrephorus* Scl. 1859.

1. *phaeocercus* Scl. — 1 ♂ La Parada (Mexico).
2. *fulvifrons* (Giraud) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Myiobius* Gray 1838.

1. *xanthopygus* (Spix) — 1 ♂, 2 ♀ Bahia.
2. *barbatus* (Gm.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).
3. *citrinopygus* Cab. et Heine [*Tyrannula sulphureipygia* (!) Scl.]
— 1 ♂ Mexico.
4. *ornatus* (Lafr.) — 1 ♂ Bogota.
5. *stellatus* Cab.* [Journ. Orn. 1872 p. 158] — 1 ♂ Pallatanga
(Ecuador).
6. *flavicans* Scl. — 1 ♂ Bogota.

Genus *Pyrocephalus* Gould 1838.

1. *parvirostris* Gould — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Rio Grande.
2. *rubineus* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♂ juv. Venezuela; 1 ♂ Peru.
3. *mexicanus* Scl. — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ juv. Xalapa.

Genus *Aulanax* Cab. 1856.

1. *nigricans* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
2. *aquaticus* (Scl. et Salv.) — 1 ♂ Costa-Rica.

Genus *Theromyias* Cab. et Heine 1859.

1. *Sayi* (Bp.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Empidias* Cab. et Heine 1859.

1. *fuscus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Georgia (Nord-America).

Genus *Myiophobus* Rehb. 1850.

1. *olivus* (Bodd.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Surinam.
2. *naevius* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Empidonax* Cab. 1855.

1. *pusillus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
2. *Trailli* (Aud.) — 2 ♂ Nord-America.
3. *obscurus* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
4. *minimus* (Baird) — 1 ♂ Mexico.
5. *Bairdi* Scl. — 1 ♂ Duennas (Guatemala).
6. *flaviventer* (Baird) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
7. *difficilis* Baird — 1 ♂ Vera-Paz.

Genus *Myiochanes* Cab. et Heine 1859.

1. *cinereus* (Spix) — 1 ♂ Brasilien.
2. *ardesiacus* (Lafr.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
3. *cineraceus* (Lafr.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador); 1 ♀ Bogota.

Genus *Contopus* Cab. 1855.

1. *virens* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Carolina.
2. *plebejus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 71] — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
3. *brachytarsus* Scl. — 1 ♂ Bogota.
4. *borealis* (Sws. et Rich.) [*pertinax* (Leht.) Cab. et Heine* Mus. Hein. II. p. 72] — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
5. *Cooperi* (Nutt.) — 1 St. Nord-America.

Genus *Myiarchus* Cab. 1844.

1. *Swainsoni* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 72] — 2 ♂ Brasilien.
2. *tyrannulus* (Müll.) — 1 ♀ Venezuela.
3. *Lawrencei* (Giraud) — 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♀ Mexico; 1 ♂, 1 ♀ [*M. rufomarginatus* Cab. et Heine* Mus. Hein. II. p. 73] Mexico.
4. *nigriceps* Scl. — 1 ♂ Bogota.
5. *stolidus* (Gosse) — 1 ♂, 1 ♀ Cuba.

Genus *Myionax* Cab. et Heine 1859.

1. *crinitus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *mexicanus* (Kaup) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Myiodynastes* Bp. 1854.

1. *solitarius* (Vieill.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♀ juv. Brasilien.
2. *maculatus* (Müll.) [*Muscicapa audax* Gm.] — 1 ♂ Venezuela; 1 ♀ Cayenne.
3. *luteiventer* Bp. — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv. Xalapa.
4. *nobilis* Scl. — 1 ♂ Esmeraldas (Ecuador).

Genus *Sirystes* Cab. et Heine 1859.

1. *sibilator* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Empidonomus* Cab. et Heine 1859.

1. *parvus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Rio-Grande; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Laphyetes* Rehb. 1850.

1. *melancholicus* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *satrapa* (Leht.) Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 77] — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ juv. Caracas.
3. *apolites* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 77] — 1 ♂ Hab.?
4. *vociferans* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.
5. *verticalis* (Say) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Hypermitres* Cab. 1860.

1. *chrysocephalus* (Tsch.) — 1 ♂ Chillanes (Ecuador).

Genus *Milvulus* Sws. 1827.

1. *violentus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *tyrannus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ juv., 1 ♂ [var. *albescens*] Venezuela; 1 ♂ Surinam; 1 ♂ Mexico.
3. *forficatus* (Gm.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Tyrannus* Cuv. 1799—1800.

1. *carolinensis* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *caudifasciatus* d'Orb. — 1 ♀ Cuba.

Genus *Melittarchus* Cab. 1855.

1. *magnirostris* (d'Orb.) — 1 ♂ Cuba.
2. *crassirostris* (Sws.) — 1 ♂ Mazatlan.

Subfam. Oxyrhynchinae.

Genus *Oxyrhynchus* Temm. 1820.

1. *flammeiceps* Temm. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Fam. Ampelidae.

Subfam. Tityrinae.

Genus *Tityra* Vieill. 1816.

1. *cayana* (L.) — 2 ♂ Cayenne; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Guiana; 1 ♂
2 ♂ jun. Surinam.
2. *intermedia* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 81] — 1 ♀ Para.
3. *brasiliensis* (Sws.) — 5 ♂, 3 ♀ Brasilien.
4. *semifasciata* (Spix) — 1 ♀ Para; 1 ♂ juv. Mexiana (Para).
5. *personata* Jard. et Selby — 1 ♂ Guatemala; 1 ♂, 1 ♀ Xalapa;
1 ♂, 1 ♀ Columbien.

Genus *Exctastes* Bp. 1854.

1. *albinuchus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 83] — 1 ♂, 1 ♂
jun. Brasilien.
2. *inquisitor* („v. Olf.“ Licht.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 2 ♀ Brasilien; 1 ♂
jun. Angostura; 1 ♀ Para.
3. *albitorques* (Du Bus) — 1 ♂ Peru.
4. *Fraseri* (Kaup) — 1 ♀ Belize (Honduras).

Genus *Hadrostomus* Cab. et Heine 1859.

1. *atricapillus* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
2. *Aglaiae* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Xalapa; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun.
Mexico.
3. *affinis* Elliot — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
4. *minor* (Less.) — 1 ♂ Neu-Granada.
5. *homochrous* Schl. — 1 ♂, 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Pachyrhamphus* Gray 1838.

1. *viridis* (Vieill.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 2 ♀
Brasilien.

2. *cinereus* (Bodd.) — 1 ♂ Caracas; 1 ♂ jun. Bogota; 2 ♀ Cayenne.
3. *spodiurus* Scl. — 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Zetetes* Cab. et Heine 1859.

1. *niger* (Spix) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♂ juv. Caracas; 1 ♂ Amazonenstrom.
2. *polychropterus* (Vieill.) — 2 ♂; 4 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ juv. Rio-Grande.

Genus *Bathmidurus* Cab. 1847.

1. *maior* Cab.* [Orn. Not. p. 246] — 1 ♂ La Parada (Mexico); 1 ♀ Xalapa.
2. *albogriseus* (Scl.) — 1 ♂ juv. Caracas.
3. *atricapillus* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ Bahia.

Genus *Callopsaris* Bp. 1854.

1. *versicolor* (Hartl.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Subfam. Piprinae.

Genus *Jodopleura* Less. 1839.

1. *pipra* Less. — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Calyptura* Sws. 1831.

1. *cristata* Sws. — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Anticorys* Cab. et Heine 1859.

1. *chrysoptera* (Lafr.) — 2 ♂ Neu-Granada; 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ Bogota.

Genus *Chloropipo* Cab. et Heine 1859.

1. *flavicapilla* (Scl.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Teleonema* Rehb. 1850.

1. *filicaudum* (Spix) — 2 ♂ Porto-Cabello; 2 ♂ Ucayali (Peru).

Genus *Pipra* L. 1766.

1. *aureola* L. — 2 ♂, 1 ♀ Cayenne.
2. *fasciata* Lafr. et d'Orb. — 2 ♂ Peru.
3. *cornuta* Spix — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
4. *auricapilla* Licht. — 2 ♂ Cayenne.
5. *rubricapilla* Temm. — 3 ♂, 1 ♀ Brasilien.
6. *mentalis* Scl. — 1 ♂ Guatemala; 1 ♀ Mexico.
7. *leucocilla* L. — 2 ♂, 2 ♀ Bahia.
8. *coracina* „Verr.“ Scl. — 1 ♂ Chamicuros (Peru).
9. *cyaneocapilla* Hahn — 1 ♂ Amazonenstrom (Nord-Brasilien);
1 ♀ Napo (Ecuador).
10. *serena* L. — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♂ Brasilien.

Genus *Coropipo* Schiff 1854.

1. *gutturialis* (L.) — 1 ♂ Cayenne.
2. *leucorrhoea* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.

Genus *Machacropterus* Schiff 1854.

1. *regulus* (Hahn) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *striolatus* (Bp.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ Bogota.
3. *deliciosus* Scl. — 1 ♂ Quito.

Genus *Ilicura* Rehb. 1850.

1. *militaris* (Shaw) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Chiroxiphia* Cab. 1847.

1. *caudata* (Shaw) — 3 ♂ Brasilien; 1 ♂ jun. [var. *maior*] Rio-Grande.

2. *lanccolata* (Wagl.) — 1 ♂ Caracas; 1 ♂ Cartagena; 1 ♂ Baranquilla; 1 ♂ juv. Neu-Granada.
3. *linearis* (Bp.) — 1 ♂ Costa-Rica.
4. *pareola* (L.) — 1 ♂ Brasilien; 2 ♂, 4 ♂ adolesc., 4 ♂ jun., 1 ♂ juv. Bahia.

Genus *Chiromachaeris* Cab. 1847.

1. *manacus* (L.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ jun. Guiana.
2. *gutturosa* (Desm.) — 4 ♂, 3 ♀ Bahia.
3. *flavcola* (Cass.) — 2 ♂ Neu-Granada.
4. *Candei* (Parz.) — 1 ♂ Honduras; 1 ♂, 1 ♀ Guatemala.
5. *vitellina* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Central-America.

Genus *Hemipipo* Cab. 1847.

1. *chlorion* Cab. — 1 ♂ Napo (Ecuador).

Genus *Metopia* Sws. 1831.

1. *galeata* (Leht.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien.

Genus *Phoenicocercus* Sws. 1831.

1. *carnifex* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Surinam.
2. *nigricollis* Sws. — 1 ♂ Peru; 1 ♀ Para.

Genus *Rupicola* Briss. 1760.

1. *crocea* (Vieill.) — 1 ♂ Angostura; 1 ♂ juv. Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *peruviana* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Peru.
3. *sanguinolenta* Gould [*saturata* Cab. et Heine* Mus. Hein. II. p. 99] — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Bolivien.

Genus *Heteropelma* Schiff 1854.

1. *virescens* (Wied) [*unicolor* „Langsd.“ Ménétr.] — 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.

2. *turdinum* (Wied) [*rufo-olivaceum* Lafr.] — 1 ♂ Brasilien.
3. *verae-pacis* Scl. et Salv. — 1 ♂ Mexico.

Subfam. Ampelinae.

Genus *Lathria* Sws. 1831.

1. *cineracca* (Vieill.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Brasilien.
2. *Virussi* („Natt.“) v. Pelz. — 1 St. Brasilien.
3. *fuscocinerea* (Lafr.) — 1 ♂ Bogota.
4. *unirufa* Scl. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Lipaugus* Boie 1828.

1. *holerythrus* Scl. et Salv. — 1 ♂ Mexico; 1 St. Guatemala.

Genus *Aulia* Schiff 1854.

1. *hypopyrrha* (Vieill.) — 1 ♀ Neu-Granada.

Genus *Ptilochloris* Sws. 1837.

1. *squamata* (Wied) — 1 ♀ Brasilien.
2. *remigialis* Lafr. — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Chrysopteryx* Sws. 1831.

1. *nigra* (Less.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Amphibolura* [*Phibalura* (!)] Vieill. 1816.

1. *flavirostris* Vieill. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.

Genus *Euchlorornis* Filippi 1846.

1. *Riefferi* (Boiss.) — 1 ♂, 1 ♀ Quito; 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
2. *melanolaema* (Scl.) — 1 ♂, 1 ♀ Venezuela.
3. *formosa* (Hartl.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Porto-Cabello.

4. *aureipectus* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Porto-Cabello; 1 ♂ juv.,
2 ♀ Caracas.
5. *jucunda* (Scl.) — 1 ♂ Quito.

Genus *Ampelio* Cab. 1845.

1. *cucullatus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Rio-Grande; 1 ♂ Brasilien.
2. *arcuatus* (Lafr.) — 1 ♂, 1 ♀ Quito.
3. *melanocephalus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.
4. *cinctus* (Tsch.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Heliochera* Filippi 1846.

1. *rubrocristata* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Calacali (Ecuador).

Genus *Ampelis* L. 1735.

1. *cotinga* L. — 2 ♂, 1 ♂ juv. Guiana.
2. *cincta* Bodd. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *cayana* L. — 2 ♂, 1 ♂ juv. Cayenne; 1 ♂ Bogota.

Genus *Xipholena* Glog. 1842.

1. *purpurea* (Lcht.) — 2 ♂, 3 ♂ jun., 1 ♂ juv., 3 ♀ Brasilien.
2. *pompadora* (L.) — 1 ♂ Surinam; 1 ♂ jun. Guiana; 1 ♂ juv.
Cayenne.
3. *lamellipennis* (Lafr.) — 1 ♂ Neu-Granada.

Subfam. *Gymnoderinae*.

Genus *Threnoedus* Glog. 1842.

1. *cruentus* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♀ Surinam.

Genus *Haematoderus* Bp. 1854.

1. *militaris* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Venezuela.

Genus *Chasmorhynchus* Temm. 1820.

1. *variegatus* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♀ juv. Porto-Cabello.
2. *nudicollis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
3. *niveus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ Guiana.
4. *tricarunculatus* Verr. — 1 ♂, 1 ♀ Costa-Rica.

Genus *Gymnoderus* Geoffr. 1809.

1. *foetidus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Gymnocephalus* Geoffr. 1809.

1. *calvus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.

Genus *Pyroderus* Gray 1840.

1. *granadensis* (Lafr.) — 1 ♂ Neu-Granada.
2. *orenocensis* (Lafr.) — 2 ♂, 1 ♀ juv. Caracas.
3. *scutatus* (Shaw) — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Cephalopterus* Geoffr. 1809.

1. *ornatus* Geoffr. — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *penduliger* Sel. — 1 ♂ Ecuador.
3. *glabricollis* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Costa-Rica.

Fam. Phytotomidae.

Genus *Phytotoma* Mol. 1782.

1. *rara* Mol. — 1 ♂, 1 ♀ Chili; 1 ♂, 1 ♀ Valdivia.
2. *rutila* Vieill. — 1 ♂ Montevideo.
3. *angustirostris* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂ Peru.

Fam. Todidae.

Genus *Todus* L. 1766.

1. *dominicensis* Lafr. — 1 ♂ Haiti.

Fam. Prionitidae.

Genus *Spathophorus* Cab. et Heine 1859.

1. *superciliaris* (Jard.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Crybelus* Cab. et Heine 1859.

1. *mexicanus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Urospatha* Salvad. 1868.

1. *Martii* (Spix) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Prionites* Ill. 1811.

1. *caeruliceps* (Gould) — 1 ♂, 2 ♀ Xalapa.
2. *Lessoni* (Less.) — 1 ♂ jun. Guatemala.
3. *psalurus* („Puch.“ Bp.) — 1 ♂ Costa-Rica.
4. *microstephanus* (Scl.) — 1 ♂ Bogota; 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).
5. *subrufescens* (Scl.) — 2 ♂ Cartagena; 1 ♂ Baranquilla.
6. *momota* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
7. *Nattereri* (Scl.) — 1 ♂ Chamicuros (Peru).
8. *Swainsoni* (Scl.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Baryphthengus* Cab. et Heine 1859.

1. *ruficapillus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *melancholicus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 115] — 1 ♂,
1 ♂ juv. Buenos-Ayres.

Genus *Hylomanes* Licht. 1838.

1. *momotulus* Licht. — 1 ♂ Mexico.
2. *gularis* (Lafr.) — 1 ♂ Guatemala.

Fam. Coraciidae.**Subfam. Coraciinae.****Genus *Coracias* L. 1735.**

1. *garrulus* L. — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Harz; 1 ♀ jun. Pommern;
1 jun. Scinde (Kaschmir).
2. *pilosus* Lath. — 1 ♂ Senegambien; 1 ♀ Abessinien.
3. *Temmincki* (Vieill.) — 1 ♂ Celebes.
4. *bengalensis* L. — 1 ♀ Nepal; 1 jun. Ostindien.
5. *indicus* L. — 1 ♂ Ceylon.
6. *affinis* McClell. — 1 ♂ Tenasserim; 1 ♂ Nepal.
7. *cyanogaster* (Vieill.) — 1 ♂ Senegambien.
8. *caudatus* L. — 2 ♂ Mozambique.
9. *abyssinicus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien; 1 ♂ Senegambien.

Genus *Cornopio* Cab. et Heine 1859.

1. *afar* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Gold-Küste.
2. *gularis* (Vieill.) — 1 ♂ Guinea.
3. *glaucurus* (Müll.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Eurystomus* Vieill. 1816.

1. *orientalis* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Malacca; 2 ♂ Java; 1 ♂
Philippinen.
2. *pacificus* (Lath.) — 1 ♂, 2 ♀ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ jun. Sidney;
1 ♀ Nord-Ceram.

Subfam. Eurylaeminae.**Genus *Calyptomena* Raffl. 1822.**

1. *viridis* Raffl. — 1 ♂, ♂ jun. Sumatra; 1 ♂ Borneo; 1 ♀ Malacca.

Genus *Eurylaemus* Horsf. 1820.

1. *javanus* Horsf. — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ jun. Java; 1 ♀ Johore (Malacca).
2. *ochromelas* Raffl. — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ jun. Java.

Genus *Psarisomus* Sws. 1837.

1. *Dalhousiae* (James) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Serilophus* Sws. 1837.

1. *erythropygus* [*rubropygius* (!)] (Hodgs.) — 1 ♂ Darjeeling (Ost-indien).

Genus *Cymborhynchus* Vieill. 1831.

1. *macrorhynchus* (Gm.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂ jun., 1 ♀ Sumatra.

Genus *Corydon* Less. 1828.

1. *sumatranus* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Sumatra.

Subfam. Leptosominae.

Genus *Leptosomus* Vieill. 1816.

1. *discolor* (Herm.) — 1 ♂ Madagascar.

Subfam. Atelornithinae.

Genus *Atelornis* Puch. 1846.

1. *pittoides* (Lafr.) — 1 ♀ Madagascar.

Genus *Geobiastes* Sharpe 1871.

1. *squamiger* (Lafr.) — 1 ♀ Madagascar.

Subfam. Steatornithinae.

Genus *Steatornis* Humb. 1833.

1. *caripensis* Humb. — 1 ♂ Cumana.

Subfam. Podarginae.

Genus *Podargus* Cuv. 1829.

1. *phalaenoides* Gould — 1 ♂ Van-Diemensland; 1 ♀ Australien.
2. *brachypterus* Gould — 1 ♀ West-Australien.
3. *strigoides* (Lath.) — 1 ♂ Queensland; 1 ♀ Australien.
4. *megacephalus* (Lath.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ jun. Ost-Australien.
5. *Cuvieri* Vig. et Horsf. — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Australien.
6. *papuensis* Quoy et Gaim. — 1 ♂ Laroki (S.-O.-Neu-Guinea).

Genus *Batrachostomus* Gould 1838.

1. *affinis* Blyth — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
2. *stictopterus* Cab. et Heine.* [Mus. Hein. II. p. 124] — 1 ♂, 1 ♀,
1 ♀ jun. Malacca.
3. *auritus* (Vig.) — 1 ♂ Ligor (Siam).

Genus *Aegotheles* Vig. et Horsf. 1825.

1. *leucogaster* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Nord-West-Australien.
2. *Norae Hollandiae* (Lath.) — Neu-Süd-Wales.

Fam. Upupidae.

Subfam. Upupinae.

Genus *Upupa* L. 1735.

1. *epops* L. — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ jun. [*bifasciata* Brehm] Nord-ost-Africa; 1 St. [*indica* Hodgs.] Nepal; 1 St. Dobi (Ostindien); 1 ♂ [*maior* Brehm] Fuaah (Egypten).
2. *ceylonensis* Rehb. — 1 St. Pondichery.
3. *longirostris* „Blyth“ Jerd. — 1 ♂ Java?
4. *nigripennis* (Gould) — 1 ♂ Insel Salanga (Malacca).
5. *africana* Behst. — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland.

Subfam. Irrisorinae.

Genus *Rhinopomastus* Smith 1828.

1. *cyanomelas* (Vieill.) — 2 ♂ Cap.

Genus *Scoptelus* Cab. et Heine 1859.

1. *aterrimus* (Steph.) — 1 ♂ Sennaar.

Genus *Irrisor* Less. 1831.

1. *capensis* Less. — 1 ♂ Kaffernland.
 2. *senegalensis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Sennaar; 1 ♀ jun. West-Africa.
-

Fam. Meropidae.

Subfam. Nyctiornithinae.

Genus *Nyctiornis* Sws. 1831.

1. *Athertoni* (Jard. et Selby) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Nepal.
2. *amictus* (Temm.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ Borneo.
3. *malaccensis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 133] — 1 ♂ juv.
1 ♀ Malacca.

Genus *Bombylonax* Heine 1859.

1. *Breweri* (Cass.) — 1 St. Loango-Küste (West-Africa).

Genus *Meropiscus* Sund. 1849.

1. *gularis* (Shaw) — 1 ♂ Gabun (West-Africa).

Subfam. Meropinae.

Genus *Spheconax* Cab. et Heine 1859.

1. *albifrons* Cab. et Heine — 1 ♂ jun. Süd-Africa.
2. *Bullocki* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal.
3. *frenatus* (Hartl.) — 1 ♂ Sennaar; 1 ♀ Abessinien.

Genus *Melittias* Cab. et Heine 1859.

1. *quinticolor* (Vieill.) — 1 ♂ Java.

Genus *Melittophagus* Boie 1828.

1. *erythropterus* (Gm.) — 1 ♂ Chartum; 1 ♂, 1 ♀ juv. Abessinien;
2 ♀ Senegal.
2. *angolensis* (Gm.) — 1 ♂ Gabun (West-Africa).

Genus *Dicrocercus* Cab. et Heine 1859.

1. *hirundinaceus* (Vieill.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♀ jun. Süd-Africa.

Genus *Phlothrus* Rehb. 1852.

1. *viridis* (L.) — 1 ♂ Java; 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *cyanophrys* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 137] — 2 ♂ juv. Arabien.
3. *viridissimus* (Sws.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ Abessinien; 1 ♀ Berberei.

Genus *Aërops* Rehb. 1852.

1. *albicollis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.
2. *Böhmi* (Rehw.) — 1 St. Rovuma-Fluss (Ost-Africa).

Genus *Melittophas* Rehb. 1852.

1. *bicolor* (Bodd.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♀ Borneo; 1 ♀ Sumatra.

Genus *Comaërops* Cab. et Heine 1859.

1. *ornatus* (Lath.) — 2 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ Darling (Süd-Australien); 1 ♀ Timor.

Genus *Merops* L. 1756.

1. *philippinus* L. — 3 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Java.
2. *superciliosus* L. — 1 ♂ Madagascar; 1 ♂ juv., 1 ♀ jun. Port-Natal.
3. *aegyptius* Forsk. — 1 ♂, 1 ♀ Egypten; 1 ♂ juv. Nubien.
4. *chrysocercus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. II. p. 139] — 1 ♂ Senegal.
5. *Swinhoei* Hume — 1 ♂ Andamanen.
6. *apiaster* L. — 2 ♂ Ungarn; 1 ♂ juv. Spanien.

Genus *Melittotheres* Rehb. 1853.

1. *nubicus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nubien; 1 ♂ Abessinien.
2. *natalensis* Rehb. — 1 ♂ Port Natal.

Genus *Tephraërops* Rehb. 1852.

1. *malimbicus* (Shaw) — 1 ♂ Gabun (West-Africa).

Fam. Alcedinidae.

Subfam. Alcedininae.

Genus *Alcyone* Sws. 1837.

1. *diemensis* Gould — 1 ♀ Van-Diemensland.
2. *azurea* (Lath.) — 1 jun. Australien.
3. *Lessoni* Cass. — 1 ♂ Neu-Guinea.
4. *affinis* Gray — 1 ♂ Gilolo.
5. *cyanipectus* (Lafr.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Alcedo* L. 1756.

1. *semitorquata* Sws. — 1 ♂ Senegal; 1 ♀ Abessinien.
2. *ispida* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 2 pulli Harz; 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Egypten; 1 ♀ Nord-Ost-Africa.
3. *bengalensis* Gm. — 2 ♂, 1 jun. Ostindien; 1 ♂ [*sondaica* Cab. et Heine* Mus. Hein. II. p. 144] Borneo; 1 ♀ jun. Java.
4. *asiatica* Sws. — 1 ♂ Sumatra.
5. *moluccensis* Blyth [*ispidoides* (!) Less.] — 1 ♂ Buru; 1 ♀ Amboina.
6. *quadribrachys* Bp. — 1 ♂ Gabun (West-Africa).

Genus *Ispidina* Kaup 1848.

1. *picta* (Bodd.) — 1 ♂ Goldküste.

Genus *Corythornis* Kaup 1848.

1. *cyanostigma* (Rüpp.) — 1 ♂ jun. Sennaar.
2. *cycanocephala* (Shaw) — 1 ♂ Port Natal; 1 ♂ Cap; 1 ♂ Mozambique.
3. *cristata* (L.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Chloroceryle* Kaup 1849.

1. *superciliosa* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Guiana.
2. *viridirufa* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♀ Cayenne; 1 ♀ Guiana.
3. *americana* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ jun., 2 ♀ juv. Brasilien; 2 ♂, 1 ♀ Caracas.
4. *Cabanisi* (Tsch.) — 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Mexico.
5. *amazonia* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Ceryle* Boie 1828.

1. *rudis* (L.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂ jun. Senegal; 2 ♀ Egypten; 1 ♀ West-Africa; 1 ♂, 1 ♀ [*varia* Strickl.] Ostindien.

Genus *Megaceryle* Kaup 1848.

1. *guttata* (Vig.) — 1 ♂ Nepal.
2. *lugubris* (Temm.) — 1 ♀ Japan.

Genus *Ichthyomus* Cab. et Heine 1859.

1. *maximus* (Pall.) — 1 ♂ jun. Senegal; 1 ♀ Congo; 1 ♀ Takazié-Fluss (Nordost-Africa).

Genus *Streptoceryle* Bp. 1854.

1. *torquata* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Brasilien.

2. *stellata* (Meyen) — 2 ♂ Chile.
3. *alcyon* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ jun., 1 ♀ Xalapa.

Genus *Pelargopsis* Glog. 1842.

1. *Fraseri* Sharpe — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *malaccensis* Sharpe — 2 ♂ Malacca; 1 ♂ jun. Sunda-Inseln (?).
3. *gurial* (Pears.) — 1 ♂ jun., 2 ♀ Ostindien.
4. *amauroptera* (Pears.) — 1 ♂ Himalaya.
5. *melanorhyncha* (Temm.) — 1 ♂ Sula-Inseln; 1 ♀ Celebes.

Subfam. Halcyoninae.

Genus *Ceyx* Lacép. 1800—1801.

1. *melanura* Kaup — 1 ♂ Philippinen.
2. *rufidorsa* Strickl. — 1 ♀ Malacca; 1 ♀ Johore (Malacca).
3. *tridactyla* (Pall.) — 1 ♂ Johore (Malacca).
4. *Dillwyni* Sharpe — 1 ♂ Borneo.
5. *lepida* Temm. — 1 ♂ Amboina; 1 ♂ [*uropygialis* Gray] Gilolo;
1 ♂ Batchian.
6. *cajeli* Wall. — 1 ♂ Buru.

Genus *Pagurothera* Cab. et Heine 1859.

1. *chelicuti* (Stanley) — 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Abessinien; 1 ♂ jun.
[*Alcedo variegata* Vieill.] Mozambique.
2. *albiventris* (Scop.) [*fuscicapilla* Lafr.] — 1 ♂, 1 ♂ juv. Kaffern-
land; 1 ♂ jun., 1 ♀ Port Natal.

Genus *Halcyon* Sws. 1821.

1. *senegalensis* (L.) — 2 ♂ Senegal; 1 juv. Senegambien.
2. *semicaerulea* (Forsk.) — 1 ♂ Usegua (Ost-Africa); 1 ♂ jun.
Abessinien; 1 ♂ Senegal; 1 ♀ Sennaar.
3. *dryas* Hartl. — 1 ♀ Gabun (West-Africa).

Genus *Entomobia* Cab. et Heine 1859.

1. *cyaniventris* (Vieill.) — 1 ♂ Java.
2. *gularis* (Kuhl) — 1 ♂ Philippinen; 1 ♀ China.
3. *smyrnensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Smyrna.
4. *fusca* (Bodd.) — 1 ♂ Madras; 1 ♂, 1 ♀ Bengalen.
5. *pileata* (Bodd.) — 1 ♂ Borneo; 1 ♀ Tenasserim.

Genus *Callialeyon* Bp. 1850.

1. *coromanda* (Lath.) — 1 St. Java.
2. *Schlegeli* (Bp.) — 1 ♂ jun. Tundano (Japan).

Genus *Cyanaleyon* „Verr.“ Bp. 1850.

1. *Macleayi* (Jard. et Selby) — 1 ♂ Nord-Australien.
2. *Elisabeth* Heine* [Journ. Orn. 1883 p. 222] — 1 St. Südost-
Neu-Guinea.
3. *lazuli* (Temm.) — 1 ♂ Ceram; 1 ♀ Amboina.
4. *diops* (Temm.) — ♂ Ternate; 1 ♀ Batchian.

Genus *Sauropatis* Cab. et Heine 1859.

1. *sancta* (Vig. et Horsf.) — 2 ♂, 2 ♂ jun. Neu-Süd-Wales; 1 ♀
Nieder-Murray (Süd-Australien); 1 ♀
jun. Gippsland (Süd-Australien); 1 ♂
juv., 1 ♀ West-Australien; 1 ♀ jun.
Ceram.
2. *Tristrami* (Lay.) — 1 ♀ Neu-Britannien.
3. *chloris* (Bodd.) — 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♂ jun. Philippinen;
1 ♂, 1 ♀ [var. *pileo et dorso obscurioribus*]
Amboina; 1 St. [*abyssinica* Hempr. et Ehrb.]
Schach-Said (Abessinien).
4. *occipitalis* (Blyth) — 1 St. Camorta (Nicobaren).
5. *vagans* (Lafr.) — 2 ♀ Neuseeland (Süd-Insel).
6. *sacra* (Gm.) [*Pealei* Hartl. et Finsch] — 1 St. Huahine (Ge-
sellschafts-Inseln).
7. *Juliae* Heine* [Journ. Orn. 1860 p. 184] — 1 St. Neu-Hebriden.
8. *Australasiae* (Vieill.) — 1 ♂ Lombok.

9. *cinanomina* (Sws.) — 1 ♂ Ponape (Carolinen).
10. *pyrrhopygia* (Gould) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales.
11. *funnebris* („Forsten“ Bp.) — 1 ♂ Gilolo.
12. *saurophaga* (Gould) — 1 ♂ Morotai; 1 ♀ Moro.

Genus *Syma* Less. 1828.

1. *torotoro* Less. — 1 ♂ Neu-Guinea.
2. *flavirostris* (Gould) — 1 ♂ Cap York (Nord-Australien); 1 ♀
Sommerset (Nord-Australien).

Genus *Caridagrus* Cab. et Heine 1859.

1. *concretus* (Temm.) — 1 ♂ Borneo.

Genus *Astacophilus* Cab. et Heine 1859.

1. *Lindsayi* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Philippinen.

Genus *Tanysiptera* Vig. 1823.

1. *hydrocharis* Gray — 1 ♂ Aru-Inseln.
2. *dea* (L.) [*nais* Gray] — 1 ♂, 1 ♀ Amboina.
3. *Margarethae* Heine* [Journ. Orn. 1859 p. 406] — 2 ♂, 1 ♂
juv., 1 ♀ jun. Gilolo.
4. *galatea* Gray — 1 St. Südwest-Neu-Guinea.
5. *obiensis* Salvad. — 1 ♂ (Batchian?).
6. *doris* Wall. — 2 ♂ Morty-Insel.
7. *nigriceps* Scl. — 1 ♂ Neu-Britannien.

Genus *Uralcyon* Heine 1859.

1. *sylvia* Gould — 1 ♂ Cap York.

Genus *Caridonax* Cab. et Heine 1859.

1. *fulgidus* (Gould) — 1 ♂ Lombok.

Genus *Carcinentes* Cab. et Heine 1859.

1. *pulchellus* (Horsf.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ Malacca; 1 ♂ jun., 1 ♀
Sumatra.

2. *melanops* (Temm.) — 1 ♀ Borneo.

Genus *Monachalcyon* Rehb. 1851.

1. *monachus* (Temm.) [*princeps* Forst.] — 1 ♂ Celebes.

Genus *Cittura* Rehb. 1851.

1. *cyanotis* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Celebes.

Genus *Sauromarptis* Cab. et Heine 1859.

1. *Gaudichaudi* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ Neu-Guinea.

Genus *Paralcyon* Glog. 1827.

1. *cervina* (Gould) — 1 ♂ Nord-Australien.
2. *gigas* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ Australien;
1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Gippsland (Süd-Australien).
3. *Leachi* (Lath.) — 1 ♂ Port Essington (Nordwest-Australien);
1 ♀ Nord-Australien.

Genus *Melidora* Less. 1831.

1. *macrorhina* (Less.) — 1 ♂ Port Moresby (Neu-Guinea).

Fam. Bucerotidae.

Genus *Rhynchaceros* Glog. 1842.

1. *erythrorhynchus* (Temm.) — 2 ♂ Sennaar; 1 ♂ juv. Cordofan;
1 ♀ jun. Abessinien.
2. *leucomelas* (Lcht.) — 1 ♂ Kaffernland.
3. *Deckeni* Cab. — 1 St. Barawa (Ost-Africa).

Genus *Lophoceros* Hempr. et Ehrb. 1829.

1. *nasutus* (L.) [*Forskali* Hempr. et Ehrb.] — 1 ♂ Sennaar; 1 ♀
Abessinien.
2. *melanoleucus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Süd-Africa.
3. *limbatus* (Rüpp.) — 1 ♀ Keren (Abessinien).
4. *semifasciatus* (Temm.) — 1 ♂ Guineaküste.
5. *camurus* (Cass.) — 1 ♂ Rio Camma (West-Africa).

Genus *Berenicornis* Bp. 1849.

1. *albieristatus* (Cass.) — 1 ♂ Goldküste.

Genus *Penelopides* Rehb. 1850.

1. *Panini* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Philippinen.
2. *ginginianus* (Lath.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Anorhinus* Rehb. 1850.

1. *galeritus* (Temm.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♀ Sarawak (Borneo).

Genus *Hydrocissa* Bp. 1849.

1. *exarata* („Reinw.“ Temm.) — 1 ♂ Celebes.

2. *malayana* (Raffl.) — 1 ♀ Java.
3. *convexa* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
4. *coronata* (Bodd.) — 1 ♀ Ceylon.
5. *albirostris* (Shaw) — 1 ♂ Tenasserim.

Genus *Sphagolobus* Cab. et Heine 1860.

1. *atratus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Goldküste.

Genus *Bycanistes* Cab. et Heine 1860.

1. *buccinator* (Temm.) 1 ♂ Cap.
2. *fistulator* (Cass.) — 1 ♂ Gabun (West-Africa).
3. *cristatus* (Rüpp.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Rhytidoceros* Rehb. 1850.

1. *obscurus* (Gm.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ Malacca.
2. *plicatus* (Penn.) — 1 ♂, 1 ♀ Lokki (Ceram).
3. *subruficollis* (Blyth) — 1 ♀ Tenasserim.

Genus *Aceros* Hodgs. 1842.

1. *nipalensis* Hodgs. — 1 ♂ Darjeeling (Ostindien).

Genus *Cranorrhinus* Cab. et Heine 1860.

1. *cassidix* (Temm.) — 1 ♂ Celebes.
2. *corrugatus* (Temm.) — 1 ♀ Sarawak (Borneo).

Genus *Dichoceros* Glog. 1842.

1. *bicornis* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Ostindien; 1 ♀ Sikkim (Ostindien).

Genus *Platyceros* Cab. et Heine 1860.

1. *hydrocorax* (L.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Buceros* L. 1748.

1. *rhinoceros* L. — 1 ♂ Sumatra.

2. *rhinoceroïdes* Temm. — 1 ♂ Sarawak (Borneo).
3. *lunatus* Temm. — 1 ♂ Java.

Genus *Tmetoceros* Cab. 1847.

1. *abyssinicus* (Gm.) — 1 ♂ Abessinien.
 2. *cafer* (Verr.) — 1 ♀ Süd-Africa.
-

Ordo III. Strisores.

Tribus I. Macrochires.

Fam. Trochilidae.

Subfam. Polytminae.

Genus *Rhamphodon* Less. 1831.

1. *naevius* (Dumont) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Eutoxeres* Rehb. 1849.

1. *aquila* (Bourc.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Glaucis* Boie 1831.

1. *hirsuta* (Gm.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ Caracas.
2. *Mazeppae* Less. — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne.

Genus *Polytmus* Briss. 1760.

1. *thaumantias* (L.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *leucochlorus* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 176] — 1 ♂, 1 ♂ jun.
Venezuela.

3. *Theresiae* (Da Silva) — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne.
4. *leucorrhous* Scl. et Salv. — 1 ♂, 1 ♀ Para.

Genus *Threnetes* Gould 1853.

1. *cervinicaudus* Gould — 1 ♂ Bogota.

Subfam. Phaëthornithinae.

Genus *Pygmornis* Bp. 1854.

1. *pygmaea* (Spix) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *eremita* (Gould) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Columbien.
3. *griseigularis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Columbien.
4. *striigularis* (Gould) — 2 ♂ Bogota.
5. *Adolphi* (Gould) — 1 ♂ Mexico.
6. *Longuemarei* (Less.) — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Phaëthornis* Sws. 1831.

1. *apheles* Heine* [Journ. Orn. 1883 p. . .] — 1 ♀ Peru.
2. *squalida* (Temm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Cayenne.
3. *hispidula* Gould [*Oseryi* Bourc. et Muls.] — 1 ♀ Bogota.
4. *anthophila* (Bourc.) — 2 ♂ Neu-Granada.
5. *longirostris* (Less. et Del.) — 1 ♂ Guatemala.
6. *eurynome* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile; 1 ♂ Brasilien.
7. *malaris* (Licht.) — 2 ♂ Cayenne; 1 ♀ Bahia.
8. *superciliosa* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
9. *consobrina* Gould [*Moorei* Lawr.] — 1 ♂ Columbien.
10. *Augusti* (Bourc.) — 1 ♂ Venezuela.

Genus *Ametrornis* Rehb. 1854.

1. *Bourcieri* (Less.) — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Toxoteuches* Cab. et Heine 1860.

1. *apicalis* („Licht.“ Tsch.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Neu-Granada.

2. *Guyi* (Less.) — 1 ♀ ad. Peru.
3. *Yaruqui* (Bourc.) — 1 ♂ jun. Nanegal (Ecuador).

Subfam. Campylopterinae.

Genus *Sphenoproctus* Cab. et Heine 1860.

1. *curvipennis* (Lcht.) — 2 ♂ Xalapa.
2. *pampa* (Less.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Campylopterus* Sws. 1827.

1. *largipennis* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *ensipennis* (Sws.) — 1 ♂ Venezuela.
3. *hemileucurus* (Lcht.) — 2 ♂ Mexico; 1 ♂ jun. Guatemala.
4. *lazulus* (Vieill.) — 3 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ jun. Peru; 1 ♂ juv. Bogota.

Genus *Sternocyta* Gould 1858.

1. *cyanipectus* Gould — 1 ♂ Merida.

Genus *Phaeochroa* Gould 1861.

1. *Cuvieri* (Del. et Bourc.) — 1 ♀ Veragua.
2. *Roberti* (Salv.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Aphantochroa* Gould 1863.

1. *cirrochloris* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Eupetomena* Gould 1853.

1. *macrura* (Gm.) — 5 ♂ Brasilien.

Genus *Cochigena* Less. 1832.

1. *Clemenciae* Less. — 3 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Chariessa* Heine 1863.

1. *Henrici* (Less. et Del.) — 1 ♂ Mexico.
2. *viridipallens* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Orotrochilus* Gould 1847.

1. *Chimborazi* (Bourc.) — 1 ♂, 1 ♀ Panza (Chimborazo).
2. *Pichinchae* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Pichincha; 1 ♀ Ecuador.
3. *Estellae* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂, 1 ♀ Bolivien.
4. *leucopleurus* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Topaza* Gray 1840.

1. *pella* (L.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Guiana.

Genus *Eulampis* Boie 1831.

1. *jugularis* (L.) — 1 ♂ Martinique.

Subfam. Lampornithinae.

Genus *Lampornis* Sws. 1827.

1. *holosericea* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Portorico.
2. *veraguensis* Gould — 1 ♂, 1 ♂ juv. Veragua.
3. *Prevosti* (Less.) — 1 ♂ Mexico.
4. *graminea* (Gm.) — 4 ♂, 1 ♂ juv. Guiana.
5. *violicauda* (Bodd.) — 4 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.
6. *iridescent* Gould — 1 ♂ jun. Babahoyo (Ecuador).

Genus *Endoxa* Heine 1863.

1. *mango* (L.) — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Chalybura* Rehb. 1854.

1. *Buffoni* (Less.) — 2 ♂ Veragua; 2 ♂ Caracas; 1 ♂ Bogota;
1 ♀ Neu-Granada.

1. *caeruleiventris* (Rchb.) — 2 ♂ Neu-Granada.

Genus *Eugenes* Gould 1856.

1. *fulgens* (Sws.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Mexico.

Genus *Chrysolampis* Boie 1831.

1. *moschita* (L.) — 3 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♂ juv., 3 ♀ Guiana.
2. *Reichenbachii* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 21] — 2 ♂ Neu-Granada.

Genus *Aspasta* Heine 1863.

1. *otero* (Tsch.) — 1 ♂ jun. Nord-Peru.
2. *Leadbeateri* (Bourc.) — 1 ♂ Bogota; 2 ♂, 2 ♀ Neu-Granada.

Genus *Heliodoxa* Gould 1849.

1. *jacula* Gould — 1 ♂ Bogota.
2. *Jamesoni* (Bourc.) — 1 ♀ Nanegal (Ecuador).

Genus *Thalurania* Gould 1847.

1. *glaucopis* (Gm.) — 5 ♂, 4 ♀ Brasilien.
2. *verticeps* Gould — 1 ♂ Peru.
3. *eriphile* (Less.) — 1 ♂ Brasilien.
4. *nigrofasciata* Gould — 2 ♂ Bogota; 1 ♂ Rio Negro; 1 ♂ Neu-Granada.
5. *furcata* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Guiana.
6. *forficata* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 24] — 1 ♂ Para.
7. *columbica* (Bourc. et Muls.) — 2 ♂ Neu-Granada.
8. *Wagleri* (Less.) — 1 ♂ Para.

Genus *Sporadicus* Bp. 1854.

1. *elegans* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Haiti.

Genus *Petasophora* Gray 1840.

1. *serrirostris* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

2. *iolata* Gould — 5 ♂ Bolivien.
3. *anaïs* (Less.) — 2 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ jun. Bogota.
4. *cyanotis* (Bourc.) — 2 ♂ Peru.
5. *Cabanidis* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 182] — 1 ♂ Costa-Rica.
6. *thalassina* (Sws.) — 1 ♂ Veragua.

Genus *Telesilla* Rchb. 1854.

1. *Delphinae* (Less.) — 2 ♂ Neu-Granada.

Subfam. Heliotrichinae.

Genus *Schistes* Gould 1853.

1. *Geoffroyi* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Heliothrix* Boie 1831.

1. *aurita* (Gm.) — 2 ♂ Guiana.
2. *auriculata* („Licht.“ Nordm.) — 2 ♂ Brasilien.

Subfam. Florisuginae.

Genus *Florisuga* Bp. 1850.

1. *mellivora* (L.) — 1 ♂, 2 ♂ adolesc., 1 ♂ juv. Guiana; 1 ♀ jun. Bogota.
2. *fusca* (Vieill.) — 3 ♂, 3 ♀ Brasilien.

Genus *Lamprolaema* Rchb. 1854.

1. *Rhami* (Less.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Clytolaema* Gould 1853.

1. *rubinea* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 2 ♀ Brasilien.

Genus *Phacolaema* Rehb. 1854.

1. *granadensis* Cab. et Heine [*Trochilus rubinoides* (!) Bourc. et Muls.] — 1 ♂, 1 ♂ jun. Bogota.
2. *aequatorialis* Gould — 1 ♂ Ecuador.

Subfam. Hylocharinae.

Genus *Leucippus* Bp. 1850.

1. *chionogaster* (Tsch.) — 1 ♂ Bolivien; 1 ♀ Peru.

Genus *Leucochloris* Rehb. 1854.

1. *albicollis* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Agyrtria* Rehb. 1854.

1. *candida* (Bourc. et Muls.) — 1 ♀ Mexico.
2. *tephrocephala* (Vieill.) [*Ornismya albiventris* Less.] — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *Tobaci* (Gm.) [*Trochilus maculatus* Vieill.] — 1 ♂, 1 ♂ jun. Para.
4. *apicalis* (Gould) — 1 ♂ Caracas.
5. *terpna* Heine* (Journ. Orn. 1863 p. 184) — 1 ♂ Bogota.
6. *Milleri* (Bourc.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
7. *leucogastra* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Bahia.
8. *brevirostris* (Less.) — 1 ♂, 4 ♂ jun., 1 ♀ jun. Brasilien.
9. *compsa* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 185] [*A. mellisuga* Cab. et Heine (nec *Trochilus mellisugus* L.) Mus. Hein. III. p. 34] — 2 ♂ jun. Guiana.

Genus *Pyrrhophæna* Cab. et Heine 1860.

1. *Amazili* (Less.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. West-Peru.
2. *leucophaea* (Rehb.*) [Aufz. Col. p. 24] — 1 ♂, 1 ♂ jun. Süd-Peru.
3. *Dumerili* (Less.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).

Genus *Eranna* Heine 1863.

1. *cinnamomea* (Less.) — 1 ♂ Mexico.
2. *Graysoni* (Lawr.) — 1 ♂ Insel Tres-Marias.
3. *cerviniventris* (Gould) — 1 ♀ Süd-Mexico.
4. *fuscicaudata* (Fras.) [*Trochilus Riefferi* Bourc.] — 2 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Veragua ?.
5. *jucunda* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 188] — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador); 1 ♂ jun. Esmeraldas (Ecuador).
6. *Dubusi* (Bourc.) — 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♂ Veragua.
7. *beryllina* (Lcht.) — 2 ♂ Mexico.
8. *Mariae* (Bourc.) [*Trochilus Devillei* Bourc.] — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Eratina* Heine 1863.

1. *viridiventris* (Rchb.) [*Trochilus viridigaster* (!) Bourc.] — 1 ♂ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada.
2. *iodura* („Saucerotte“ Cab. et Heine*) [Mus. Hein. III. p. 39] — 1 ♂ Columbien.

Genus *Hemithylaca* Cab. et Heine 1860.

1. *niveiventris* (Gould) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Veragua.
2. *erythronota* (Less.) — 7 ♂, 1 ♂ juv. Columbien.
3. *Feliciae* (Less.) — 1 ♂ Venezuela.
4. *Sophiae* (Bourc. et Muls.) [*H. Hoffmanni* Cab. et Heine* Mus. Hein. III. p. 38] — 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♂ Guatemala.
5. *Warscewiczii* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 38] — 2 ♂ Veragua.
6. *braccata* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 193] [*H. caligata* Cab. et Heine (nec Gould) Mus. Hein. III. p. 39] — 1 ♂ Merida.

Genus *Eratopis* Heine 1863.

1. *cyanifrons* (Bourc.) — 1 ♂, 2 ♂ jun. Neu-Granada; 1 ♂ Veragua; 1 ♀ Columbien.

Genus *Polyerata* Heine 1863.

1. *amabilis* (Gould) — 3 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ jun., 1 ♀ Bogota.

Genus *Damophila* Rehb. 1854.

1. *Juliae* (Bourc.) — 3 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Bogota.
2. *Felicianae* (Less.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Esmeraldas (Ecuador).

Genus *Lepidopyga* Rehb. 1854.

1. *caeruleigularis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Veragua.
2. *Goudoti* (Bourc.) — 1 ♂ Columbien.

Genus *Uranomitra* Rehb. 1854.

1. *quadricolor* (Vieill.) — 1 ♂ Mexico.
2. *violiceps* (Gould) — 1 ♂ Mexico.
3. *Faustinae* (Rehb.) [*U. Lessoni* Cab. et Heine* Mus. Hein. III. p. 41] — 2 ♂ Xalapa; 1 ♂ Mexico.
4. *Franciae* (Bourc. et Muls.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ Bogota.

Genus *Phaeoptila* Gould 1861.

1. *sordida* Gould — 1 ♀ Mexico.

Genus *Eupherusa* Gould 1861.

1. *eximia* (Delattr.) — 2 ♂ Guatemala.

Genus *Chysurisca* Cab. et Heine 1860.

1. *oenone* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Caracas; 1 ♂, 1 ♀ Veragua.
2. *Eliciae* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Guatemala; 1 ♂ jun. Honduras.

Genus *Eucephala* Rehb. 1854.

1. *Grayi* (Delattr. et Bourc.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Hylocharis* Boie 1831.

1. *sapphirina* (Gm.) — 3 ♂, 3 ♂ jun., 1 ♂ juv. Brasilien.
2. *lactea* (Less.) — 1 ♂ Brasilien.
3. *cyanea* (Vieill.) — 7 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.

Genus *Jache* Elliot 1879 (*Circe* Gould 1861 nec Mert.
1835).

1. *latirostris* (Sws.) — 1 ♂ Rio-Negro.

Genus *Claüs* Rchb. 1854.

1. *Guimeti* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Veragua; 1 ♂ jun. Caracas.

Genus *Basilinna* Boie 1831.

1. *leucotis* (Vieill.) — 2 ♂ Mexico; 1 ♀ Neu-Granada (?).

Genus *Augastes* Gould 1850.

1. *superbus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ juv. Bahia.
2. *lumachellus* (Less.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Bahia.

Genus *Chlorestes* Rchb. 1854.

1. *caeruleus* (Vieill.) [*C. mentalis* Cab.* Journ. Orn. 1866 p. 159] —
1 ♂, 1 ♀ Caracas.
2. *cyanogenys* (Wied) — 4 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Chlorostilbon* Gould 1853.

1. *splendidus* (Vieill.) [*Trochilus phaëthon* Bourc.] — 1 ♂ Süd-
Brasilien.
2. *Pucherani* (Bourc. et Muls.) — 3 ♂, 2 ♂ var. Brasilien.

Genus *Chloauges* Heine 1863.

1. *Caniveti* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Cordova (Süd-Mexico).

2. *Salvini* (Cab. et Heine*) [Mus. Hein. III. p. 48] — 1 ♂, 1 ♂ jun. Costa-Rica.

Genus *Chlorolampis* Cab. et Heine 1860.

1. *angustipennis* (Fras.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ Columbien.
2. *smaragdina* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 48] — 2 ♂ Venezuela.
3. *peruana* (Gould) — 2 ♂, 1 ♀ Peru.
4. *Haerberlini* („Lcht.“ Rchb.) — 1 ♂ Bogota.
5. *brevicaudata* (Gould) — 1 ♀ Cayenne.

Genus *Prasitis* Cab. et Heine 1860.

1. *prasina* (Less.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♂ Brasilien.
2. *phaecopyga* („Lcht.“ Tsch.) — 1 ♀ Peru.

Genus *Panychlora* Cab. et Heine 1860.

1. *euchloris* Rchb.* [Aufz. Col. p. 23; Mus. Hein. III. p. 49; Journ. Orn. 1863 p. 205] — 1 ♂ Nord-Peru.
2. *aurata* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 50; Journ. Orn. 1863 p. 205] — 2 ♂ Peru.
3. *Poortmanni* (Bourc.) — 3 ♂ Neu-Granada.

Genus *Aithurus* Cab. et Heine 1860.

1. *polytmus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Jamaica.

Subfam. Trochilinae.

Genus *Entima* Cab. et Heine 1860.

1. *Lafresnayi* (Boiss.) — 4 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada.
2. *Gayi* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Sparganura* Cab. et Heine 1860.

1. *Sappho* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Bolivien.

Genus *Psalidoprymna* Cab. et Heine 1860.

1. *Victoriae* (Bourc. et Muls.) — 3 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Ecuador.
2. *eucharis* (Bourc.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Peru.

Genus *Heliomaster* Bp. 1850.

1. *squamosus* Temm. — 2 ♂, 3 ♂ juv. Brasilien.
2. *furcifer* (Shaw) [*Ornismya Angelae* Less.] — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀
Buenos Ayres.
3. *Constanti* (Delattr.) — 1 ♂ Costa Rica.
4. *pallidiceps* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
5. *Stuartae* Lawr. — 1 ♂ Bogota.
6. *Sclateri* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 58] — 2 ♂ Veragua.
7. *longirostris* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ Cayenne.

Genus *Calothorax* Gray 1840.

1. *lucifer* (Sws.) — 3 ♂, 3 ♀ Mexico.
2. *pulcher* Gould — 1 ♂ Süd-Mexico.

Genus *Atthis* Rehb. 1854.

1. *Heloisae* (Less. et Delattr.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Mexico.

Genus *Calypte* Gould 1861.

1. *Annae* (Less.) — 1 ♂ Californien.
2. *Costae* (Bourc.) — 1 ♂ La Paz (Nieder-Californien).

Genus *Selasphorus* Sws. 1832.

1. *platycercus* (Sws.) — 4 ♂ Mexico.
2. *scintilla* Gould — 1 ♂ Veragua.
3. *rufus* (Gm.) — 2 ♂ Californien.

Genus *Trochilus* Lin. 1748.

1. *colubris* L. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Nord-America.
2. *Alexandri* Bourc. et Muls. — 1 ♂ Mexico.

Genus *Calliphlox* Boie 1831.

1. *amethystina* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 2 ♀ Brasilien.

Genus *Thaumastura* Bp. 1850.

1. *Corae* (Less. et Garn.) — 2 ♂ Peru.

Genus *Dolicha* Rehb. 1854.

1. *henicura* (Vieill.) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Myrtis* Rehb. 1854.

1. *Franciscae* [Fanny (!)] (Less.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Chaetocercus* Gray 1855.

1. *Rosae* (Bourc. et Muls.) — 2 ♂, 1 ♀ Caracas.

Genus *Acestrura* Gould 1861.

1. *Heliodori* (Bourc.) — 2 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♂ Neu-Granada;
2 ♂ jun. Peru.
2. *Mulsanti* (Bourc.) — 2 ♂ Neu-Granada; 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Subfam. Orthorhynchinae.

Genus *Orthorhynchus* Lacép. 1799—1800.

1. *cristatus* (L.) — 1 ♂ Barbadoes; 1 ♂ West-Indien.

Genus *Cephalolepis* Lodd. 1830.

1. *Delalandi* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Lophornis* Less. 1829.

1. *magnifica* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien.
2. *ornata* (Bodd.) — 2 ♂, 2 ♂ juv. Cayenne.
3. *stictolopha* (Salv. et Ell.) [*L. reginae* Gould nec Schreib.] — 1 ♂,
1 ♀ Bogota.
4. *Delattrei* Less. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
5. *Helenae* (Delattr.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Mexico.

Genus *Polemistria* Cab. et Heine 1860.

1. *chalybea* (Vieill.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Heliactin* Boie 1831.

1. *cornuta* (Wied) — 3 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Tricholopha* Heine 1863.

1. *Popelairi* (Dubus) — 1 ♂, 1 ♀ Peru; 1 ♂ Bogota.

Genus *Prymnacantha* Cab. et Heine 1860.

1. *Conversi* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Neu-Granada.
2. *Langsdorffi* (Vieill.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Discura* Rehb. 1854.

1. *longicauda* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♂ juv. Brasilien.

Genus *Steganurus* Rehb. 1849.

1. *Underwoodi* (Less.) — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Granada.
2. *discifer* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 210] — 1 ♂ Merida.
3. *remiger* Rehb.* [Aufz. Colibr. p. 24] — 1 ♂ Nord-Peru.
4. *melanantherus* (Jard.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Pallatanga (Ecuador).

Subfam. Lesbiinae.

Genus *Oxypogon* Gould 1848.

1. *Guerini* (Boiss.) — 2 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ juv. Bogota.

Genus *Chalcostigma* Rehb. 1854.

1. *heteropogon* (Boiss.) — 2 ♂ Neu-Granada.
2. *Stanleyi* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Chimborazo (Ecuador).

Genus *Urolampra* Cab. et Heine 1860.

1. *tyrianthina* (Lodd.) — 3 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada; 1 ♂ Bogota; 1 ♀ Peru (?).
2. *quitensis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Puellaro (Ecuador).
3. *aeneicauda* (Gould) — 1 ♀ Peru.
4. *chloropogon* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 68] — 1 ♂, 1 ♀ (an ♂ juv.) Hab.?

Genus *Metallura* Gould 1847.

1. *opaca* („Licht.“ Tsch.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Aglaïactis* Gould 1848.

1. *Pamelae* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂, 1 ♀ Bolivien.
2. *cupripennis* (Bourc. et Muls.) — 3 ♂ Neu-Granada.
3. *aequatorialis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. III. p. 70 Ann.] — 1 ♀ Chimborazo (Ecuador).

Genus *Rhamphomicron* Bp. 1850.

1. *microrhynchum* (Boiss.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada; 1 ♀ Bogota.

Genus *Agalyta* Cab. et Heine 1860.

1. *Gouldi* (Lodd.) — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ juv. Bogota.
2. *gracilis* (Gray) — 1 ♂ Chillanes (Ecuador); 1 ♂ juv. Calacali (Ecuador).

Genus *Lesbia* Less. 1832.

1. *mocoa* (Delattr. et Bourc.) — 1 ♂ Bolivien.
2. *cyanura* (Steph.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Columbien; 1 ♀ Bogota.
3. *Kingi* (Less.) — 1 ♂ Peru.
4. *caelestis* (Gould) — 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
5. *Margarethae* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 203] — 1 ♂ juv. Caracas.

Genus *Adelisca* Cab. et Heine 1860.

1. *melanogenys* (Fras.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
2. *maculata* (Gould) — 1 ♂ Puellaro (Ecuador).

Genus *Baucis* Rehb. 1854.

1. *Abeillei* (Delattr. et Less.) — 2 ♂ Guatemala.

Genus *Eriocnemis* Rehb. 1849.

1. *Alinæ* (Bourc.) — 2 ♂ Neu-Granada.
2. *Aureliae* (Bourc. et Muls.) — 2 ♂ Neu-Granada.
3. *cupreiventris* (Fras.) — 5 ♂ Neu-Granada.
4. *Luciani* (Bourc.) — 1 ♂ Quito.
5. *vestita* (Longuem.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Neu-Granada; 1 ♂ jun. Bogota.
6. *smaragdinipectus* Gould — 1 St. Cueste (Ecuador).

Genus *Panoplites* Gould 1854.

1. *flavescens* (Lodd.) — 2 ♂ Peru.

Genus *Heliotryphon* Gould 1853.

1. *viola* Gould — 2 ♂ Peru.
2. *exortus* [*exortis* (!)] (Fras.) [*Ornismya Parzudakii* Longuem. et Parz.] — 2 ♂ Neu-Granada.

Genus *Heliangelus* Gould 1848.

1. *Clarissae* (Longuem.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada.
2. *strophianus* (Gould) — 1 ♂ Ecuador.
3. *amethysticollis* (Lafr. et d'Orb.) — 2 ♂ Bolivien.

Genus *Eustephanus* Rehb. 1849.

1. *Fernandensis* (King) — 1 ♂, 1 ♀ [*Trochilus Stokesi* King] Ins. Juan Fernandez.
2. *galeritus* (Mol.) — 3 ♂, 2 ♀ Chile.

Genus *Streblorhamphus* Cab. et Heine 1860.

1. *recurvirostris* (Sws.) — 2 ♂ Cayenne.

Genus *Opisthoprora* Cab. et Heine 1860.

1. *euryptera* (Lodd.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Docimastes* Gould 1849.

1. *ensifer* (Boiss.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ [*D. Schliephackei* Heine* Journ. Orn. 1863 p. 215] Riobamba (Ecuador); 1 ♂, 1 ♀ jun. Peru.

Genus *Hemistephania* Rehb. 1854 (*Doryfera* (!) Gould 1847 nec *Doryphora* Ill. 1811).

1. *Ludoviciae* (Bourc. et Muls.) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ Bogota.
2. *Johannae* (Bourc.) — 1 ♂ Bogota.

Genus *Lampropygia* Rehb. 1854.

1. *caeligena* (Less.) — 1 ♂ Caracas; 1 ♂ Neu-Granada.

2. *Wilsoni* (Delattr. et Bourc.) — 1 ♂ Ecuador.

Genus *Homophania* Rehb. 1854.

1. *Prunellei* (Bourc. et Muls.) — 2 ♂ Neu-Granada.

Genus *Polyaena* Heine 1863.

1. *torquata* (Boiss.) — 2 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada.
2. *fulgidigula* (Gould) — 1 ♂ jun. Lloa (Ecuador); 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
3. *Conradi* (Bourc.) — 1 ♂ Merida.

Genus *Helianthea* Bp. 1848.

1. *typica* (Less.) — 3 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Granada.
2. *Bonapartei* (Boiss.) — 3 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Bogota.
3. *Lutetiae* (Bourc. et Delattr.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Chimborazo (Ecuador).

Genus *Pterophanes* Gould 1849.

1. *Temmincki* (Boiss.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Bolivien.

Genus *Hypermetra* Cab. et Heine 1860.

1. *gigas* (Vieill.) — 1 ♂ Bolivien; 1 ♂ juv. Peru; 1 ♂, 1 ♀ Chile.
-

Fam. Cypselidae.

Genus *Collocalia* Gray 1840.

1. *nidifica* (Lath.) — 1 ♀ Java.
2. *francica* (Gm.) — 1 ♀ Isle de France.
3. *spodiopygia* Peale — 1 ♀ Andamanen.
4. *Linchi* Horsf. — 1 ♀ Andamanen.

Genus *Dendrochelidon* Boie 1828?

1. *comata* (Temm.) — 1 ♂ Sumatra.
2. *mystacea* (Less.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
3. *klecho* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Java.
4. *Wallacei* Gould — 1 ♂ Macassar.

Genus *Chaetura* Steph. 1825.

1. *caudacuta* (Lath.) — 1 ♂ Australien; 1 ♂ Kultuk (Baikalsee).
2. *pelasgia* (L.) — 1 ♀ Nord-America.
3. *indica* Hume — 1 ♂ Ostindien.
4. *stictolaema* Rchw. — 1 St. Usegua (Ost-Africa).

Genus *Hemiprogne* Nitzsch 1840.

1. *zonaris* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Mexico.
2. *semicollaris* (de Sauss.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Cypselus* Ill. 1811.

1. *melba* (L.) — 1 ♂ Schweiz.

2. *apus* (L.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♀ juv. Harz; 1 St. (variet.) Egypten.
 3. *affinis* Gray — 1 ♂ Simla (Ostindien).
 4. *caffer* Licht. — 1 ♀ Sennaar.
 5. *pacificus* Lath. — 1 St. Sibirien.
 6. *parvus* Licht. — 1 ♀ Nubien.
-

Fam. Caprimulgidae.

Subfam. Chordedilinae.

Genus *Chordediles* Sws. 1831.

1. *virginianus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *minor* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Cuba.
3. *texensis* Lawr. — 1 ♂ Mexico.
4. *brasilianus* (Gm.) [*C. peruvianus* Peale] — 1 ♀ juv. Peru.

Genus *Urocolus* Cab. et Heine 1860.

1. *Nattereri* (Temme.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Podager* Wagl. 1832.

1. *nacunda* (Vieill.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Lyncornis* Gould 1838.

1. *cerviniceps* Gould — 1 ♂ Ostindien.

Subfam. Caprimulginae.

Genus *Caprimulgus* L. 1756.

1. *europaeus* L. — 2 ♂, 3 ♀ Harz.
2. *ruficollis* Temm. — 1 ♂ Spanien; 1 ♂ Tanger.
3. *aegyptius* Licht. — 2 ♂, 1 ♀ Egypten.
4. *nubicus* Licht. — 2 ♂, 1 ♀ N.-O.-Africa.
5. *pectoralis* Cuv. — 1 ♂ Port-Natal.
6. *macrurus* Horsf. — 1 ♂ Malacca; 1 ♂ Java; 1 ♂ Sumatra.
7. *asiaticus* Lath. — 1 ♂ Ostindien.
8. *monticolus* Frankl. — 1 ♂ Rasperdam (Ostindien).
9. *mahrattensis* Sykes — 1 ♀ Urauwalta (Ostindien).

Genus *Scotornis* Sws. 1837.

1. *longicauda* (Drap.) — 2 ♂ N.-O.-Africa; 1 ♀ W.-Africa.

Genus *Macrodipteryx* Sws. 1837.

1. *longipennis* (Shaw) — 1 ♂ N.-O.-Africa.

Genus *Antrostomus* Gould 1838.

1. *carolinensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cuba.
2. *nigrescens* (Cab.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.

Genus *Stenopsis* Cass. 1851.

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Cayenne.
2. *ruficervix* Scl. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 juv. Chimborazo (Ecuador).

Genus *Nyctidromus* Gould 1838.

1. *albicollis* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Xalapa; 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♂ Guiana; 2 ♂, 2 ♀ Brasilien; 1 juv. Esmeraldas (Ecuador).

Genus *Eleothreptus* Gray 1840.

1. *anomalus* (Gould) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Hydropsalis* Wagl. 1832.

1. *torquata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
2. *segmentata* Cass. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

Subfam. Nyctibiinae.

Genus *Nyctibius* Vieill. 1816.

1. *grandis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Surinam; 1 ♀ Brasilien.
2. *aethereus* (Wied) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *jamaicensis* (Gm.) — 1 ♂ Guatemala.
4. *bracteatus* Gould — 1 ♂ Ecuador.

Tribus II. Amphibolae.

Fam. Coliidae.

Genus *Colius* Briss. 1760.

1. *capensis* Gm. — 2 ♂, 1 juv. Süd-Africa.
2. *striatus* Gm. — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂, 2 ♀ Cap.
3. *leucotis* Rüpp. — 2 ♂ Abessinien.
4. *macrurus* (L.) — 2 ♂ Chartum (Egypten); 1 ♂ jun. Cordofan;
1 ♀ Sennaar.
5. *erythromelas* Vieill. — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Fam. Musophagidae.

Genus *Corythaix* Ill. 1811.

1. *musophagus* Dubois [*albocristatus* Strickl.] — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀
Cap.
2. *Buffoni* (Vieill.) — 2 ♀ Guinea.
3. *leucotis* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.
4. *macrorhynchus* Fras. — 1 ♂ Guinea-Küste.
5. *Reichenowi* Fischer — 1 St. Usaramo (Ost-Africa).

6. *Meriani* Rüpp. — 1 ♂ jun. Gabun; 1 St. Angola (West-Africa).
7. *Fischeri* Rehw. — 1 ♂ Muniuni (Ost-Africa).

Genus *Gallirex* Less. 1844.

1. *porphyreolophus* (Vig.) — 1 ♂ Port-Natal.
2. *chlorochlamys* Shelley — 1 St. Pangani (Ost-Africa).

Genus *Corythaeola* Heine 1860.

1. *cristata* (Vieill.) — 1 ♂ Goldküste.

Genus *Musophaga* Isert 1789.

1. *violacea* Isert — 2 ♂ Senegambien.

Genus *Schizorhis* Wagl. 1829.

1. *africana* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Senegambien.
2. *zonura* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.
3. *concolor* (Smith) — 2 ♂ Cap.

Ordo IV. Scansores.

Fam. Indicatoridae.

Subfam. Indicatorinae.

Genus *Indicator* Vieill. 1816.

1. *minor* Steph. — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♀ Süd-Africa.
2. *variegatus* Less. — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♀ Süd-Africa.
3. *Sparmanni* Steph. — 1 ♂ Süd-Africa.

Subfam. Iynginae.

Genus *Iynx* L. 1748.

1. *torquilla* L. — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Harz.
 2. *meridionalis* Sund. — 1 ♂ Scinde Valley (Kaschmir).
 3. *pectoralis* Vig. — 1 ♂ Cap.
-

Fam. Cuculidae.

Genus *Chrysococcyx* Boie 1826.

1. *intermedius* „Verr.“ Hartl. — 1 ♂ Ins. St. Thomé; 1 ♀ Gabun.
2. *cupreus* (Lath.) [*Cuculus splendidus* Gray] — 1 ♂ Kaffernland.
3. *smaragdineus* (Sws.) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♂ Casamanze (West-Africa).

Genus *Lamprococcyx* Cab. et Heine 1862.

1. *cupreus* (Bodd.) — 1 ♂ Cap; 1 ♂ Kaffernland.
2. *chrysochlorus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 11] — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar.
3. *chrysites* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 350] — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Gabun.
4. *resplendens* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 350] — 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Gabun.
5. *Klaasi* (Steph.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ jun. Cap.
6. *basalis* (Horsf.) — 1 ♂ juv. Java.
7. *plagosus* (Lath.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Süd-Wales.

Genus *Chalcococcyx* Cab. et Heine 1862.

1. *xanthorhynchus* (Horsf.) — 1 ♂ Borneo.

Genus *Misocalius* Cab. et Heine 1862.

1. *palliolatus* (Lath.) — 2 St. Süd-Australien.

Genus *Penthoceryx* Cab. et Heine 1862.

1. *pravatus* (Horsf.) — 1 ♂ Timor; 1 ♀ Java.

Genus *Cacangelus* Cab. et Heine 1862.

1. *lugubris* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Java; 1 ♂ juv. Malacca; 1 ♂ Ostindien.

Genus *Cacomantis* Müll. 1842.

1. *passerinus* (Vahl) — 1 ♂ Pondichery; 1 ♂ Ceylon; 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Ostindien.
2. *threnodes* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 19] — 1 ♂ Malacca; 1 juv. Salanga (Siam).
3. *sepulchralis* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Java.
4. *borneensis* Bp. — 1 ♂, 2 ♂ jun., 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Borneo; 1 ♂ juv. Sumatra.
5. *querulus* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 352] — 1 St. Nepal.
6. *dysonymus* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 352] — 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ jun. Java.
7. *merulinus* (Scop.) — 1 ♀ juv. Philippinen.
8. *infaustus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 23] — 1 ♂ (var. *minor*) Mysol; 2 St. (var. *maior*) Batchian.
9. *assimilis* Gray — 1 ♂ Neu-Britannien.
10. *flabelliformis* (Lath.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ West-Australien; 1 ♂ Broken Bay (Süd-Australien); 1 ♂ jun. Port Albert, Gippsland (Süd-Australien).
11. *bronzinus* Gray — 1 ♂ Neu-Caledonien.
12. *virescens* Brüggemann — 1 ♂ Celebes.

Genus *Heteroscenes* Cab. et Heine 1862.

1. *pallidus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Vandiemensland; 1 ♀ jun. Port Philipp (Süd-Australien); 1 ♂ juv. West-Australien.

Genus *Hiracococcyx* Müll. 1842.

1. *pectoralis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 27] — 1 ♂ Philippinen.

2. *varius* (Vahl) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Ostindien.
3. *sparverinus* [*sparveroides* (!)] (Vig.) — 1 ♂ Ping Rang, Johore (Malacca).
4. *fugax* (Horsf.) — 1 ♀ jun. Borneo; 1 juv. Malacca.

Genus *Cuculus* L. 1735.

1. *canorus* L. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂-juv., 1 ♀ adolesc., 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. (var. *rufa*) Harz.
2. *indicus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 34] — 1 ♂ Ostindien.
3. *telephonus* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 352] — 1 ♂ Japan.
4. *leptodetus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 34] — 1 ♂ juv. Keren (Bogosland).
5. *canorinus* [*canoroides* (!)] Müll. — 1 ♂ adolesc., 1 ♀ adolesc., 1 ♀ juv. Timor; 1 ♂ juv. Morty-Insel; 1 ♀ juv. Java; 1 ♂ Neu-Britannien.
6. *micropterus* Gould — 1 ♂ Sikkim (Bengalen).
7. *striatus* Drap. — 1 ♂, 1 ♂ juv. Malacca; 1 ♂ Jafferia, Johore (Malacca).
8. *mesites* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 354] [*C. tenuirostris* Cab. et Heine (nec Müll.)] — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Java; 1 ♀ jun. Sumatra.
9. *lineatus* Less. [*C. tenuirostris* Müll.] — 2 ♂ Java.
10. *poliocephalus* Lath. — 1 ♂, 1 ♀ jun. Ostindien.
11. *concretus* Müll. — 1 ♂ Borneo.
12. *Swinhoei* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 37 Anm.] — 1 ♂ Formosa.
13. *rubeculus* Sws. — 1 ♂ Gabun.
14. *Heuglini* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 42] — 1 ♂ Bahr el Abiad (Nubien).
15. *capensis* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ jun. Süd-Africa.
16. *clamosus* Lath. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Süd-Africa.
17. *nigricans* Sws. — 1 ♂ Ain Saba (Abessinien).

Genus *Coccystes* Glog. 1834.

1. *glandarius* (L.) — 1 ♂ Spanien; 1 ♀ Algier; 1 ♂ jun. Nordost-Africa.
2. *coromandus* (L.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ Nepal.
3. *jacobinus* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Ostindien.
4. *pica* (Hempr. et Ehrb.) — 1 ♂ Nubien.
5. *hypopinarus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 47] — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Cap.
6. *serratus* (Sparrm.) — 2 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♂ jun. Kaffernland.
7. *caffer* (Licht. sen.) — 1 ♀ Nubien.

Genus *Eudynamis* Vig. et Horsf. 1826.

1. *nigra* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ jun. Ostindien; 1 ♀ Malacca.
2. *malayana* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 52] — 1 ♂ Java; 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♂ jun. Sumatra.
3. *mindanensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Luzon.
4. *melanorhyncha* Müll. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Celebes.
5. *Flindersi* Vig. et Horsf. — 1 ♂, 2 ♀ Australien; 1 juv. Hunter River (Neu-Süd-Wales).
6. *orientalis* (L.) — 1 ♂ Buru; 1 ♀ Ceram.
7. *taitiensis* (Sparrm.) — 1 ♂ Otaheiti; 1 ♂, 1 ♀ Neu-Seeland.

Genus *Scythrops* Lath. 1790.

1. *Novae Hollandiae* Lath. — 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Subfam. Phoenicophaginae.

Genus *Rhinortha* Vig. 1830.

1. *chlorophaea* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♀ Sumatra; 2 ♂ Malacca.

Genus *Ceuthmochares* Cab. et Heine 1862.

1. *aereus* (Vieill.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Rhopodytes* Cab. et Heine 1862.

1. *Diardi* (Less.) — 1 ♀ Malacca.
2. *borneensis* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Jambusan-Sarawak (Borneo).
3. *sumatranus* (Raffl.) — 1 ♂, 2 ♀ Java.
4. *viridirostris* (Jerd.) — 1 ♂ Ceylon.
5. *elongatus* (Müll.) — 1 ♂ Java.
6. *tristis* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
7. *longicaudatus* (Blyth) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Zanclostomus* Sws. 1837.

1. *javanicus* (Horsf.) — 1 ♂, 4 ♀ Java.

Genus *Rhamphococcyx* Cab. et Heine 1862.

1. *calorhynchus* (Temm.) — 1 ♂ Macassar; 1 St. Celebes.
2. *curvirostris* (Shaw) — 1 ♂ Java.
3. *erythrognathus* (Hartl.) — 1 ♂, 3 ♀ Malacca.

Genus *Phoenicophaës* Steph. 1815.

1. *pyrrhocephalus* (Forst.) — 1 ♂ Ceylon.

Genus *Dasylophus* Sws. 1837.

1. *superciliosus* (Cuv.) — 2 ♂ Philippinen.

Genus *Lepidogrammus* Rehb. 1849.

1. *Cumingi* (Fras.) — 1 ♂ Philippinen.

Subfam. Sericosominae.

Genus *Glaucococcyx* Cab. et Heine 1862.

1. *caeruleus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Madagascar.

Genus *Sericosomus* Sws. 1837.

1. *cristatus* (L.) — 1 ♂ Madagascar.
2. *Coquereli* (Grand.) — 1 ♂ Nordküste von Madagascar.
3. *serrianus* (Puch.) — 1 ♀ Antsompirina (Madagascar); 1 ♀ jun.
(var. *minor*?) Marovare (Madagascar).

Subfam. Coccyzontinae.

Genus *Coccyzon* [*Coccyzus* (!)] Vieill. 1816.

1. *americanus* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Georgien.
2. *erythrophthalmus* Wils. — 1 ♂ New-York.
3. *cinereus* Vieill. — 1 ♂ Mendoza (Argentinien).
4. *melanocoryphus* Vieill. — 1 St. Neu-Freiburg (Brasilien).

Genus *Hyetornis* ScL. 1862.

1. *pluvialis* (Gm.) — 1 ♂ Jamaica.

Genus *Morococcyx* ScL. 1862.

1. *erythropygus* (Less.) — 1 ♂, 1 jun. Tehuantepec (Mexico).

Genus *Pyrrhococcyx* Cab. 1847.

1. *mexicanus* (Sws.) — 1 ♀ West-Mexico.
2. *Mehleri* (Bp.) — 2 ♂ Xalapa.
3. *columbianus* Cab.* [Journ. Orn. 1862 p. 170] — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♂ Santa Marta (Neu-Granada).

4. *mesurus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 83 Anm.] —
1 ♀ Nanegal (Ecuador).
5. *nigricrissus* (Scl.) — 1 ♂ Rio Napo (Ecuador); 1 ♂ Neu-
Granada.
6. *guianensis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 85] — 2 ♂,
1 ♀ Guiana.
7. *pallescens* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 86] — 1 ♂
Nord-Brasilien.
8. *macrurus* (Gamb.) — 1 ♂ Montevideo; 1 ♂, 2 ♀ Süd-Brasilien.
9. *melanogaster* (Vieill.) — 1 ♀ Guiana.

Genus *Coccyzusa* [*Coccyua* (!)] Less. 1831.

1. *rutila* (Ill.) — 1 ♂, 1 ♀ Para.
2. *gracilis* Heine* [Journ. Orn. 1863 p. 356] — 1 ♀ Esmeraldas
(Ecuador).

Genus *Saurothera* Vieill. 1816.

1. *vetula* (L.) — 1 ♀ Jamaica.
2. *Merlini* d'Orb. — 1 ♂ Cuba.

Genus *Neomorphus* Glog. 1827.

1. *Geoffroyi* (Temm.) — 1 ♂ jun. Süd-America.

Genus *Diplopterus* Boie 1826.

1. *naevius* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 2 ♀ Bahia; 1 ♂ jun. Bogota.
2. *chochi* (Vieill.) — 1 ♀ juv. Süd-Brasilien.

Genus *Dromococcyx* Wied 1832.

1. *phasianellus* (Spix) — 1 ♂ Süd-America; 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Geococcyx* Wagl. 1831.

1. *californianus* (Less.) — 1 ♀ Nord-Mexico.
2. *mexicanus* (Gm.) — 1 ♂ Xalapa; 1 ♀ Süd-Mexico.

Subfam. Crotophaginae.

Genus *Octopteryx* Kaup 1836.

1. *guira* (Gm.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♀ jun. Brasilien.

Genus *Crotophaga* L. 1756.

1. *maior* Gm. — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *ani* L. — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 2 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
3. *sulcirostris* Sws. — 1 ♀ Alvarado (Mexico).

Subfam. Centropodinae.

Genus *Acentetus* Cab. et Heine 1862.

1. *sirkee* (Gray) — 1 St. Raipur (Ostindien).
2. *Leschenaulti* (Less.) — 1 ♂ Malacca.

Genus *Centropus* Ill. 1811.

1. *aegyptius* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc. Abessinien; 1 ♀ Fuah (Egypten).
2. *Burchelli* Sws. — 1 ♀ Süd-Africa.
3. *senegalensis* (L.) — 1 ♂ West-Africa; 1 ♂ jun. Senegal.
4. *superciliosus* Hempr. et Ehrb. — 1 ♂ adolesc. var. *remigum apicibus albidis* Abessinien; 1 ♀ Sennaar.
5. *Grilli* Hartl. — 1 ♂ Gabun.
6. *nigrorufus* (Cuv.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Centrococeyx* Cab. et Heine 1862.

1. *lepidus* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Java; 1 ♀ juv. Borneo.
2. *affinis* (Horsf.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Java.
3. *bengalensis* (Gm.) — 1 ♂ juv., 1 ♀ Nepal.
4. *viridis* (Scop.) — 1 ♂ Philippinen.

5. *lignator* (Swinhoe) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc. Formosa.
6. *moluccensis* („Bernstein“) Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 113] 1 ♀ adolesc. Timor.
7. *rectunguis* (Strickl.) — 1 ♂, 1 ♀ adolesc. Malacca.
8. *rufipennis* (Ill.) — 1 ♀ Java.
9. *sinensis* (Blyth) [*C. validus* Heine* Journ. Orn. 1863 p. 357] —
1 ♂ Ostindien; 1 ♂ Ceylon.
10. *eurycerus* (Hay) — 1 ♂ Borneo.

Genus *Pyrhocentor* Cab. et Heine 1862.

1. *bicolor* (Cuv.) — 1 ♂ Celebes.
2. *andamensis* (Tytler) — 1 ♂ Andamanen.

Genus *Nesocentor* Cab. et Heine 1862.

1. *ateralbus* (Less.) — 1 ♂ Neu-Britannien.
2. *Goliath* (Forst.) — 1 ♀ Gilolo.
3. *menbeki* (Less. et Garn.) — 1 ♂ adolesc. Mysol.

Genus *Polophilus* Leach 1814.

1. *melanurus* (Gould) — 1 ♂ adolesc., 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. West-Australien.
2. *phasianus* (Lath.) — 1 ♂ jun. Neu-Süd-Wales.

Fam. Bucconidae.

Genus *Chelidoptera* Gould 1836.

1. *tenebrosa* (Pall.) — 1 ♂ Para; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Cayenne;
1 ♂ Neu-Granada.
2. *brasiliensis* Scl. — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Monastes* [*Monasa* (!)] Vieill. 1816.

1. *niger* (Müll.) — 1 ♂ Cayenne.
2. *flavirostris* Strickl. — 1 ♂ Neu-Granada.
3. *morphëus* (Hahn et Küster) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
4. *peruanus* „Bp. et Verr.“ Scl. — 1 ♂ jun., 1 ♀ Peru.

Genus *Nonmula* Scl. 1853.

1. *frontalis* Scl. — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Malacoptila* Gray 1841.

1. *torquata* (Hahn et Küster) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *fusca* (Gm.) — 1 ♂ Cayenne; 1 ♀ Peru; 1 ♂ [*M. nigrifusca* Scl.] Neu-Granada.
3. *panamensis* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Chiriqui; 1 ♀ [*M. aequatorialis* Cab. et Heine* Mus. Hein. IV. 1. p. 134] Esmeraldas (Ecuador); 1 ♂ [*M. blacica* Cab. et Heine* l. c. p. 137] Peru; 1 ♂ [*M. mystacalis* Lafr.] Bogota.
4. *inornata* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ [*M. verae-pacis* Scl. et Salvin] Guatemala.
5. *substriata* Scl. — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Nystalus* Cab. et Heine 1863.

1. *maculatus* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *chacuru* (Vieill.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Hypnelus* Cab. et Heine 1863.

1. *bicinctus* (Gould) — 1 ♂ Porto Cabello; 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Venezuela.
2. *ruficollis* (Wagl.) — 1 ♂ Baranquilla; 1 ♂, 1 ♀ Cartagena.

Genus *Chaunornis* Gray 1840.

1. *tamatiä* (Gm.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ juv. Cayenne.
2. *pulmentum* („Bp. et Verr.“ Scl.) — 1 ♂ Oberer Amazonenstrom;
1 ♂ jun. Chamicuros (Peru).

Genus *Nothriscus* Cab. et Heine 1863.

1. *tectus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Para.

Genus *Argicus* Cab. et Heine 1863.

1. *macrodactylus* (Spix) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Bucco* L. 1766.

1. *collaris* Lath. — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Notharchus* Cab. et Heine 1863.

1. *Dysoni* („Gray“ Scl.) — 1 ♂ Central-America.
 2. *hyperhynchus* (Bp.) — 1 ♂ Napo (Ecuador).
 3. *Sraunsoni* (Gray et Mitch.) — 1 ♀ Brasilien.
-

Fam. Trogonidae.

Genus *Pyrotrogon* Bp. 1854.

1. *rutilus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 2 ♀ Sunda-Inseln.
2. *fasciatus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Ceylon.
3. *Diardi* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Malacca; 1 ♂, 1 ♀ Sumatra;
1 ♀ Borneo; 1 ♂, 1 ♀ var. *capite rubescente*
Jambusan-Sarawak (Borneo).
4. *kasumba* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.
5. *ardens* (Temm.) — 1 ♂ Philippinen.
6. *Hodgsoni* (Gould) — 2 ♂, 1 ♀ Nepal.

Genus *Orescius* Bp. 1854.

1. *Gouldi* (Sws.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ Sunda-Inseln.

Genus *Hapalarpactes* Bp. 1854.

1. *Reinwardti* (Temm.) — 1 ♂ Java.

Genus *Hapaloderma* Sws. 1837.

1. *narina* (Steph.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Tmetotrogon* Bp. 1854.

1. *rhodogaster* (Vieill.) — 1 ♂ Haïti.

Genus *Trogon* Moehr. 1752.

1. *mexicanus* Sws. — 2 ♂, 1 ♀ jun. Mexico.
2. *ambiguus* Gould — 1 ♀ Mexico.
3. *elegans* Gould — 1 ♂ Guatemala; 1 ♀ juv. Mexico.
4. *puella* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.

5. *virginalis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 173] — 1 ♂,
1 ♀, 1 ♀ jun. Pallatanga (Ecuador).
6. *personatus* Gould — 2 ♂ Bogota; 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
7. *propinquus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 175] — 1 ♂
jun. Puellaro (Ecuador).
8. *curucui* L. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
9. *exoptatus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 179] — 2 ♂,
1 ♀ Porto Cabello; 1 ♀ Venezuela.

Genus *Pothinus* Cab. et Heine 1863.

1. *atricollis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Aganrus* Cab. et Heine 1863.

1. *braccatus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 184] — 1 ♂,
1 ♀ Mexico.
2. *caligatus* (Gould) — 1 ♂ Cartagena.
3. *lepidus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 187] — 2 ♂
Babahoyo (Ecuador).
4. *crissalis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 190] — 1 ♂ Bahia.
5. *aurantius* (Spix) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
6. *venustus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 194] — 1 ♂
Neu-Granada; 1 ♀ Côte-Ferme.
7. *viridis* (L.) — 4 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien; 1 ♀ Surinam.
8. *melanocephalus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
9. *citreolus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Mazatlan (Mexico).

Genus *Hapalophorus* Cab. et Heine 1863.

1. *variegatus* (Spix) — 1 ♂ Brasilien.
2. *surucua* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Rio Grande; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Eutroctes* Heine 1863.

1. *melanurus* (Sws.) — 1 ♂ Venezuela; 1 ♀ Guiana.
2. *mesurus* (Cab. et Heine*) [Mus. Hein. IV. 1. p. 202] — 1 ♂,
1 ♀ Babahoyo (Ecuador).

3. *macrurus* (Gould) — 1 ♂ adolesc., 1 ♀ Cartagena.
4. *Massenae* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Tanypeplus* Cab. et Heine 1863.

1. *paroninus* (Spix) — 1 ♂ Chamicuros (Peru).
2. *heliactin* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 1. p. 207] — 1 ♂
Nanegal (Ecuador); 1 ♀ Pallatanga
(Ecuador).
3. *auriceps* (Gould) — 2 ♂, 2 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ Venezuela.
4. *fulgidus* (Gould) — 1 ♂ Venezuela; 2 ♂ Columbien.

Genus *Pharomacrus* de la Llave 1831.

1. *antisiensis* (d'Orb.) — 2 ♂ Columbien; 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
2. *mocinno* de la Llave — 2 ♂, 1 ♂ juv. Central-America; 1 ♀
Volcan del Fuego (Guatemala).
3. *costaricensis* Cab. [Journ. Orn. 1869 p. 313] — 1 ♂ Chiriqui.

Fam. Galbulidae.

Genus *Cauax* Cab. 1847.

1. *tridactylus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.

Genus *Brachycex* Cab. et Heine 1863.

1. *lugubris* (Sws.) — 1 ♀ jun. Bogota.

Genus *Urocex* Cab. et Heine 1863.

1. *paradisea* (L.) — 1 ♂ Nord-Brasilien; 1 ♀ Cayenne.

Genus *Caucalias* Cab. et Heine 1863.

1. *leucogaster* (Vieill.) — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Galbula* Briss. 1760.

1. *viridis* Lath. — 1 ♂ Porto Cabello; 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♀ adolesc. Cayenne.
2. *rufoviridis* Cab. — 3 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♂, 1 ♂ juv. Peru.
3. *melanogenia* Scl. — 1 ♂ Central-America.
4. *ruficauda* Cuv. — 1 ♂ Venezuela; 1 ♂, 2 ♀ Caracas.
5. *tombacea* Spix — 1 ♂, 1 ♀ Oberer Amazonenstrom; 1 ♂ [*G. fuscicapilla* Scl.] Bogota; 1 ♀ Neu-Granada.
6. *albirostris* Lath. — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♂, 1 ♀ [*G. chalconocephala* Déville] Peru.

Genus *Lamproptila* Sws. 1837.

1. *grandis* (Gm.) — 1 ♂ Peru; 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Cayenne.

Fam. Picidae.

Subfam. Picumninae.

Genus *Microcolaptes* Gray 1840.

1. *abnormis* (Temm.) — 1 ♂ Jambusan, Sarawak (Bornéo); 1 ♀ Malacca.
2. *ochraceus* (Hodgs.) — 1 ♀ Darjiling (Ostindien).

Genus *Pipiscus* Cab. et Heine 1863.

1. *innominatus* (Burt.) — 1 ♂ jun. Nepal.

Genus *Picumnus* Temm. 1824.

1. *olivaceus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
2. *granadensis* Lafr. — 1 ♂ Nanegal (Ecuador).
3. *squamulatus* Lafr. — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂ adolesc., 1 ♀ juv. Caracas.
4. *lepidotus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 14] — 1 ♂ Süd-America.
5. *pumilus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 16] — 1 ♀ jun. Süd-America.
6. *minutus* (L.) — 1 ♂ Guiana.
7. *cirratus* Temm. — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Bahia.
8. *exilis* (Lcht.) — 4 ♂, 3 ♀, 1 ♀ jun. Bahia.
9. *Buffoni* Lafr. — 1 ♀ Cayenne.
10. *pygmaeus* (Lcht.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Subfam. Dendrocopinae.

Genus *Tridactylia* Steph. 1815.

1. *hirsuta* (Vieill.) — 1 ♂, 2 ♀ Nord-Schweden.
2. *americana* (Brehm) — 1 ♂, 1 ♀ Canada; 1 ♂ Labrador.
3. *crissoleuca* („Brandt“ Bp.) [*Apternus kamtschatchensis* (!) Bp.]
— 1 ♂ Amur.

Genus *Dendrocopus* Koch 1816 [*Picus* Brehm 1828 nec
L. 1735, nec Koch 1816].

1. *Feliciae* (Malh.) — 1 ♂ Syrien.
2. *maior* (L.) — 2 ♂, 3 ♀ Harz; 1 ♂ Amur-Gebiet.
3. *numidicus* (Malh.) — 2 ♂, 1 ♀ Tanger; 1 ♂, 1 ♂ jun. Algier.
4. *darjilensis* (Blyth) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Sikkim (Ostindien).
5. *himalayensis* Jard. et Selby — 1 ♂ Binsar Almorah (Ostindien);
1 ♀ Khotekhare (Ostindien).
6. *Poelzani* Bogdan. — 1 ♂, 1 ♀ Kaukasus.

Genus *Dendrodromas* Kaup 1829.

1. *insularis* (Gould) — 1 ♂ juv. Formosa.
2. *cirris* (Pall.) — 1 ♂ Altai; 1 ♂, 1 ♀ Amur.
3. *leuconotus* (Bechst.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Schweden; 1 ♂, 1 ♀
Galizien.

Genus *Dendrocoptes* Cab. et Heine 1863

1. *medius* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Harz.
2. *scindeanus* („Gould“ Horsf. et Moore) — 1 ♀ Scinde.

Genus *Liopipo* Cab. et Heine 1863.

1. *mahrattensis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *auriceps* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Nepal; 1 ♀ Simla (Ost-
indien).

Genus *Dendrotypes* Cab. et Heine 1863.

1. *Macei* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *analis* („Temm.“ Horsf.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.
3. *andamanensis* (Blyth) — 1 ♂ Andamanen.
4. *nesiotes* „Heine“ Cab. et Heine* Mus. Hein. IV. 2. p. 49
(8. Juni 1863) [*Picus kalcensis* Swinh.
Ibis (October) 1863 p. 390].

Genus *Xylurgus* Cab. et Heine 1863.

1. *hyperythrus* (Vig.) — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Xylocopus* Cab. et Heine 1863.

1. *cathphoricus* [*cathpharius* (!)] (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Sikkim (Ostindien).
2. *minor* (L.) — 1 ♂ adolesc., 2 ♀ Harz.
3. *kamtschatcensis* („Bp.“ Malh.) — 1 ♂ Altai.

Genus *Bacopipo* Cab. et Heine 1863.

1. *variegata* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Sumatra; 2 ♂ Java.
2. *maculata* (Scop.) [*Picus validirostris* Blyth] — 1 ♂, 1 ♂ adolesc.,
1 ♀ Philippinen.

Genus *Dryobates* Boie 1826.

1. *pubescens* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Illinois; 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *homorus* Cab. et Heine [Mus. Hein. IV. 2. p. 65 Anm.] —
1 ♀ Californien.
3. *villosus* (L.) — 1 ♂ Süd-Carolina; 2 ♂ Georgien; 2 ♀ Nord-America.
4. *hyloscopus* Cab. et Heine [Mus. Hein. IV. 2. p. 69 Anm.] —
1 ♂, 1 ♀ Sierra Nevada (Californien).
5. *Jardinei* (Malh.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Threnopipo* Cab. et Heine 1863.

1. *querulus* (Wils.) [*Picus borealis* (!) Vieill.] — 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♀ Georgien; 1 ♀ jun. Süd-Carolina.

Genus *Xenocraugus* Cab. et Heine 1863.

1. *albolavatus* (Cass.) — 1 ♂, 1 ♀ Forest-Hill (Californien).

Genus *Dictyopipo* Cab. et Heine 1863.

1. *scalaris* („Licht.“ Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
2. *Nuttalli* (Gamb.) — 1 ♂ Fahom (Californien); 1 ♀ Auburn (Californien).
3. *lignaria* (Mol.) — 1 ♂ Colico (Araucana).

Genus *Cladoscopus* Cab. et Heine 1863.

1. *varius* (L.) — 1 ♂ Illinois; 1 ♀ jun. (*plumas mutans*) Georgien;
1 ♂ jun., 2 ♀ Mexico; 1 ♂, 1 ♀ (var. *atricapilla**
[Journ. Orn. 1856. p. 102]) Cuba.
2. *ruber* (Gm.) — 1 ♀ Californien.
3. *thyroideus* (Cass.) — 1 ♂ Forest-Hill (Californien).

Subfam. Dryocopinae.

Genus *Ceophloeus* Cab. 1862.

1. *scapularis* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
2. *mesorhynchus* Cab. et Heine [Mus. Hein. IV. 2. p. 86 Anm.]
— 1 ♀ Columbien?.
3. *lineatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 2 ♂ Bahia; 2 ♂, 1 ♂ jun.
Brasilien.
4. *erythroptus* (Cuv.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Brasilien.

Genus *Scapanus* Cab. et Heine 1863.

1. *melanoleucus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂ Porto Cabello.
2. *guatimalensis* (Hartl.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂ Costa-Rica.
3. *Malherbei* (Gray) — 1 ♀ Neu-Granada.
4. *pollens* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♀
Bogota.

Genus *Phloeoceastes* Cab. 1862.

1. *robustus* („Freyr.“ Licht.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
2. *rubricollis* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ Guiana.
3. *trachelopyrus* (Malh.) — 2 ♀ Peru.

Genus *Cniparchus* Cab. et Heine 1863.

1. *haematogaster* (Tsch.) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Ipocrantor* Cab. et Heine 1863.

1. *magellanicus* (King) — 2 ♂, 2 ♀ Chile.

Genus *Campophilus* Gray 1848.

1. *principalis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
2. *imperialis* (Gould) — 1 ♀ West-Mexico.

Genus *Phloeotomus* Cab. et Heine 1863.

1. *pileatus* (L.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Georgien.

Genus *Dryocopus* Boie 1826.

1. *martius* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz.

Genus *Thriponax* Cab. et Heine 1863.

1. *javensis* (Horsf.) — 3 ♂, 2 ♀ Java.

Genus *Alophonerpes* Rehb. 1854.

1. *pulverulentus* (Temm.) [*Picus gutturalis* Val.] — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra.
2. *fulvus* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Macassar; 1 ♂, 1 ♀ Celebes.

Genus *Xylolepes* Cab. et Heine 1863.

1. *validus* („Reinw.“ Wagl.) — 1 ♂ Java; 1 ♂, 1 ♀ Borneo.

Genus *Lepocestes* Cab. et Heine 1863.

1. *pyrrhotis* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *rubiginosus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra; 1 ♂ jun., 1 ♀ Borneo.

Subfam. Chrysoptilinae.

Genus *Ipoctonus* Heine 1860.

1. *Hemprichi* (Hempr. et Ehrbg.) — 1 ♂ Sennaar.
2. *lepidus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 118] — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.
3. *cardinalis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♂ jun. Kaffernland.

Genus *Thripias* Cab. et Heine 1863.

1. *namaquus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Kaffernland.

Genus *Ipagrus* Cab. et Heine 1863.

1. *Bennetti* (Smith) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Port Natal.
2. *punctatus* („Cuv.“ Val.) — 1 ♂ Casamanze (West-Africa); 1 ♀ Senegal.
3. *Malherbei* (Cass.) — 1 ♂ Lindi (Ost-Africa).
4. *nubicus* (Gm.) — 1 ♂ Melpes (Cordofan); 1 ♂ juv., 1 ♀ Abessinien
2 ♂, 1 ♀ Sennaar.
5. *notatus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 2 ♀ Kaffernland; 1 ♀ Süd-Africa.
6. *Abingoni* (Smith) [*Dendromus chrysurus* Sws.] — 1 ♂ jun. Casamanze (West-Africa).

Genus *Ipopatis* Cab. et Heine 1863.

1. *gabonensis* (J. et E. Verreaux) — 1 ♂ Camma-Fluss (West-Africa).

Genus *Stictoeraugus* Heine 1860.

1. *pardinus* (Temm.) — 1 ♂ Camma-Fluss (West-Africa); 1 ♀ jun. Senegambien.

Genus *Cnipotheres* Cab. et Heine 1863.

1. *Caroli* (Malh.) — 1 ♂, 1 ♀ Camma-Fluss (West-Africa).

Genus *Campoothera* Gray 1841.

1. *permista* Rchw. [*Dendromus brachyrhynchus* Malh. (nec Sws.)] —
1 ♂, 1 ♀ Gabun; 1 ♀ Munda-Fluss (West-Africa).

Genus *Scolecotheres* Rchb. 1854.

1. *menstruus* (Scop.) [*Picus griseocephalus* (!) Bodd.] — 1 ♂, 1 ♂
jun., 2 ♀ Süd-Africa.
2. *goërtan* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Sénegal; 1 ♀ Casamanze (West-
Africa).
3. *spodocephalus* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.

Genus *Camponomus* Cab. et Heine 1863.

1. *pyrrhogaster* (Malh.) — 1 ♂ juv. Aschanti (West-Africa).

Genus *Phaeonerpes* Rchb. 1854.

1. *fumigatus* (Lafr. et d'Orb.) — 1 ♂ Bogota.
2. *oleagineus* (Leht.) — 1 ♂ Mexico.
3. *Reichenbachi* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 141] — 2 ♂
Caracas.

Genus *Erythroneipes* Rchb. 1854.

1. *callonotus* (Waterh.) — 1 ♂, 1 ♀ Peru.
2. *sanguineus* (Leht. sen.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Guiana.

Genus *Campias* Cab. et Heine 1863.

1. *tephrodops* (Wagl.) — 1 ♂ Surinam; 1 ♂, 1 ♀ Cayenne.
2. *agilis* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 147] — 1 ♂ Inneres
nordwestliches Süd-America?; 1 ♀ Rio Napo
(Ecuador).
3. *maculifrons* (Spix) — 1 ♂ adolesc., 1 ♀ Brasilien.

4. *affinis* (Sws.) — 2 ♂, 2 ♀ Bahia.
5. *taenionotus* (Rehb.) — 1 ♂ adolesc., 1 ♀ Brasilien.
6. *sedulus* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 153] — 1 ♀ Guiana.
7. *ruficeps* (Spix) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Brasilien.
8. *hilaris* Cab. et Heine* [Mus. Hein. IV. 2. p. 154] — 1 ♂, 1 ♀ adolesc. Peru.
9. *spilogaster* (Wagl.) — 1 ♂ juv., 1 ♀ Süd-Brasilien.

Genus *Craugasus* Cab. et Heine 1863.

1. *flavigula* (Bodd.) — 1 ♂ Surinam.
2. *erythropes* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♀ Brasilien.
3. *auratus* (Vieill.) — 3 ♂, 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ Rio-Grande.
4. *chrysochlorus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien.
5. *capistratus* („Natt.“ Bp.) — 1 ♂ Nord-Brasilien.

Genus *Chloronerpes* Sws. 1837.

1. *aeruginosus* („Licht.“ Malh.) — 2 ♀ Xalapa.
2. *yucatanensis* (Cabot) — 2 ♂, 1 ♀ Mexico; 1 ♂ Central-America.
3. *rubiginosus* Sws. — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador); 1 ♂ jun. Guiana; 1 ♂ jun., 1 ♀ Caracas.

Genus *Chrysoptilus* Sws. 1831.

1. *chrysomelas* (Malh.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Bahia.
2. *melanochlorus* (Gm.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Bahia.
3. *cristatus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Montevideo.

Subfam. Chrysocolaptinae.

Genus *Chrysocolaptes* Blyth 1843.

1. *sultaneus* (Hodgs.) — 2 ♂ Nepal.
2. *Delesserti* (Malh.) — 1 ♀ Ostindien.
3. *strictus* (Horsf.) — 2 ♂ Java.

4. *festivus* (Bodd.) — 1 ♀ Ostindien.

5. *haematribon* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Luzon; 1 ♂ adolesc. Philippinen.

Genus *Brachypternus* Strickl. 1841.

1. *bengalensis* (L.) [*Picus aurantius* L.] — 2 ♂, 1 ♀ Bengalen; 1 ♂,
1 ♂ jun. Ostindien.

2. *erythronotus* (Vieill.) [*Picus ceylonus* Forst.] — 1 ♂, 1 ♀ Ceylon.

Genus *Chrysonotus* Sws. 1837.

1. *javanensis* (Ljungh) — 2 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♀ Sumatra; 2 ♂ Sunda-
Inseln.

Genus *Mesospilus* Sund. 1866 [*Gautropicoides* (!) Bp. 1854.]

1. *Rafflesi* (Vig.) — 1 ♂ Java; 1 ♂, 1 ♀ Sumatra; 1 ♀ Sunda-
Inseln.

Subfam. Hemicercinae.

Genus *Hemicercus* Sws. 1837.

1. *cordatus* (Jerd.) — 1 ♂ Vorder-Indien.

2. *canente* (Less.) — 1 ♀ Hinter-Indien.

3. *sordidus* (Eyton) — 1 ♂ adolesc. Malacca; 1 ♂, 1 ♀ Borneo;
1 ♀ Java?.

4. *concretus* („Reinw.“ Temm.) — 1 ♂ jun. Java.

Subfam. Celeinae.

Genus *Meiglyptes* Sws. 1837.

1. *tristis* (Horsf.) — 1 ♂ Java.

2. *grammithorax* (Mall.) — 1 ♂ Malacca; 3 ♀ Sumatra; 1 ♀
Sunda-Inseln.

3. *luridus* (Nitzsch) [*Picus brunneus* Eyt.; *Picus tukki* Less.] —
1 ♂, 2 ♀ Malacca; 2 ♂, 1 ♀ Borneo.

Genus *Micropternus* Blyth 1845.

1. *gularis* (Jerd.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Ostindien.
2. *squamigularis* (Sund.) [*M. malaccensis* Cab. et Heine* in Mus. Heineano] — 2 ♂, 2 ♀ Malacca.
3. *badius* (Raffl.) — 1 ♀ Sumatra.
4. *badius* („Temm.“ Bp.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♀ Borneo.

Genus *Celeus* Boie 1831.

1. *flavescens* (Gm.) — 1 ♂, 3 ♀ Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ (var. *pallidior*) Montevideo.
2. *lugubris* (Natt.) — 1 ♀ jun. Brasilien.
3. *elegans* (Müll.) — 2 ♂ Savanne von Guiana; 1 ♀ (var. *crista cinnamomea*) Guiana.
4. *jumana* (Spix) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Rio Napo (Ecuador).
5. *flavus* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♀ Guiana.
6. *castaneus* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
7. *grammicus* („Natt.“ Malh.) — Napo (Ecuador).
8. *undatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.

Genus *Cerchneopipo* Sund. 1866 [*Cerchneopicus* (!)] Bp.
1854.

1. *tinnunculus* (Wagl.) — 2 ♀ Cayenne.

Subfam. Picinae.

Genus *Callolophus* Salvad. 1874.

1. *miniatus* (Forst.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
2. *malaccensis* (Lath.) — 4 ♂, 1 ♂ jun. Malacca.
3. *mentalis* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ jun., 1 ♀ Sumatra.
4. *puniceus* (Horsf.) — 2 ♂, 1 ♀ Malacca; 1 ♀ Java.

Genus *Chrysophlegma* Gould 1849.

1. *flavinucha* Gould — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Nepal.

2. *chlorolophum* (Vieill.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
3. *xanthoderum* (Malh.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ Ceylon.

Genus *Picus* Lin. 1735; Koch 1816. [*Gecinus* Boie 1831].

1. *viridis* L. — 1 ♂, 2 ♂ jun., 1 ♀ Harz.
2. *avokera* Temm. — 1 ♀ Japan.
3. *algirus* Vaill. [*P. Vaillanti* Malh.] — 1 ♂, 1 ♀ Algier; 1 ♂ jun.
Nord-Africa.
4. *Saundersi* Bogdan. — 1 ♂ Amur.
5. *occipitalis* Vig. — 1 ♂, 1 ♀ (var. *maior*) Ostindien; 1 ♂, 1 ♀
(var. *minor*) [*P. caniceps* Vig. ?] Nepal; 1 ♀
(var. *minor*) Himalaya.
6. *tancoa* (Gould) — 1 ♂ Formosa.
7. *Guerini* Malh. — 1 ♂, 1 ♀ Nord-China.
8. *canus* Gm. — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 1 ♀ Amur.
9. *vittatus* Vieill. [*P. dimidiatus* Temm.] — 2 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♀ Java.
10. *striolatus* Blyth — 1 ♂ Himalaya; 1 ♂ Nilgherries; 1 ♀ Mt.
Cebro (Ostindien).
11. *Weberi* Müll. — 1 ♂, 1 ♀ Insel Salanga (Siam); 1 ♀ (var. *maior*)
[*P. viridanus* Blyth?] Burma.
12. *squamatus* Vig. — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Ostindien.

Subfam. *Melanerpinæ*.

Genus *Tripsurus* Sws. 1837.

1. *flavifrons* (Vieill.) — 2 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♀ Brasilien.
2. *rubrifrons* (Spix) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
3. *hirundinaceus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♀ Bogota.

Genus *Melanerpes* Sws. 1837.

1. *erythrocephalus* (L.) — 2 ♂, 1 juv. Nord-America; 1 ♂ juv.
Georgien.
2. *flavigula* (Natt.) — 1 ♂ Bogota.

3. *melanopogon* („Leht.“ Temm.) [*Picus formicivorus* Sws.] — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa; 1 ♂ Mexico; 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♀ Californien.

Genus *Asyndesmus* Coues 1866.

1. *torquatus* (Wils.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Leuconerpes* Sws. 1837.

1. *candidus* (Otto) [*Picus dominicanus* Vieill.] — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Brasilien.

Subfam. Centurinae.

Genus *Centurus* Sws. 1837.

1. *carolinus* (L.) — 1 ♂ Süd-Carolina; 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ juv. Georgien.
2. *hypopolius* (Wagl.) — 1 ♀ Mexico.
3. *Hoffmanni* Cab.* [Journ. Orn. 1862 p. 322] — 1 ♂, 1 ♀ Costa-Rica.
4. *tricolor* (Wagl.) — 3 ♂ Venezuela; 2 ♀ Caracas; 1 ♂ 1 ♀ Neu-Granada.
5. *rubriventer* Sws. — 2 ♂ Baranquilla (Neu-Granada).
6. *elegans* Sws. — 2 ♂ Mexico.
7. *superciliaris* (Temm.) — 2 ♀ Cuba.
8. *aurifrons* („Leht.“ Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
9. *Gerini* (Temm.) [*Zebrapicus Pucherani* Malh.] — 1 ♂ Guatemala; 1 ♀ Mexico.
10. *radiolatus* (Wagl.) — 1 ♀ Jamaica.
11. *striatus* (Gm.) — 1 ♀ San Domingo.
12. *albifrons* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.

Subfam. Colaptinae.

Genus *Colaptes* Sws. 1827.

1. *auratus* (L.) — 3 ♂, 2 ♀ Nord-America; 1 ♀ Süd-Carolina.
2. *mexicanus* Sws. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Mexico; 1 ♀ Californien.
3. *submexicanus* (Sund.) [*C. mexicanoides* (!) Lafr.] — 1 ♀ Guatemala.
4. *rupicola* Lafr. et d'Orb. — 1 ♂ Bolivien.
5. *chilensis* (Garn.) — 1 ♂, 2 ♀ Chile.

Genus *Nesocoleus* Scl. 1873.

1. *Fernandinae* Vig. — 1 ♀ Cuba.

Genus *Geocolaptes* Burch. 1831.

1. *olivaceus* (Lath.) — 1 ♂, Cap; 1 ♂ Kaffernland; 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Hypoxanthus* Bp. 1854.

1. *Rivoli* (Boiss.) — 3 ♂ Bogota, 1 ♂ Peru.

Genus *Soroplex* Glog. 1842.

1. *campestris* (Vieill.) — 1 ♂ Süd-America; 1 ♀ Montevideo.
 2. *agricola* (Malh.) — 2 ♂, 1 ♀ Rio Grande; 1 ♂ juv. Montevideo.
-

Fam. Capitonidae.

Subfam. Pogonorhynchinae.

Genus *Pogonorhynchus* van der Hoeven 1835.

1. *dubius* (Gm.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂ jun. West-Africa.
2. *Rolleti* (Defil.) — 1 ♂ Nubien.
3. *torquatus* (Dum.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂, 1 ♂ jun. Port Natal.
4. *irroratus* Cab. — 1 St. Pangani (Ost-Africa).
5. *abyssinicus* (Lath.) — 1 ♀ jun. Abessinien.
6. *Vicilloti* (Leach) — 1 ♂ Melpes (Kordofan); 1 jun. Abessinien.
7. *undatus* (Rüpp.) — 1 ♀ jun. Ost-Africa.
8. *leucomelas* (Bodd.) — 2 ♂ Kaffernland.

Genus *Tricholaema* Verr. 1855.

1. *hirsuta* (Sws.) — 1 ♂ jun. Gabun.

Subfam. Megalaeminae.

Genus *Géniates* Heine [*Choloroa* (!) Bp. 1854].

1. *corvinus* (Reinw.) — 1 ♂, 2 ♀ Java.
2. *Hodgsoni* (Bp.) — 2 ♂ Ostindien.
3. *caniceps* (Frankl.) — 1 St. Kangra (Ostindien).
4. *lineatus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
5. *virens* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.
6. *chrysopogon* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra.
7. *chrysopsis* Goffin — 1 ♂ Borneo.
8. *javensis* (Horsf.) — 3 St. Java.

Genus *Megalaema* Gray 1842.

1. *mystacophanus* (Temm.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂ Borneo; 2 jun. Java.
2. *versicolor* (Raffl.) — 2 ♂ Borneo; 1 ♂ Malacca.
3. *Franklini* (Blyth) — 2 ♂, 1 ♀ Nepal.
4. *nuchalis* (Gould) — 1 ♂ Formosa.
5. *armillaris* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.
6. *asiatica* (Lath.) — 1 ♂ Bengalen; 1 ♂ Nepal.
7. *flavifrons* (Cuv.) — 1 jun. Ceylon.
8. *Henrici* (Boie) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂ Johore (Malacca).
9. *australis* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
10. *Duvauceli* (Less.) — 1 ♂, 2 jun., 1 juv. Sumatra.
11. *cyanotis* (Blyth) — 1 ♂ Nepal.
12. *malabarica* (Blyth) — 1 St. Malabar.

Genus *Xantholaema* Bp. 1854.

1. *rosea* (Dum.) — 2 ♂, 1 jun. Java.
2. *haemocephala* (Müll.) — 1 ♂ Manilla; 2 ♂ Philippinen; 1 ♂
Ceylon; 1 ♂, 1 jun. Ostindien.
3. *rubricapilla* (Brown) — 1 ♂, 1 jun. Ceylon.

Genus *Barbatula* Less. 1837.

1. *pusilla* (Dum.) — 1 ♂ Ost-Africa; 1 ♀ Kaffernland; 1 St.
Port Natal.
2. *chrysocoma* (Temm.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ West-Africa; 1 ♀
Gondar (Abessinien).
3. *leucolaema* Verr. — 1 ♂ West-Africa.
4. *subsulphurea* (Fras.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Pogonites* Heine [*Buccanodon* (!) Verr. 1855]

1. *Duchaillui* (Cass.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Cladurus* Rehw. 1877 [*Xylobucco* (!) Bp. 1850].

1. *scolopaceus* (Temm.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Gymnocranus* Heine 1860.

1. *Bonapartei* (Verr.) — 1 ♂ Gabun.

Genus *Trachyphonus* Ranz. 1823.

1. *cafer* (Vieill.) — 1 ♂ Cap.
2. *margaritatus* (Rüpp.) — 1 ♂, 3 ♀ Abessinien.
3. *squamiceps* Heugl. — 1 ♂ Abessinien.
4. *purpuratus* Verr. — 1 ♂ Gabun.

Genus *Psilopogon* Müll. 1834.

1. *pyrolophus* Müll. — 1 ♂ Sumatra.

Genus *Calorhamphus* Less. 1839.

1. *fuliginosus* (Temm.) — 1 ♂ Borneo.
2. *Lathamii* (Raffl.) — 2 ♀ Ostindien.

Subfam. Capitoninae.

Genus *Capito* Vieill. 1816.

1. *maculatus* (Müll.) [*Bucco niger* (!) Müll.] — 1 ♂, 1 ♀ Guiana;
1 ♂, 2 ♀ Cayenne.
2. *auratus* (Dum.) — 2 ♂, 1 ♀ Chamicuros (Peru); 1 ♀ Bogota.

Genus *Abelterus* Heine [*Eubucco* (!) Bp. 1850].

1. *Bourcieri* (Lafr.) — 1 ♂, 1 jun. Neu-Granada; 2 ♂, 3 ♀ Bogota.
2. *Richardsoni* (Gray) — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♀ Bogota; 1 ♀
Rio Napo (Ecuador).

Genus *Tetragonops* Jard. 1855.

1. *Frantzi* Schl. — 1 St. Navarra (Central-America?).

Fam. Rhamphastidae.

Genus *Rhamphastus* Lin. 1748.

1. *toco* Müll. — 1 ♂ Guiana.
2. *albogularis* Cab. — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Burhynchus* Cass. 1867.

1. *carinatus* (Sws.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 jun. Xalapa.
2. *brevicarinatus* (Gould) — 1 adult., 1 jun. Baranquilla (Neu-Granada).
3. *tocard* (Vieill.) — 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
4. *ambiguus* (Sws.) — 1 ♂ jun. Pallatanga (Ecuador); 1 ♀ Neu-Granada.
5. *abbreviatus* (Cab.) — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♀ jun. Venezuela.

Genus *Dinorhamphus* Heine [*Tucanus* (!) Cass. 1867].

1. *tucanus* (L.) — 1 ♂ Guiana.
2. *Cuvieri* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Amazonen-Strom.
3. *citreolaemus* (Gould) — 1 ♂ Neu-Granada.

Genus *Rhamphodryas* Cass. 1867.

1. *ariel* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *vitellinus* (Ill.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 jun. Cayenne.

Genus *Machlostomus* Heine [*Tucaius* (!) Bp. 1854].

1. *dicolorus* (L.) — 1 ♂, 2 ♀ Brasilien.

Genus *Pteroglossus* Ill. 1811.

1. *aracari* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀, 1 juv. Cayenne.
2. *Wiedi* Sturm — 1 ♂, 1 juv. Brasilien.
3. *pluricinctus* Gould — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Bogota.
4. *castanotis* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada.
5. *discolor* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Mexico.

Genus *Pyrosterna* Bp. 1854.

1. *bitorquata* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Para.
2. *Azarae* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Cordilleren von Peru.

Genus *Ulocomus* Heine [*Beauharnaisius* (!) Bp. 1849].

1. *Beauharnaisi* (Wagl.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Rhagoborus* Heine [*Baillonius* (!) Cass. 1867].

1. *Bailloni* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Selenidera* Gould 1837.

1. *maculirostris* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.
2. *Gouldi* (Natt.) — 1 ♂ Para.
3. *piperivora* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Cayenne; 1 ♂ Guiana.

Genus *Grammarhynchus* Gould 1854.

1. *Humboldti* (Wagl.) — 1 ♂ Nord-Brasilien.
2. *inscriptus* (Sws.) — 1 ♀ Guiana.
3. *viridis* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Cayenne.

Genus *Aulacorhynchus* Gould 1844.

1. *prasinus* („Lcht.“) Gould — 2 ♂, 1 ♀ Xalapa.
2. *albivitta* (Boiss.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Granada; 1 ♂, 1 ♀ jun. Bogota.

Genus *Aulacops* Cab. 1862.

1. *sulcatus* (Sws.) — 1 ♂ Venezuela; 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♂ jun.
Caracas.
2. *haematopygus* (Gould) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Andigena* Gould 1850.

1. *laminirostris* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Ecuador.

Genus *Rhamphomelas* [*Rhamphomelus* (!) Bp. 1854].

1. *nigrirostris* (Waterh.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
-

Ordo V. Psittaci.

Fam. Pionidae.

Genus *Poeocephalus* Sws. 1837.

1. *fuscicapillus* (Verr. et Des Murs) — 1 St. Usegua (Ost-Africa).
2. *Meyeri* (Rüpp.) — 1 ♂ Cordofan; 1 ♂ Abessinien.
3. *senegalus* (L.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♀ West-Africa.
4. *fuscicollis* (Kuhl) — 1 ♂ West-Africa.
5. *robustus* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Pionites* Heine [*Caica* (!) Less. 1831].

1. *melanocephalus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 juv. Brasilien.
2. *leucogaster* („Ill.“ Kuhl) — 1 ♂ Para; 1 juv. Nord-Brasilien.

Genus *Deroptyus* Wagl. 1832.

1. *accipitrinus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Surinam.

Genus *Androglossus* Vig. 1825 [*Chrysotis* Sws. 1837].

1. *Levaillanti* (Gray) — 1 ♂ Xalapa.
2. *ochropterus* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Mexico.

3. *ochrocephalus* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Cayenne.
4. *aestivus* (Lath.) — 3 ♂, 2 ♀ Brasilien.
5. *amazonicus* (L.) — 1 ♂ Surinam; 1 ♂ Cayenne.
6. *leucocephalus* (L.) — 1 ♂ Cuba.
7. *ventralis* (S. Müll.) — 1 ♂, 1 St. S. Domingo.
8. *albifrons* (Sparrm.) — 1 ♂, 1 ♀ Yucatan.
9. *autumnalis* (L.) — 1 ♂ Mexico.
10. *Pretrei* (Temm.) — 1 ♂ S. Leopoldo (Rio Grande do Sul).
11. *vittatus* (Bodd.) — 1 ♂ Portorico.
12. *farinosus* (Bodd.) — 1 St. Guiana.

Genus *Pionias* Finsch 1868.

1. *violaceus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *chalcopterus* (Fras.) — 1 ♂ Bogota.
3. *senilis* (Spix) — 1 ♂ Mexico.
4. *sordidus* (L.) — 1 ♂ Bogota.
5. *corallinus* (Bp.) — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
6. *lacerus* Heine* [Journ. Orn. 1884 p. . .] — 1 St. Tucuman
(Argentinien).
7. *flavirostris* (Spix) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ jun. S. Leopoldo (Rio
Grande do Sul).
8. *menstruus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Cayenne.
9. *Reichenowi* Heine* [Journ. Orn. 1884 p. . .] — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Urochroma* Bp. 1854.

1. *cingulata* (Scop.) — 1 ♂ Trinidad.
2. *surda* (Ill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *melanonota* („Lcht.“ Kuhl) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
4. *purpurata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.

Genus *Eucinetus* Rehw. 1881.

1. *Barrabandi* (Lev.) 1 ♂ Amazonen-Strom.
2. *amazoninus* (Des Murs) — 1 jun. Neu-Granada.
3. *haematotis* (Scl. et Salv.) — 1 St. Mexico.

Genus *Pionopsittacus* [*Pionopsitta* (!)] Bp. 1854.

1. *pileatus* (Scop.) — 2 ♂ Brasilien.

Genus *Triclaria* Wagl. 1832.

1. *cyanogastra* (Wied) — 1 ♂, 1 ♀ S. Leopoldo (Rio Grande do Sul).
-

Fam. Conuridae.

Genus *Psittacula* Ill. 1811.

1. *conspicillata* Lafr. — 1 ♂ Neu-Granada; 1 ♂ jun. Venezuela
1 juv. Porto Cabello.
2. *caelestis* (Less.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Peru; 1 ♀ jun. Guayaquil.
3. *passerina* (L.) — 2 ♂, 1 jun. Brasilien.

Genus *Bolborhynchus* Bp. 1857.

1. *aymara* (d'Orb.) — 1 jun. Schneeregion von Bolivien.
2. *monachus* (Bodd.) — 1 ♂ Montevideo (Uruguay).
3. *jaguilma* (Gm.) — 1 St. Peru.

Genus *Brotogeris* Vig. 1825.

1. *chrysoptera* (L.) — 1 ♂ Trinidad; 1 ♂ Guiana.
2. *jugularis* (S. Müll.) — 1 ♂ Porto Cabello.
3. *tori* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.

4. *pyrrhoptera* (Lath.) — 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).
5. *tiriacula* (Bodd.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Microsittace* Bp. 1854.

1. *leucotis* („Licht.“ Kuhl) — 2 ♂, 1 jun. Bahia.
2. *picta* (S. Müll.) — 1 jun. Surinam.
3. *calliptera* (Mass. et Souancé) — 1 ♂ Bogota.
4. *cruentata* (Wied) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
5. *vittata* (Shaw) — 2 ♂ Rio Grande do Sul.
6. *smaragdina* (Gm.) — 1 ♂ Collico (Chile); 1 ♀ Valdivia; 1 ♀ Chile.

Genus *Henicognathus* Gray 1840.

1. *leptorhynchus* (King) — 2 ♂ Chile.

Genus *Comurus* Kuhl 1820.

1. *Petzi* (Wagl.) — 1 ♂ Costa Rica.
2. *aureus* (Gm.) — 1 ♂, 1 jun. Brasilien.
3. *ocularis* ScL. et Salv. — 1 St. Panama.
4. *chrysophrys* Sws. — 2 St. Guiana.
5. *aztec* Souancé — 1 ♂ Mexico.
6. *carolinensis* (L.) — 1 ♂ Nord-America.
7. *jendaya* (Gm.) — 1 ♂, 1 jun. Brasilien.
8. *solstitialis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
9. *icterotis* Mass. et Souancé [*C. Heinei* Cab.* Journ. Orn. 1864 p. 414] — 1 ♂ Neu-Granada.
10. *Byroni* (Childr.) — 2 ♂, 1 ♀ Chile.
11. *holochlorus* ScL. — 1 ♂ Mexico.
12. *leucophthalmus* (S. Müll.) — 1 ♂ (var. *minor*) Rio Grande do Sul;
1 ♂ Guiana.
13. *erythrogenys* (Less.) — 1 ♂ Babahoyo (Ecuador).
14. *Wagleri* Gray — 1 ♂ Caracas; 4 ♀ Venezuela.
15. *mitratus* Tschudi — 1 St. Tucuman (Argentinien).
16. *pachyrhynchus* (Sws.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Sittace* Wagl. 1832.

1. *Hahni* (Souancé) — 1 ♂ Guiana.
 2. *nobilis* (L.) — 1 St. Brasilien.
 3. *macawuanna* (Gm.) — 1 ♂ Guiana.
 4. *maracana* (Vieill.) — 1 ♂, 1 jun. Brasilien.
 5. *severa* (L.) — 1 ♂ Surinam.
 6. *macao* (L.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Guiana.
 7. *chloroptera* (Gray) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
 8. *ararauna* (L.) — 1 ♂ Guiana.
-

Fam. Psittacidae.

Genus *Psittacus* L. 1735.

1. *erythacus* L. — 2 ♂, 1 ♀ West-Africa.

Genus *Coracopsis* Wagl. 1832.

1. *nigra* (L.) — 1 ♂ Ambodavi (Madagascar).
-

Fam. Palaeornithidae.

Genus *Agapornis* Selby 1836.

1. *pullaria* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ West-Africa.
2. *Tarantae* (Stanley) — 1 ♂, 1 jun. Abessinien.

Genus *Dichrognathus* Rehw. 1881.

1. *incertus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Malacca.

Genus *Prioniturus* Wagl. 1832.

1. *flavicans* Cass. — 1 ♂, 1 ♀ Celebes.
2. *discurus* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Philippinen.
3. *platurus* (Vieill.) — 1 ♂ Celebes.

Genus *Eclectus* Wagl. 1832.

1. *pectoralis* (S. Müll.) — 1 ♂ Gilolo; 1 ♀ Neu-Guinea; 1 ♀ Mysol.
2. *roratus* (S. Müll.) — 1 ♂ Molukken; 1 ♀ Halmahera; 1 ♀ Gilolo.
3. *cardinalis* (Bodd.) — 1 ♂ Ceram; 1 ♂, 1 ♀ Passo (Amboina).
4. *Westermanni* (Bp.) — 1 ♂ Molukken?

Genus *Rhodocephalus* Rehw. 1881.

1. *Geoffroyi* (Behst.) — 1 ♂ Buru; 1 ♀ Mysol (Molukken).
2. *Pucherani* (Bp.) — 1 jun. Doreh (Neu-Guinea).
3. *cyanicollis* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Halmahera; 1 ♂ jun. Gilolo.

Genus *Tanygnathus* Wagl. 1832.

1. *megalorhynchus* (Bodd.) — 1 ♂ Halmahera; 1 ♀ (var. *minor*) Mysol.

2. *affinis* Wall. — 1 St. Buru (Molukken).
3. *Mülleri* („Temm.“) Bp. — 1 ♂, 1 St. Celebes.
4. *luzoniensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Luzon (Philippinen).

Genus *Palaeornis* Vig. 1825.

1. *torquatus* (Bodd.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Ostindien.
 2. *docilis* (Vieill.) — 1 ♂ Gambia; 1 ♂, 1 jun. [*P. parvirostris* Bp.]
Abessinien; 1 ♂ [*P. cubicularis* Wagl.] blauer
Fluss (Sennaar); 1 ♀ jun. Cordofan.
 3. *Hodgsoni* Finsch [*P. schisticeps* (!) Hodg.] — 1 ♂ Himalaya.
 4. *cianocephalus* (L.) — 2 ♂, 1 juv. Ostindien; 1 ♀ Bengalen.
 5. *Calthropae* Layard — 1 ♂, 1 jun. Ceylon.
 6. *peristerodes* Finsch [*P. columboides* (!) Vig.] — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.
 7. *fasciatus* (S. Müll.) — 1 ♂ [*P. Lathamii* Finsch] Himalaya;
1 ♂ jun. Nepal; 1 ♀ [*P. melano-*
rhynchus Wagl.] Nepal; 1 ♀ juv. Hi-
malaya.
 8. *javanicus* (Osbeck) [*Psittacus Alexandri* L.] — 2 ♂, 1 ♂ jun.
Java.
 9. *erythrogenys* Blyth — 1 ♂ Andamanen.
 10. *longicauda* (Bodd.) — 1 ♂ Malacca; 1 ♂, 1 ♀ Jafferiah, Johore
(Malacca).
-

Fam. Trichoglossidae.

Genus *Coryllis* Finsch 1868.

1. *stigmata* (Müll. et Schl.) — 1 ♂ Celebes.
2. *Sclateri* (Wall.) — 1 ♂ Sula-Inseln.
3. *galgulus* (L.) — 2 ♂, 1 jun. Sumatra; 1 ♀ Jafferiah Johore (Malacca).
4. *philippensis* (S. Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Luzon.
5. *indica* (Gm.) — 1 ♂ Ceylon.
6. *exilis* (Schleg.) — 2 ♂ Celebes.
7. *vernalis* (Sparrm.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Coriophilus* [*Coriphilus* (!)] Wagl. 1832.

1. *smaragdinus* (Hombr. et Jacq.) — 1 ♂ Marquesas-Inseln.
2. *taitianus* (Gm.) — 1 ♂ Tahiti (Gesellschafts-Inseln).
3. *Kuhli* (Vig.) — 1 ♂ Fanning-Insel.
4. *australis* (Gm.) — 2 ♂ Tonga-Tabu (Freundschafts-Inseln).

Genus *Domicella* Wagl. 1832.

1. *lory* (L.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
2. *erythrothorax* Salvad. — 1 ♂ jun. Mysol.
3. *atricapilla* Wagl. — 1 ♂ Ceram; 1 ♂ Molukken.
4. *garrula* (L.) — 2 St. Halmahera.

Genus *Eos* Wagl. 1832.

1. *rubra* (Gm.) — 1 ♂ Ceram; 1 ♀ Goram (Molukken).
2. *histris* (S. Müll.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Sangir-Inseln.
3. *riciniata* (Behst.) — 1 ♂ Morotai (Molukken).

Genus *Chalcopsittacus* [*Chalcopsitta* (!)] Bp. 1850.

1. *scintillatus* (Temm.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
2. *ater* (Scop.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♀ Mysol.
3. *fuscatus* (Blyth) — 1 ♂ jun. Neu-Guinea.

Genus *Trichoglossus* Vig. et Horsf. 1826.

1. *rubiginosus* (Bp.) — 1 ♂ Ponape (Carolinen).
2. *haematodes* (L.) — 1 ♂, 1 jun. Timor.
3. *Novae Hollandiae* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Australien; 4 St. Port Albert, Gippsland (Victoria).
4. *rubritorquis* Vig. et Horsf. — 1 ♂ Nord-Australien.
5. *ornatus* (L.) — 2 ♂ Celebes.
6. *cyanogrammus* Wagl. — 1 ♂ Buru; 1 St. Mysol.
7. *nigrigularis* Gray — 1 St. Neu-Guinea.

Genus *Ptilosclera* Bp. 1857.

1. *chlorolepidota* (Kuhl) — 1 ♂ Australien; 1 St. Port Albert, Gippsland (Victoria).
2. *euteles* (Temm.) — 1 ♂ Timor.
3. *iris* (Temm.) — 1 ♂ West-Timor.
4. *versicolor* (Vig.) — 1 ♂ Raffles-Bai.

Genus *Neopsittacus* Salvad. 1875.

1. *Muschenbroeki* (Rosenb.) — 1 ♂, 1 ♀ Arfak-Gebirge (Neu-Guinea).

Genus *Charmosyna* Wagl. 1832.

1. *placens* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Guinea.
2. *aureicincta* (Layard) — 1 ♀ Inneres von Viti Levu.

Genus *Glossopsittacus* [*Glossopsitta* (!)] Bp. 1854.

1. *pusillus* (Shaw) — 1 ♂, 2 ♀ Australien.

2. *concinuus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Australien; 2 ♂, 2 ♀ Port Albert, Gippsland (Victoria).
3. *porphyrocephalus* (Dietrichsen) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ West-Australien.

Fam. Micropsittacidae.

Genus *Nasiterna* Wagl. 1832.

1. *pygmaea* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ jun. Neu-Guinea.
2. *pusio* Scl. — 1 ♀ Neu-Britannien.

Genus *Cyclopsittacus* [*Cyclopsitta* (!)] Jacq. et Puch 1853.

1. *diophthalmus* (Hombr. et Jacq.) — 1 ♂ Mysol.
2. *suavissimus* Scl. — 1 ♂ Südwest-Neu-Guinea.
3. *Desmaresti* (Garn.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Guinea.
4. *loxia* (Cuv.) — 1 ♂, 1 ♀ Luzon.
-

Fam. Platycercidae.

Genus *Polyteles* [*Polytelis* (!)] Wagl. 1832.

1. *melanurus* (Lear) — 2 ♂, 1 ♀ West-Australien.
2. *Barrabandi* (Sws.) — 2 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Pyrrhulopsis* Rehb. 1850.

1. *splendens* (Peale) — 1 ♂ Fidji-Inseln.
2. *personatus* (Gray) — 1 ♂ Fidji-Inseln.

Genus *Aprosmictus* Gould 1842.

1. *hypophonijs* (Müll. et Schleg.) — 1 ♂ Halmahera.
2. *dorsalis* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Neu-Guinea.
3. *scapulatus* („Bchst.“ Kuhl) — 1 ♂, 1 ♂ (var. *macula occipitali flava, absque macula scapulari cyanea*), 2 ♀ Süd-Australien; 2 ♂ Port Albert, Gippsland (Victoria).

Genus *Ptistes* Gould 1865.

1. *erythropterus* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♂ jun., 1 ♀, 1 jun. Neu-Süd-Wales.
2. *vulneratus* (Wagl.) — 1 ♀ West-Timor.

Genus *Porphyrocephalus* Heine | *Purpureicephalus* (!) Bp. 1854].

1. *spurius* (Kuhl) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ West-Australien.

Genus *Platycercus* Vig. 1825.

1. *zonarius* (Shaw) — 2 ♂, 1 ♀ West-Australien.

2. *semitorquatus* Quoy et Gaim. — 1 ♂ West-Australien.
3. *Barnardi* (Vig. et Horsf.) — 3 ♂, 1 ♀ Süd-Australien.
4. *elegans* (Gm.) — 3 ♂, 1 ♀ Australien; 1 ♂, 1 ♀ Mount Macedon (Australien).
5. *adelaidensis* Gould — 2 ♂ Australien; 1 jun. Port Philipp (Victoria).
6. *flaviventer* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Van-Diemensland.
7. *flaveolus* Gould — 1 ♂ Australien; 1 ♂ Nieder-Murray (Süd-Australien).
8. *eximius* (Shaw) — 2 St. Australien; 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Port Albert, Gippsland (Victoria).
9. *icterotis* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 2 jun. West-Australien.
10. *pallidiceps* (Cuv.) — 1 ♂ Australien; 1 ad. Port Albert, Gippsland (Victoria).
11. *Browni* (Temm.) — 1 ♀ Nord-Australien.

Genus *Psephotus* Gould 1845.

1. *haematogaster* (Gould) — 1 ♂ Schwanen-Fluss (West-Australien).
2. *multicolor* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Australien.
3. *haematonotus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Van-Diemensland; 1 ♀ Süd-Australien.

Genus *Euphema* Wagl. 1832.

1. *pulchella* (Shaw) — 1 ♂ Darling (Neu-Süd-Wales); 1 ♂ Australien.
2. *elegans* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. West-Australien; 1 ♂ Nieder-Murray (Süd-Australien).
3. *splendida* (Shaw) — 1 ♂, 1 jun. Süd-Australien.

Genus *Cyanorhamphus* Bp. 1854.

1. *auriceps* (Kuhl) — 2 ♂ Neu-Seeland.
2. *Rowleyi* (Bull.) — 1 St. Neu-Seeland.
3. *Novae Zeelandiae* (Sparrm.) — 1 St. Neu-Seeland.
4. *Malherbei* Souancé — 1 ♀ Jaipo (Neu-Seeland).

Genus *Nanodes* Vig. et Horsf. 1826.

1. *discolor* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Van-Diemensland.

Genus *Calopsittacus* [*Calopsitta* (!)] Less. 1832.

1. *Novae Hollandiae* (Gm.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀, 1 jun. West-Australien.

Genus *Melopsittacus* Gould 1840.

1. *undulatus* (Shaw) — 1 ♂ West-Australien; 2 ♂, 1 ♀ Australien.

Fam. Plissolophidae.

Genus *Microglossa* [*Microglossum* (!)] Geoffr. 1809.

1. *aterrima* (Gm.) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Calyptorhynchus* Vig. et Horsf. 1826.

1. *stellatus* Wagl. — 2 ♂, 1 ♂ jun. West-Australien; 1 ♂ Nieder-Murray (Süd-Australien); 1 jun. Australien.
2. *Banksi* (Lath.) — 1 ♂ Australien.
3. *Solandri* (Temm.) — 2 ♂, 2 jun. Australien.
4. *xanthonotus* Gould — 2 ♂, 3 ♀ Australien.
5. *funereus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀ Van-Diemensland.
6. *Baudini* Vig. — 1 St. West-Australien.

Genus *Callocephala* [*Callocephalum* (!)] Less. 1837.

1. *galeata* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Kings-Insel (Süd-Australien); 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Gippsland (Victoria).

Genus *Plissolophus* Glog. 1842.

1. *triton* (Temm.) — 1 ♂ Mysol.
2. *galeritus* (Lath.) — 1 ♂ Australien; 1 ♂ Van-Diemensland.
3. *Buffoni* (Finsch) — 1 ♀ Timor.
4. *cristatus* (L.) — 1 ♂ Celebes.

Genus *Lophochroa* Bp. 1857.

1. *Leadbeateri* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Camptolophus* Sund. 1872.

1. *moluccensis* (Gm.) — 1 ♂ Ceram.
2. *albus* (S. Müll.) — 1 ♂ Oestliche Molukken.
3. *roseicapillus* (Vieill.) — 1 ♂ Tintindere, Swan-Hill, Murray (Süd-Australien); 1 ♂, 2 ♀ Süd-Australien.
4. *Philippinarum* (Gm.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Licmetis* [*Licmetis* (!)] Wagl. 1832.

1. *pastinator* Gould — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
2. *nasica* (Temm.) — 1 ♂ Süd-Australien.

Genus *Dasyptilus* Wagl. 1832 [*Psittrichas* (!) Less. 1831].

1. *Pesqueti* (Less.) — 1 St. Arfak-Gebirge (Neu-Guinea).

Genus *Nestor* Less. 1831.

1. *meridionalis* (Gm.) — 2 ♂, 3 ♀ Neu-Seeland.
2. *productus* (Gould) — 1 ♂ Philipps-Insel (Neu-Seeland).
3. *notabilis* Gould — 1 St. Neu-Seeland.

Fam. Stringopidae.

Genus *Pezoporus* Ill. 1811.

1. *formosus* (Lath.) — 1 ♂, 1 jun. Australien.

Genus *Stringops* [*Strigops* (!)] Gray 1845.

1. *habroptilus* Gray — 1 St. Südliche Alpen von Neu-Seeland.

Ordo VI. Raptatores.

Fam. Strigidae.

Subfam. Surninae.

Genus *Glaucidium* Boie 1826.

1. *nanum* (King) — 1 ♂, 1 ♀ Cordilleren von Chile.
2. *infuscatum* (Temm.) — 1 ♂ San Jouan del Rey (Süd-Brasilien);
1 ♀ Guiana; 1 ♀ Peru.
3. *ferrugineum* (Wied) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♂ juv. Brasilien; 1 ♂ jun.
Porto Cabello; 1 ♂ juv. Chile.
4. *Jardinei* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
5. *gnoma* Wagl. — 1 ♂ Mexico.
6. *Ridgwayi* Sharpe — 1 ♂ Mexico.
7. *cobanense* Sharpe — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Microglaux* Kaup 1848.

1. *perlata* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♀ Sennaar.

Genus *Taenioptynx* Kaup 1848.

1. *Brodiei* (Burt.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ Nepal.

Genus *Nyctala* Brehm 1828.

1. *Tengmalmi* (Gm.) — 1 ♂ Harz; 1 ♀ Galizien.

Genus *Carine* Kaup 1829.

1. *noctua* (Scop.) — 3 ♂, 4 ♀ Harz.
2. *glaux* (Sav.) — 1 ♂ Nord-Africa; 1 ♀ Ober-Egypten; 1 ♂ Algier; 1 ♀ Tanger; 1 ♀ West-Asien; 1 ♀ Smyrna.
3. *brama* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Ostindien; 1 ♀ Himalaya.

Genus *Speotyto* Gloger 1842.

1. *cunicularia* (Mol.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ Peru; 1 ♀ Chile.

Genus *Taenioglaux* Kaup 1848.

1. *castanoptera* (Horsf.) — 1 ♂ Sumatra.
2. *radiata* (Tick.) — 1 ♂ Himalaya.
3. *cuculina* [*cuculoides* (!)] (Gould) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Nepal.

Genus *Microptynx* Kaup 1851.

1. *passerina* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Nord-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Norrköping (Schweden).

Genus *Nyctea* Steph. 1826.

1. *scandiaca* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Europa; 2 ♂, 2 ♀ Lappland; 1 ♂, 1 ♀ Island; 1 ♂ Sibirien; 1 ♂ Labrador; 1 ♀ Nord-America.

Genus *Nycthierax* Sund. 1872 [*Surnia* (!) Dumér. 1806].

1. *ulula* (L.) — 1 ♂ Nord-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Lappland; 1 ♂ Kamtschatka.
2. *funereus* (L.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Spiloglaux* Kaup 1848.

1. *ocellata* (Hombr. et Jacq.) — 2 ♂ West-Australien.
2. *boobook* (Lath.) — 1 ♂ Van-Diemensland.
3. *maculata* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♀ Van-Diemensland.

Genus *Ctenoglaux* Kaup 1852 [*Ninox* (!) Hodgs. 1837].

1. *scutulata* (Raffl.) — 1 ♂ Java; 1 ♂ Pondichery; 1 St. (*Athene malaccensis* Eyt.) Malacca.
2. *philippensis* Bp. — 1 St. Philippinen.

Genus *Hiracoglaux* [*Hieracoglaux* (!)] Kaup 1848.

1. *connivens* (Lath.) — 1 ♂ Van-Diemensland; 1 ♀ West-Australien.
2. *strenua* (Gould) — 1 ♂ West-Australien.

Subfam. Buboninae.

Genus *Scops* Sav. 1809.

1. *giu* (Scop.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♀ juv. Frankreich.
2. *capensis* Smith — 1 ♂ Cap.
3. *sunia* Hodgs. — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Ptilopsis* Kaup 1848.

1. *leucotis* (Temm.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♀ Mozambique.

Genus *Megascops* Kaup 1846.

1. *asio* (L.) — 2 ♀, 1 pullus Nord-America.
2. *brasilianus* (Gm.) — 2 ♂, 3 ♀ Brasilien; 1 ♂ Bogota; 1 ♀ Venezuela.
3. *trichopsis* (Wagl.) — 1 ♂ juv. Mexico.

Genus *Scototheres* Heine [*Lempijius* (!) Bp. 1854].

1. *lempiji* (Horsf.) — 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 pullus Malacca; 1 pullus Java.
2. *stictonotus* (Sharpe) — 1 ♂ Nepal.
3. *malabaricus* (Jerd.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ juv. Nepal.
4. *semitorques* (Schleg.) — 1 St. Japan.
5. *sagittatus* (Cass.) — 1 ♀ Sunda-Inseln.
6. *rufescens* (Horsf.) — 1 ♂, 1 ♀ Borneo.

Genus *Psilorhina* Kaup 1849.

1. *morotensis* (Sharpe) — 1 St. Morty-Insel.
2. *magica* (Müll.) — 1 St. Amboina.

Genus *Lophostrix* Less. 1837.

1. *Stricklandi* ScL. et Salv. — 1 St. Costa Rica.

Genus *Asio* Briss. 1760.

1. *otus* (L.) — 3 ♂, 3 ♀ Harz; 1 St. var. *alba* Thüringen; 1 ♀ Egypten.
2. *americanus* (Steph.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Rhinoptynx* Kaup 1852.

1. *mexicanus* (Gm.) — 1 ♂ Para; 1 ♂ juv. Brasilien; 1 ♀ Surinam.

Genus *Brachyotus* Gould 1837.

1. *accipitrinus* (Pall.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀ Harz; 1 ♀ Ostindien.
2. *Cassini* Brew. — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Rio-Grande; 1 ♀ Chile.

Genus *Phasmatoptynx* [*Phasmoptynx* (!)] Kaup 1848.

1. *capensis* (Smith) — 1 ♀ Marocco.

Genus *Mesomorpha* Hodgs. 1841 [*Urrua* (!) Hodgs. 1837].

1. *bengalensis* (Frankl.) — 1 ♂ juv., 1 ♀ Nepal.

Genus *Bubo* Cuv. 1817.

1. *ascalaphus* (Sav.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Africa.
2. *ignavus* Forst. — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Tirol.
3. *turcomanus* (Eversm.) — 2 ♂, 1 ♀ Sarepta (Wolga).
4. *virginianus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ jun. Georgien.
5. *pacificus* Cass. — 1 ♂ Mexico.
6. *arcticus* Sws. — 1 ♂ jun. Labrador.
7. *magellanicus* (Gm.) — 1 ♂ Chile; 1 ♀ Süd-America.

Genus *Aëtoglaux* Hodgs. 1844.

1. *orientalis* (Horsf.) — 1 ♂ Sumatra.

Genus *Nyctaëtus* Glog. 1842.

1. *lacteus* (Temm.) [*Bubo Verreauxi* Bp.] — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar; 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Nisella* [*Nisuela* (!)] Bp. 1854.

1. *maculosa* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♂, 1 ♀ Cap.

Genus *Cultrunguis* Hodgs. 1836 [*Ketupa* (!) Less. 1831].

1. *ceylonensis* (Gm.) — 1 ♀ Ostindien.
2. *javanensis* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.

Subfam. Striginae.

Genus *Strix* L. 1735.

1. *flammea* L. — 2 ♂, 3 ♀, 2 pulli Harz.
2. *splendens* Brehm — 1 ♂ Sennaar.
3. *indica* Blyth — 1 St. Nepal.
4. *delicatula* Gould — 1 ♂ West-Australien.
5. *pratincola* Bp. — 1 ♂ Mexico.
6. *perlata* Licht. — 1 ♂, 1 ♀ Süd-America; 1 ♂, 1 ♀ Brasilien;
1 ♂ Chile.
7. *furcata* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Cuba.
8. *thomensis* Hartl. — 1 ♂ St. Thomé (West-Africa).

Genus *Glaux* Blyth 1850.

1. *capensis* (Smith) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Dactylostrix* Kaup 1852.

1. *Novae Hollandiae* (Steph.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂, 2 ♀
Australien.

Genus *Megastrix* Kaup 1848.

1. *tenebricosa* (Gould) — 1 ♂ Australien.

Subfam. Ululinae.

Genus *Ciccaba* Wagl. 1832.

1. *huhula* (Daud.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Nyctimene* Heine [*Macabra* (!) Bp. 1854].

1. *albicularis* (Cass.) — 2 St. Bogota.
2. *virgata* (Cass.) — 1 ♂ Xalapa; 1 pullus Central-America.
3. *zonocerca* (Gray) — 1 ♂ Caracas.
4. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂ Surinam.
5. *suinda* (Vieill.) — 1 ♂ Süd-America.

Genus *Nyctalatinus* Kaup 1854 [*Gisella* (!) Bp. 1854].

1. *Harrisi* (Cass.) — 1 St. Bogota.

Genus *Ulula* Cuv. 1817 [*Syrnium* (!) Sav. 1809].

1. *aluco* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 2 ♂ var. *pallescens* Harz.
2. *cinerea* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
3. *lapponica* (Retz.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Europa.
4. *uralensis* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Europa.
5. *nebulosa* (Forst.) — 2 ♂ Georgien; 1 ♀ Süd-Carolina.
6. *Woodfordi* (Smith) — 1 ♀ jun. Zanzibar.
7. *hylophila* (Temm.) — 1 St. Bogota.

Genus *Mesides* [*Meseidus* (!)] Hodgs. 1841.

1. *indranee* (Sykes) — 1 ♂ Ostindien.
2. *newarensis* Hodgs. — 1 St. Darjeeling; 1 ♀, 1 ♂ juv. Nepal.
3. *ocellatus* (Less.) [*Strix sinensis* Gray et Hardw. nec Lath.] —
1 ♂, 1 ♀ Ostindien.

Genus *Tyto* Heine [*Myrtha* (!) Bp. 1854].

1. *sinensis* (Lath.) [*Strix seloputo* Horsf.] — 1 ♀ Cochinchina.

Genus *Pulsatrix* Kaup 1848.

1. *perspicillata* (Lath.) [*Strix torquata* Daud.] — 1 ♂ Guiana; 1 ♀

Surinam; 1 St. var. Brasilien; 1 ♀ juv.
Süd-America.

2. *major* Bp. — 1 ♀ Rio-Grande.

Fam. Falconidae.

Subfam. Accipitrinae.

Genus *Accipiter* Briss. 1760.

1. *nisus* (L.) — 3 ♂, 2 ♂ jun., 4 ♀ Harz; 1 ♂ jun. Helgoland;
1 ♀, 1 ♀ hornot. Egypten.
2. *rufiventris* Smith — 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Süd-Africa.
3. *tachiro* (Daud.) — 1 jun. Süd-Africa; 1 ♀ Cap.
4. *madagascariensis* Verr. — 1 ♂ Ambergelbirge (Madagascar);
1 ♀ jun. Kazarka (Madagascar).
5. *fuscus* (Gm.) — 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Nord-America; 1 ♀ Geor-
gien; 1 ♀ jun. Mexico.
6. *erythrocnemis* Gray — 1 ♂ Bogota.

Genus *Hiracospizias* [*Hieraspiza* (!)] Kaup 1844.

1. *tinus* (Lath.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♀ San Domingo.
2. *virgatus* (Temm.) — 1 adult. Java; 1 jun. Sunda-Inseln.

Genus *Urospizias* [*Urospiza* (!)] Kaup 1845.

1. *cirrhocephalus* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ juv. Süd-Austra-
lien; 1 ♀, 1 ♂ juv. West-Australien.

2. *approximans* (Vig. et Horsf.) — 1 ♂, 2 ♂ juv., 1 ♀ West-Australien; 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀, 2 ♀ juv. Süd-Australien; 1 ♂ juv. Van-Diemensland.

3. *hiogaster* (Müll. et Schleg.) — 1 ♀ Amboina.

4. *haplochrous* (Scl.) — 1 ♀ jun. Neu-Caledonien.

Genus *Chirospizias* Sundev. 1872 [*Erythrospiza* (!) Kaup 1867 nec Bp. 1830].

1. *trinotatus* (Bp.) — 1 ♂ Celebes; 1 ♀ Menado.

2. *griseogularis* (Gray) — 1 ♀ Batschian.

3. *hemicogrammus* (Gray) — 1 St. Gilolo.

4. *rufitorques* (Peale) — 1 ♀ Yarawas (Fidschi-Inseln).

Genus *Tachyspizias* [*Tachyspiza* (!)] Kaup 1844.

1. *soloënsis* (Lath.) — 1 ♂ Morty-Insel; 1 ♂ jun. Borneo.

2. *cuculinus* [*cuculoides* (!)] (Temm.) — 1 jun. Sumatra.

Genus *Lophospizias* [*Lophospiza* (!)] Kaup 1844.

1. *trivirgatus* (Temm.) — 1 jun. Malacca.

2. *indicus* (Hodgs.) — 1 St. Nepal.

Genus *Scelospizias* [*Scelospiza* (!)] Kaup 1847.

1. *Francesi* Smith — 1 ♂ Nossi-Kely (Madagascar); 1 ♀ Turafangura (Madagascar).

Genus *Lepthierax* Sundev. 1872 [*Cooperastur* (!) Bp. 1854].

1. *Cooperi* (Bp.) — 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♂ juv. Mexico.

2. *chilensis* (Phil. et Landb.) — 1 ♂ Magellanstrasse; 1 ♂ juv., 1 ♀ hornot. Collico (Chile); 1 ♀ Chile.

3. *pileatus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Rio-Grande; 1 ♂ jun., 1 ♀ Süd-Brasilien.

4. *bicolor* (Vieill.) — 1 ♂ Xalapa.

Genus *Leucospizias* [*Leucospiza* (!)] Kaup 1844.

1. *Novae Hollandiae* (Gm.) — 1 ♂ Port Jackson (Neu-Süd-Wales);
1 ♂, 1 ♀ Australien.
2. *cinereus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ jun. Australien.

Genus *Astur* Lacép. 1800—1801.

1. *palumbarius* (L.) — 1 ♂, 3 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♀ jun., 1 pullus Harz.
2. *atricapillus* (Wils.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ jun. Staat New-York; 1 ♂ jun. oberer Klamath-See (Vancouver).
3. *macrurus* Hartl. — 1 ♂ jun. Süd-Africa.

Genus *Rypornis* [*Rupornis* (!)] Kaup 1844.

1. *magnirostris* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♀ Venezuela; 1 St. Guiana; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien.
2. *Nattereri* (Scl. et Salv.) — 1 jun. Brasilien; 1 jun. Xalapa.
3. *Pucherani* (Verr.) — 1 ♂ jun. Columbien.

Genus *Asturina* Vieill. 1816.

1. *nitida* (Lath.) — 1 ♂ Bahia; 1 ♀ Mexico.
2. *plagiata* Schl. — 1 ♂ Peten, Vera-Paz (Guatemala); 1 ♀ Xalapa.
3. *leucorrhoea* (Quoy et Gaim.) — 1 St. Para.

Genus *Buteola* Bp. 1855.

1. *brachyura* (Vieill.) — 2 ♀ Brasilien; 1 ♂ jun. Süd-America.
2. *abbreviata* (Cab.) — 1 ♂ Xalapa.

Genus *Leucopternis* Kaup 1847.

1. *albicollis* (Lath.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Bahia; 1 ♀ Columbien.
2. *lacernulatus* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *Ghiesbrechti* (Du Bus) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Micronisus* Gray 1840.

1. *gabar* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Süd-Africa; 1 ♀ Abessinien;
1 ♀ Egypten.
2. *niger* (Vieill.) — 1 ♂ hornot. Keren (Abessinien); 1 ♀ blauer
Fluss, Sennaar.
3. *sphenurus* (Rüpp.) — 1 ♂ hornot. Chor-Ain in Samhar (N.-O.-
Africa).
4. *badius* (Gm.) — 1 ♂ Cochin; 1 ♂ jun. Smyrna; 1 ♀ Ostindien;
1 ♀ jun. Nepal.

Genus *Asturimula* Finsch et Hartl. 1870.

1. *monogrammica* (Temm.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ West-Africa.

Genus *Melierax* Gray 1840.

1. *canorus* (Risl.) — 1 ♂ Kaffernland; 1 ♂ Süd-Africa; 2 ♂ Cap;
1 ♀ hornot. Sennaar.
2. *polyzonus* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien; 1 ♂ hornot. Africa.
3. *poliopterus* Cab. — 1 ♂ Küste bei Lamu (Ost-Africa).

Genus *Harpagus* Vig. 1824.

1. *bidentatus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 ♂ juv. Para;
2 ♀ Columbien; 1 ♂ jun. Süd-America.
2. *diodon* (Temm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Süd-
America.

Genus *Nothierax* Sundev. 1872.

1. *ruficollis* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *zonothorax* Cab. — 1 ♂ Columbien; 1 ♂ jun. Süd-America; 1 ♀
Caracas.

Genus *Climacocercus* Cab. 1845.

1. *semitorquatus* (Vieill.) [*Falco brachypterus* Temm.] — 1 ♂ jun.

Rio Grande; 1 ♂ juv. Brasilien; 1 ♀
Xalapa.

2. *gilvicollis* (Vieill.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ jun. Xalapa.

Genus *Herpetotheres* Vieill. 1817.

1. *cachinnans* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂ Peru.

Genus *Geranospizias* [*Geranospiza* (!)] Kaup 1847.

1. *caerulescens* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *niger* (Du Bus) — 1 ♂ Guatemala.

Genus *Gymnogenys* Less. 1831.

1. *typicus* (Smith) — 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♀ blauer Fluss (Sennaar).
2. *Malzaki* Verr. — 1 ♂ West-Küste Africa's.
3. *radiatus* (Scop.) — 1 ♂ jun. Manakam (Madagascar); 1 ♀ jun
Nossi-Kely (Madagascar).

Subfam. *Circinae*.

Genus *Strigiceps* Bp. 1831.

1. *cyaneus* (L.) — 2 ♂, 2 ♀, 1 ♂ jun., 2 ♀ jun. Harz; 1 ♂, 1 ♀
juv. Hab. ?; 1 ♀ Wolga; 1 ♂ Hima-
laya.
2. *hudsonius* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Mexico; 1 ♀ jun. Mexico; 1 ♂,
1 ♀ Texas; 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Nord-
America.
3. *melanoleucus* (Forst.) — 1 ♂ Siam.
4. *maurus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap.
5. *cinereus* (Vieill.) — 2 ♂, 3 ♀, 1 ♂ juv. Chile; 1 ♂ Falklands-
Inseln; 1 ♀ Santiago (Chile).

Genus *Glaucopteryx* Kaup 1844.

1. *pygargus* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀, 1 ♀ jun. Harz; 1 ♂ adollesc. Pommern; 1 ♂ Tamak (Krim); 1 ♂ jun., 2 ♀ jun. Wolga; 1 ♂, 1 ♀ Zerratem bei Adoa (Abessinien).
2. *macrurus* (Gm.) — 1 ♂ Ungarn; 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂ Tamak (Krim); 1 ♂ jun. Harz; 1 ♀ jun. Hab. ?; 1 ♂, 1 ♀, 2 ♀ jun. Wolga; 1 ♀ Nord-Ost-Africa.

Genus *Spizacircus* Kaup 1845.

1. *maculosus* (Vieill.) [*Circus macropterus* Vieill.] — 1 ♀ juv. Brasilien; 1 ♀ juv. Chile.

Genus *Spilocircus* Kaup 1847.

1. *assimilis* (Jard. et Selb.) [*Circus Jardinei* Gould] — 1 ♂ Celebes; 1 ♀ Neu-Süd-Wales.
2. *Gouldi* (Bp.) [*Circus assimilis* Gould nec Jard. et Selb.] — 1 ♀ jun. Wanganui (Nord-Insel Neu-Seeland's).

Genus *Circus* Lacép. 1800—1801.

1. *aeruginosus* (L.) — 2 ♂, 3 ♀ Harz; 2 ♀ jun. Wolga; 1 ♂ Abessinien; 1 ♀ Menzaleh-See (Egypten).
2. *ranivorus* (Daud.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Subfam. Falconinae.

Genus *Hieracidea* Gould 1837.

1. *orientalis* (Schleg.) — 1 ♂, 1 ♀ Van-Diemensland.
2. *berigora* (Vig. et Horsf.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 ♀ jun. West-Australien; 1 ♀ *pallidior* Süd-Australien.

Genus *Harpe* Bp. 1855.

1. *Noxae Zeelandiae* (Gm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Microhierax* Sharpe 1874.

1. *fringillarius* (Drap.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ Malacca.
2. *caerulescens* (L.) — 1 ♂ Ostindien.
3. *erythrogenys* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Philippinen.

Genus *Tinnunculus* Vieill. 1807.

1. *alaudarius* (Gm.) — 8 ♂, 1 ♂ hornot., 2 ♀, 3 pulli Harz; 1 ♂ Nil-Delta; 1 ♀ Alexandrien; 1 ♂, 1 ♀ juv. Egypten; 1 ♀ Nubien; 1 ♂ jun., 4 ♀, 1 ♀ jun. Abessinien; 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 ♀ Kangra (Ostindien); 1 ♂, 1 ♀ [*Cerchneis tinnuncula* Brehm*] Thüringen; 1 ♂ [*C. taeniura* Brehm*] Thüringen; 1 ♀ Ungarn; 1 ♂ [*C. intercedens* Brehm*] Egypten; 1 ' Sennaar; 1 ♂ [*C. guttata* Brehm*] Mittel-Egypten; 1 ♀ Egypten; 1 ♂ [*C. pallida* Brehm*] Ober-Egypten; 1 ♀ Sennaar; 1 ♂ [*C. rupicolaeformis* Brehm*] Mittel-Egypten; 1 ♀ Egypten.
2. *interstinctus* (M'Clell.) — 1 ♀ Himalaya; 1 ♀ Abessinien.
3. *rupicolus* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland; 1 ♀ Süd-Africa, 1 ♂, 1 ♀ Cap.
4. *rupicolinus* [*rupicoloides* (!)] (Smith) — 1 ♂ Süd-Africa.
5. *punctatus* (Temm.) — 1 ♂ Madagascar.
6. *Newtoni* Gurn. — 1 ♀ Ambodavi (Madagascar).
7. *moluccensis* (Hombr. et Jacq.) — 1 ♂ Gilolo; 1 ♀ Celebes.
8. *cenchröides* (Vig. et Horsf.) — 1 ♀ Süd-Australien; 2 ♂, 1 ♀ juv. Australien.

Genus *Tichornis* Kaup 1844.

1. *cenchris* (Cuv.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Griechenland; 1 ♀ Ostindien; 1 ♂ Nord-Africa; 1 ♂ Zerratem bei Adoa (Abessinien); 1 ♂ Keren (Abessinien).

Genus *Poecilornis* Kaup 1844.

1. *sparverius* (L.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 ♀ juv. Nord-America; 3 ♂, 2 ♀ Xalapa; 1 ♂ Nord-Californien; 1 ♂ Chaparra-Gebirge (Californien); 1 ♀ Napa (Californien); 1 ♀ var. Hab.?
2. *cinnamominus* (Sws.) — 1 ♂ Süd-Carolina; 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Bahia; 1 ♂ Chile; 1 ♂ Collico (Chile); 1 ♂ hornot. Valdivia (Chile); 1 ♂, 1 ♀ Costa-Rica.
3. *isabellinus* (Sws.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Bogota; 1 ♀ Columbien; 1 ♂ Hab. ?; 1 ♀ juv. Bolivien.
4. *leucophrys* (Ridgw.) — 1 ♂ Cuba.
5. *dominicensis* (Gm.) — 1 ♂ Cuba.
6. *sparverinus* [*sparverioides* (!)] (Vig.) — 1 ♀ Cuba.

Genus *Erythropus* Brehm 1828.

1. *vespertinus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ juv. Thüringen; 1 ♂, 1 ♀ Krim; 1 ♂ Ephesus; 1 ♂ jun. Smyrna; 1 ♀ juv. Süd-Europa; 1 ♂ Ungarn; 1 ♀ Wolga; 1 ♀ Galizien; 1 ♂ Nord-Ost-Africa.

Genus *Tolmerus* Heine [*Chiquera* (!) Bp. 1854].

1. *chiquera* (Daud.) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♂ Timlah (Himalaya); 1 ♀ Rohtuk (Pendschab).
2. *ruficollis* (Sws.) — 2 ♂, 1 ♀ oberer blauer Fluss (Sennaar).

Genus *Pontotriorchis* Cab. 1862.

1. *concolor* (Temm.) — 1 ♂, 2 ♀ Nord-Ost-Africa; 1 ♂, 1 ♀ Dahlak (Nord-Ost-Africa).
2. *Eleonorae* (Géné) — 1 ♂ Smyrna; 1 ♀ Cycladen; 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Tragonisi (Cycladen); 1 ♀ var. Nubien.

Genus *Dissodectes* Scl. 1864.

1. *ardesiacus* (Vieill.) — 1 ♀ Bissao (West-Africa).

Genus *Aesalon* Kaup 1829.

1. *regulus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♂ hornot., 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Harz; 1 ♂ jun. Thüringen; 1 ♀ Pommern; 1 ♂ Sibirien; 1 ♀ Ben-Siat (Egypten).
2. *columbarius* (L.) — 1 ♂, 2 ♀ Nord-America; 1 ♂ juv. Bogota; 1 ♂ juv. Cuba.
3. *fusco-caerulescens* (Vieill.) [*Falco femoralis* Temm.] — 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien; 1 ♀, 1 ♀ juv. Mexico; 2 ♂, 2 ♀ Chile.

Genus *Hypotriorchis* Boie 1826.

1. *subbuteo* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Harz; 1 ♂, 2 ♀ Smyrna; 1 ♂ var. Isu-Sima (Japan).
2. *Cuvieri* (Smith) — 1 ♂ Abessinien; 1 ♂, 1 ♀ Usaramo (Ost-Africa).
3. *severus* (Horsf.) — 1 ♂ Sunda-Inseln.
4. *lunulatus* (Lath.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♀ Van-Diemensland.
5. *rufigularis* (Daud.) — 2 ♂ Guiana; 1 ♀ Süd-America; 1 ♀ jun. Brasilien; 1 ♂ La Parada (Mexico); 1 ♂ var. *minor* Guatemala.
6. *zoniventris* (Peters) — 1 ♀ Nossi-Kely (Madagascar).

Genus *Falco* Moehr. 1752.

1. *peregrinus* Gm. — 1 ♂, 3 ♂ jun., 5 ♀, 3 ♀ jun. Harz; 1 ♀ Thüringen; 1 ♂ jun. Schlesien; 1 ♂ Krim; 1 ♀ Dalmatien; 1 ♂ Africa; 1 ♀ Egypten.
2. *orientalis* Gm. — 2 ♂, 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Labrador; 1 ♂ jun. Texas; 1 ♂, 1 ♂ jun. Groenland.
3. *melanogenys* Gould — 1 ♂, 1 ♀ jun. West-Australien; 1 ♀ jun. Australien.
4. *peregrinator* Sundev. — 1 ♂, 1 ♀ Madras.

Genus *Gennadas* Heine [*Gennaea* Kaup 1847 nec *Gennaeus* Wagl. 1832].

1. *tanypterus* (Schleg.) — 1 ♂, 1 ♀ Nubien; 1 ♂ jun. Hatich-Korosko (Nubien); 1 ♀ Abu-Hamed (Nubien); 1 ♀ Edfu (Egypten); 1 ♂ Nord-Ost-Africa; 1 ♀ Abessinien.
2. *Feldeggi* (Schleg.) — 1 ♂ Griechenland.
3. *biarmicus* (Temm.) — 2 ♂ Süd-Africa.
4. *barbarus* (L.) — 1 ♀ blauer Fluss (Sennaar); 1 ♀ Africa.
5. *juggur* (Gray) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ Sumblean (Ostindien); 1 ♀ jun. Etawah (Ostindien).

Genus *Pnigohierax* Cab. 1872.

1. *sacer* (Gm.) — 2 ♂ Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Ungarn; 1 ♀ Sa-repta; 1 ♀ Süd-Russland; 2 ♂ jun., 2 ♀ jun. Tamak (Krim).
2. *mexicanus* (Schleg.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Westküste von Nord-America.

Genus *Hierofalco* Cuv. 1817.

1. *candicans* (Gm.) — 1 ♂, 3 ♂ jun., 4 ♀, 5 ♀ jun. Nord-Europa; 1 ♂ jun., 1 ♀ Groenland.

2. *islandus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-Europa.
3. *Holboelli* Sharpe — 1 ♂ Groenland.
4. *gyrfalco* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Kautokeino (norwegisches Lappland);
1 ♂ jun. Waranger-Fjord (Ost-Finnmarken).
5. *labradorus* (Aud.) — 1 ♀ jun. Labrador.
6. *subniger* Gray — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Australien.

Subfam. Milvinae.

Genus *Gampsonyx* Vig. 1825.

1. *Swainsoni* Vig. — 1 ♂ Baranquilla (Neu-Granada); 1 ♀ Columbien; 1 ♂ Caracas; 1 ♀ Angostura.

Genus *Ictinia* Vieill. 1816.

1. *mississippiensis* (Wils.) — 2 St. Dallas (Texas).

Genus *Nertus* Boie 1826.

1. *plumbeus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Brasilien; 1 ♀ Porto Cabello.

Genus *Elanus* Sav. 1809.

1. *caeruleus* (Desf.) — 1 ♂ Cap; 1 ♀, 1 ♀ jun. Abessinien.
2. *axillaris* (Lath.) — 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Australien.
3. *leucurus* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Guiana; 1 ♀ jun. Süd-America;
1 ♀ Chile; 1 ♂ jun., 1 ♀ Californien.
4. *hypoleucus* Gould — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Oceanien.

Genus *Elasas* Heine [*Elanoides* (!) Vieill. 1818].

1. *furcatus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂, 1 ♀ Columbien.

Genus *Hydrictinia* Kaup 1844.

1. *migrans* (Bodd.) — 1 ♂, 2 ♀, 1 pullus Harz.
2. *affinis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Australien; 2 ♂ jun. Timor.
3. *aegyptia* (Gm.) — 1 ♂ Cap; 1 ♀ Abessinien.

Genus *Milvus* Cuv. 1799—1800.

1. *ictinus* Sav. — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *govinda* Sykes — 1 ♂ Nepal; 1 ♀ Japan.
3. *melanotis* Temm. et Schleg. — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Hamirostrum* Sundev. 1873 [*Rostrhamus* (!) Less.
1831].

1. *sociabile* (Vieill.) — 1 ♂, 1 jun. Brasilien; 1 ♂ jun. Süd-America.
2. *taeniurum* (Cab.) — 1 St. Brasilien.

Genus *Regerhinus* Kaup 1845.

1. *uncinatus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 ♀ Xalapa;
1 ♀ Guiana; 1 ♀ jun. Venezuela.

Genus *Machaerorhamphus* Westerm. 1851.

1. *alcinus* Westerm. — 1 St. Mindai (Nord-Borneo).

Genus *Lepidogenys* Gray 1839.

1. *lophotes* (Cuv.) — 1 St. Insel Salanga (Malacca).
2. *Reinwardti* (Müll. et Schleg.) — 1 ♂ Amboina; 1 St. Insel
Waigiou.
3. *subcristatus* (Gould) — 1 ♂ Australien.

Genus *Avicida* Sws. 1837.

1. *madagascariensis* Smith — 1 St. Marovoay (West-Madagascar).

Genus *Odontriorchis* Kaup 1844.

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂ Süd-America; 1 ♀ jun. Brasilien.

Genus *Pernis* Cuv. 1817.

1. *apivorus* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 3 ♀ Harz; 1 ♂, 1 ♀ var. *alba* Braunschweig.
2. *ptilorhynchus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Ostindien.

Subfam. Buteoninae.

Genus *Poliornis* Kaup 1844.

1. *teesa* (Frankl.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *indicus* (Gm.) — 1 ♀ Philippinen.
3. *liventer* (Temm.) — 1 ♂ Ostindien.
4. *rufipennis* (Sundev.) — 1 ♂ blauer Fluss (Sennaar); 1 ♀ Chartum (Sennaar).

Genus *Archibuteo* Brehm 1828.

1. *lagopus* (Gm.) — 2 ♂, 3 ♀ Harz; 1 ♀ Wolga.
2. *Sancti Johannis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Labrador; 1 ♂ Philadelphia; 1 ♀ Neu-York; 1 ♂ Nord-America.

Genus *Buteo* Cuv. 1799—1800.

1. *vulgaris* Bechst. — 4 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀, 1 ♂ var. *alba*, 2 ♀ var. *alba* Harz.
2. *plumipes* (Hodgs.) — 1 ♂ Japan.
3. *desertorum* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♀ Algier; 1 ♂ blauer Fluss (Sennaar).
4. *brachypterus* Pelz. — 1 ♂ Ambonialla (Madagascar); 1 ♂ Nossi-bé (Madagascar).

5. *ferox* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♂ jun., 3 ♀, 1 ♀ jun. Sarepta; 1 ♂ jun. Nord-Ost-Africa.
6. *fuliginosus* Hume — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Pterolestes* Sundev. 1874.

1. *augur* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien; 1 ♀ Woggera (Nord-Ost-Africa); 1 ♀ jun. Africa.
2. *jakal* (Daud.) — 1 ♂, 2 jun. Süd-Africa.

Genus *Poecilopternis* Kaup 1847.

1. *borealis* (Gm.) — 1 ♂ Louisiana; 1 ♀ Central-America; 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Mexico; 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ jun., 1 ♀ jun., 1 ♀ juv. Chile; 1 ♀ Staat Neu-York.
2. *lucasanus* (Ridgw.) — 1 ♀ Olema Marin City (Vancouver).
3. *montanus* (Nutt.) — 1 ♂ Westliches Nord-America; 1 ♂ Chaparra-Gebirge (Californien); 1 ♂ jun. Geysers-Felsen (Californien).
4. *lineatus* (Gm.) — 1 ♂ Maine; 1 ♂ adultior, 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♂, 1 ♀ Staat Neu-York.
5. *pensylvanicus* (Wils.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Tachytriorchis* Kaup 1844.

1. *albicaudatus* (Vieill.) — 1 ♀ Texas; 1 ♂ adol., 1 ♂ jun. Chile; 1 ♂, 1 ♀ jun. Mexico; 1 ♂ juv. [*fere niger*] Guiana.
2. *erythronotus* (King) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Chile; 1 ♂ juv. Falklands-Inseln.

Genus *Geranaëtus* Kaup 1847.

1. *melanoleucus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Chile.

Genus *Urubitornis* Verreaux 1856.

1. *solitarius* Tschudi — 1 ♂ Caracas.

Subfam. *Aquilinae*.

Genus *Halinertus* Heine [*Haliastur* (!) Selb. 1840].

1. *indus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Bengalen.
2. *intermedius* (Gurn.) — 1 ♂, 1 ♀, 2 jun. Sunda-Inseln.
3. *girrenera* (Vieill.) [*Haliaëtus leucosternus* Gould] — 1 ♂ Morty-Insel; 1 ♀ Australien.
4. *sphenurus* (Vieill.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.

Genus *Circaëtus* Vieill. 1816.

1. *gallicus* (Gm.) — 1 ♀ Süd-Frankreich; 1 ♂ Theben (Egypten);
1 ♀ blauer Fluss (Sennaar).
2. *cinereus* Vieill. — 1 ♀ jun. Port Natal.
3. *fasciolatus* Gray — 1 ♂ Port Natal.

Genus *Spilornis* Gray 1840.

1. *cheela* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 ♂ jun., 1 ♀ Himalaya; 1 ♂,
1 ♀ (*maiores*) Saharanpur (Ostindien).
2. *melanotis* (Jerd.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Andamanen.
3. *pallidus* Walden — 1 ♂ juv. Jambusan-Sarawak (Borneo).
4. *bacha* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♂ jun. var. Java.
5. *Elgini* (Tytler) — 1 ♂ Andamanen.
6. *rufipectus* Gould — 1 ♂ Macassar (Celebes).
7. *holospilus* (Vig.) — 1 ♂ China; 1 ♀ Philippinen.

Genus *Helotarsus* Smith 1830.

1. *ecaudatus* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.
2. *leuconotus* Rüpp. — 1 ♀ Bissao (West-Africa).

Genus *Gypohierax* Rüpp. 1825.

1. *angolensis* (Gm.) — 1 ♀ Bissao (West-Africa).

Genus *Pandion* Sav. 1809.

1. *haliaëtus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 pullus Laaland; 1 ♀ Egypten; 1 ♂ Tunging Surah Johore (Malacca).
2. *carolinensis* (Gm.) — 1 ♂ Xalapa; 1 ♀ Porto Cabello; 1 ♂ Staat Neu-York.
3. *leucocephalus* Gould — 1 ♂ jun. West-Australien; 1 ♂, 1 ♀ Insel Waigiou.

Genus *Poliaëtus* Kaup 1847.

1. *ichthyäetus* (Horsf.) — 1 ♂ Loharkhet (Ostindien); 1 ♀ Borneo; 1 ♀ jun. Nepal; 1 ♀ jun. Sunda-Inseln.
2. *humilis* (Müll. et Schleg.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Sumatra; 1 ♀ juv. Jambusan Sarawak (Borneo).

Genus *Pontaëtus* Kaup 1844.

1. *leucogaster* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Sumatra; 1 ♀ Australien.
2. *vocifer* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♀ Nord-Ost-Africa; 1 ♂ jun., 1 ♀ juv. Africa.
3. *leucoryphus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Kirgisen-Steppe.

Genus *Thalassaëtus* Kaup 1844.

1. *pelagicus* (Pall.) — 1 ♂ Ajan-Bai (Ochotskisches Meer).

Genus *Haliaëtus* Sav. 1809.

1. *albicilla* (L.) — 1 ♂, 3 ♂ jun., 1 ♀, 3 ♀ jun. Harz; 2 ♂, 1 ♀ Sarepta; 1 ♂ Egypten; 1 ♀ [*H. groenlandicus* Brehm*] Groenland.

2. *leucocephalus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♂ jun. Milwaukee (Wisconsin).

Genus *Aquila* Briss. 1760.

1. *chrysaetos* (L.) — 1 ♂ Griechenland; 1 ♀ Athen.
2. *fulva* (L.) — 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Harz; 1 ♀ jun. Schlesien; 1 ♀ jun. Schweiz.
3. *canadensis* (Gm.) — 1 ♀ jun. Georgien (Nord-America).
4. *nipalensis* Hodg. — ♀ Gurre Goorsavu (Pendschab); 1 ♀ Mussoine (Ostindien).
5. *heliaca* Sav. — 1 ♂, 1 ♂ juv. Griechenland; 1 ♂ juv., 1 ♀ juv. Dobrudscha.
6. *Adalberti* Brehm — 1 ♂, 1 juv. Sevilla (Spanien).
7. *bifasciata* Gray [? *A. mogilnik* Gm.] — 1 ♂ Ostindien.
8. *orientalis* Cab. — 2 ♂, 2 ♀ Sarepta.
9. *clanga* Naum. — 1 ♂ Nord-Ost-Africa; 1 ♀ Egypten; 1 ♂ jun. Theben (Egypten); 1 ♂ juv. Harz.
10. *Boeckii* Homeyer* — 1 St. [Journ. Orn. 1874 p. 105 t. III; ibid. 1875 p. 163] Russland.
11. *naevia* (Gm.) — 1 ♂ Harz; 1 ♀ West-Preussen; 1 ♀ Pommern.
12. *hastata* (Less.) — 1 ♂ Leoni (Ostindien).
13. *vinhiana* Frankl. — 1 ♂, 1 ♀ Etawah (Ostindien); 1 ♂ Leoni (Ostindien).
14. *rapax* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Kaffernland; 1 ♂ jun. Süd-Africa, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. [*A. naevioides* (!) Cuv.] Abessinien; 1 ♀ adolesc. Nord-Ost-Africa; 1 ♂, 1 ♀ juv. blauer Fluss (Sennaar).

Genus *Uraetus* Kaup 1844.

1. *audax* (Lath.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♀ Van-Diemensland.

Genus *Neopus* Hodg. 1844.

1. *malayensis* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Darjeeling (Ostindien).

Genus *Pteraëtus* Kaup 1844.

1. *Verreauxi* (Less.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Eutolmaëtus* Blyth 1845 [*Nisaëtus* (!) Hodgs. 1836].

1. *fasciatus* (Vieill.) [*Falco Bonelli* Temm.] — 1 ♂ jun. Griechenland; 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♀ Nepal.

Genus *Hieraëtus* Kaup 1844.

1. *pennatus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Griechenland; 1 ♀ Egypten; 1 ♀ Nord-Ost-Africa.

Subfam. Spizaëtinae.

Genus *Spizaëtus* Vieill. 1816.

1. *Mauduyti* (Daud.) — 1 ♂ Columbien; 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♀ Mexico; 1 ♀ *major* Porto Cabello.

Genus *Pternura* Kaup 1845.

1. *tyrannus* (Wied) — 1 ♂ juv. Xalapa; 1 ♀ Brasilien.

Genus *Tolmolestes* Heine [*Spiziastur* (!) Less. 1837].

1. *melanoleucus* (Vieill.) — 1 ♂ Columbien.

Genus *Lophaëtus* Kaup 1847.

1. *occipitalis* (Daud.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien; 1 jun. Süd-Africa.
2. *Brehmi* (v. Müller) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ blauer Fluss (Sennaar).

Genus *Polemaëtus* Heine 1885.

1. *bellicosus* (Daud.) — 1 ♂ juv. Bissao (West-Africa).

Genus *Limnaëtus* Vig. 1830.

1. *caligatus* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Java; 1 ♂ Sunda-Inseln; 1 ♀ Rangas bei Barabai (Borneo).
2. *cirrhatu*s (Gm.) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Bengalen.
3. *alboniger* (Blyth) [*Spizaëtus nanus* Wallace] — 1 ♂ Jafferiah-Johore (Malacca).
4. *nipalensis* Hodgs. — 1 ♂, 2 ♀ Nepal; 1 ♀ Darjeeling.

Genus *Harpyhaliäetus* Lafr. 1842.

1. *coronatus* (Vieill.) — 1 ♂ Buenos-Ayres.

Genus *Morphnus* Cuv. 1817.

1. *guianensis* (Daud.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Thrasaëtus* Gray 1837.

1. *harpyia* (L.) — 1 ♂ Columbien; 1 ♀ Porto Cabello.

Subfam. **Serpentariinae.**

Genus *Serpentarius* Cuv. 1798.

1. *secretarius* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.

Subfam. **Polyborinae.**

Genus *Ichthyoborus* Kaup 1845.

1. *nigricollis* (Lath.) — 1 ♂ Surinam; 2 ♀ Venezuela.

Genus *Alectromorphnus* Heine [*Buteogallus* (!) Less. 1831].

1. *aequinoctialis* (Gm.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Heterospizias* Sharpe 1874 [*Spizigeranus* (!) Kaup 1844].

1. *meridionalis* (Lath.) — 1 ♂ Guayaquil; 1 ♂ jun. Guiana; 1 ♀ juv. Venezuela; 1 ♀ jun. Rio Grande; 1 ♀ Paraguay.

Genus *Hypomorphnus* Cab. 1844.

1. *urubitinga* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Brasilien; 1 ♀ jun. Cayenne.
2. *anthracinus* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 jun. Yucatan.
3. *schistaceus* (Sundev.) — 1 St. Brasilien.

Genus *Erythrocnema* Sharpe 1874.

1. *unicincta* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc., 1 ♂ juv., 1 ♀ Chile; 1 ♀ West-Küste von Californien.

Genus *Milvago* Spix 1824.

1. *chimachima* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.
2. *chimango* (Vieill.) — 1 ♂ Chile; 1 ♀ Süd-America.

Genus *Oronertus* Heine [*Phalcobaenus* (!) Lafr. 1837].

1. *megalopterus* (Meyen) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Patagonien; 1 ♀ juv. Bolivien.

Genus *Polyborus* Vieill. 1816.

1. *tharus* (Mol.) — 1 ♂ juv. Süd-America; 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ jun., 1 ♀ Chile.
2. *cheriway* (Jacq.) — 1 ♂ Süd-America; 1 ♂ Caracas.

Genus *Daptrius* Vieill. 1816.

1. *ater* Vieill. — 1 ♂ Cayenne.

Genus *Ibycter* Vieill. 1816.

1. *americanus* (Bodd.) — 1 ♂ Guiana.
-

Fam. Vulturidae.

Subfam. Gypaëtinae.

Genus *Gypaëtus* Storr. 1784.

1. *barbatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Schweiz.
2. *ossifragus* (Sav.) — 1 ♂ jun. Constantine (Algier).

Subfam. Neophroninae.

Genus *Neophron* Sav. 1809.

1. *percnopterus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Egypten.
2. *monachus* (Temm.) — 1 ♂ Chartum (Sennaar); 1 ♀ Abessinien.

Subfam. Sarcorhamphinae.

Genus *Catharista* Vieill. 1816.

1. *atrata* (Bartr.) — 1 ♂, 2 ♀ Süd-America.

Genus *Oenops* Sharpe 1874.

1. *aura* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-America.

Genus *Sarcorhamphus* Dum. 1806.

1. *gryphus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Anden von Chile; 1 ♂ Anden von Peru.

Genus *Cathartes* Ill. 1811.

1. *papa* (L.) — 2 ♂ Columbien; 1 jun. Süd-America.

Subfam. Vulturinae.

Genus *Gyps* Sav. 1809.

1. *fulvus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-Ost-Africa; 1 jun. Süd-Europa.
2. *Rüppelli* Brehm — 1 ♂ Chartum (Sennaar).

Genus *Pseudogyps* Sharpe 1873.

1. *africanus* Salvad. — 1 St. Chartum (Sennaar).

Genus *Otogyps* Gray 1841.

1. *auricularis* (Daud.) — 1 ♂ Chartum (Sennaar); 1 ♂ Nubien.
2. *calvus* (Scop.) — 1 ♂ Bengalen.

Genus *Vultur* Moehr. 1752.

1. *monachus* L. — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♀ Griechenland.

Genus *Lophogyps* Bp. 1854.

1. *occipitalis* (Burch.) — 1 St. Chartum (Sennaar).
-

Ordo VII. Gyratores.

Fam. Columbidae.

Subfam. Columbinae.

Genus *Columba* L. 1735.

1. *livia* „Br.“ Bp. — 1 ♂ Harz; 1 ♀ Orkney-Inseln.
2. *domestica* var. *livia* Gm. — 7 ♂, 1 ♀ Harz.
3. *turricola* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Italien.
4. *Schimperi* Bp. — 1 ♂ Abu-Hamed (Nubien); 1 ♀ Wüste von Assuan (Nord-Ost-Africa); 1 ♂, 1 jun. Warnat (Nord - Ost - Africa); 1 ♀ Gjebel-Kiffensser (Algier).
5. *rupestris* Pall. — 1 ♂ Schealkur (Himalaya); 1 St. Korzog (Ostindien).
6. *leuconota* Vig. — 1 ♂ Himalaya; 1 St. Kangsar (Ostindien).

Genus *Coelotreron* Heine [*Palumboena* (!) Bp. 1854].

1. *oenas* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *Eversmanni* (Bp.) — 1 St. Sukkar-Sind (Ostindien).

Genus *Palumbus* Kaup 1829.

1. *torquatus* (Leach) — 1 ♂, 2 ♀ Harz.

Genus *Dendrotreton* Hodgs. 1843.

1. *Hodgsoni* (Vig.) — 1 ♀ Nepal.

Genus *Tryzusa* Heine [*Turturoenas* (!) Bp. 1854].

1. *iriditorques* (Cass.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Patagoenas* Rehb. 1853.

1. *leucocephala* (L.) — 1 ♂ Haiti.

Genus *Stictoenas* Rehb. 1853.

1. *arquatrix* (Temm.) — 1 ♂ Cap; 1 ♀ Süd-Africa.
2. *arquatricula* Bp. — 1 ♂ Purehs-Meh (Ost-Africa).
3. *guinea* (L.) — 1 ♀ Abessinien.
4. *phaconota* (Gray) — 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Taenioenas* Rehb. 1853.

1. *albitorques* (Rüpp.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Lepidocnas* Rehb. 1853.

1. *speciosa* (Gm.) — 1 ♂ Esmeraldas (Ecuador); 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Crossophthalmus* Bp. 1854.

1. *gymnophthalmus* (Temm.) — 1 ♂ Süd-America.
2. *maculosus* (Temm.) — 1 ♀ Süd-Brasilien.

Genus *Chloroenas* Rehb. 1853.

1. *fasciata* (Say) — 1 St. Mexico.
2. *albilineata* (Gray) — 1 ♂ Chillanes (Ecuador); 1 ♀ Neu-Granada.

3. *araucana* (Less.) — 2 ♂, 1 ♀ Chile.
4. *flavirostris* (Wagl.) — 1 ♂ Xalapa.
5. *rufina* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Britisch-Guiana.
6. *plumbea* (Vieill.) — 1 ♀ Rio-Grande.
7. *locutrix* (Wied) — 1 ♀ Nord-Brasilien.
8. *vinacea* (Temm.) — 1 ♂ Nanegal (Ecuador); 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).
9. *sylvestris* (Vieill.) — 1 ♂ Rio Grande; 1 ♀ Süd-Ost-Brasilien.
10. *nigrirostris* Schl. — 1 St. Pétén, Vera Paz (Guatemala).

Subfam. Turturinae.

Genus *Turtur* Selby 1835.

1. *auritus* Gray — 1 ♂, 1 ♀ jun. Harz.
2. *rupicolus* (Pall.) — 1 ♂ Nepal.
3. *picturatus* (Temm.) — 1 ♂ Mauritius.
4. *suratensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Ostindien.
5. *senegalensis* (L.) — 1 ♂ Nord-Ost-Africa.
6. *cambayensis* (Gm.) — 1 ♂ Klein-Asien.
7. *isabellinus* Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Ost-Africa; 1 ♀ Türkei.

Genus *Streptopelia* Bp. 1856.

1. *lugens* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Ost-Africa.
2. *erythrophrys* (Sws.) — 1 ♂ Port Natal.
3. *semitorquata* (Sws.) — 1 ♂ Port Natal; 1 ♀, 1 ♀ jun. Capland.
4. *vinacea* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun., 1 ♀ Nord-Ost-Africa.
5. *risoria* (L.) var. *domestica* — 1 ♀, 1 ♀ var. *alba* Harz.
6. *bitorquata* (Temm.) — 1 ♀ Java.

Subfam. **Macropygiinae.**

Genus *Ectopistes* Sws. 1837.

1. *migratorius* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Perissura* Cab. 1856 [*Zenaidura* (!) Bp. 1854].

1. *marginata* (L.) — 1 ♂ Süd-Carolina; 1 ♀ Georgien; 1 ♂ jun. Nord-America.

Genus *Oena* Selby 1837.

1. *capensis* (L.) — 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♂ Dongola; 1 ♂ West-Africa; 1 ♂ juv., 1 pullus Abessinien.

Genus *Macropygia* Sws. 1837.

1. *amboinensis* (L.) — 1 ♂ Gilolo; 1 juv. Celebes.
2. *doreya* Bp. — 1 ♂ Neu-Guinea.
3. *batchianensis* Wall. — 1 ♀ Mysol.
4. *Emiliana* Bp. — 1 ♂, 1 ♂ juv. Java; 1 ♀ Sunda-Inseln.
5. *ruficeps* (Temm.) — 1 ♂ Borneo; 1 ♀ jun. Java.
6. *nigrirostris* Salvad. — 1 ♂ Neu-Britannien.

Genus *Coccyzura* Hodgs. 1843.

1. *leptogrammica* (Temm.) — 1 ♂ Java.
2. *tusalia* Hodgs. — 1 ♀ Nepal.

Genus *Haploenas* Heine [*Turacoena* (!) Bp. 1854].

1. *manadensis* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Sula-Inseln.
2. *modesta* (Temm.) — 1 ♂ Timor.

Genus *Coccyzoenas* Heine [*Reinwardtoenas* (!) Bp. 1854].

1. *Reinwardti* (Temm.) — 1 ♂ Morty-Insel.

Subfam. *Treroninae*.

Genus *Treron* Vieill. 1816.

1. *aromatica* (Gm.) — 1 ♀ Buru.
2. *pulverulenta* Wall. — 1 ♂ Java; 1 ♂ Borneo; 1 ♂ Sunda-Inseln.
3. *griseicauda* Gray — 1 ♂ Macassar (Celebes).

Genus *Rhamphotreron* Heine [*Toria* (!) Hodgs. 1836,
Romeris (!) Hodgs. 1841].

1. *nipalensis* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal; 1 ♀ Malacca.

Genus *Crocopus* Bp. 1854.

1. *phoenicopterus* (Lath.) — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Osmotreron* Bp. 1854.

1. *fulvicollis* (Wagl.) — 1 ♂ Borneo.
2. *olax* (Temm.) — 2 ♂ Sumatra; 1 ♀ Malacca; 1 ♀ Singapore.
3. *viridis* (Scop.) — 2 ♂ Sunda-Inseln; 2 ♂ Java; 1 ♂ Malacca;
2 ♀ Sumatra.
4. *bicincta* (Jerd.) [*Columba vernans* Temm. nec L.] — 1 ♂ Bengalen; 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ Insel Sallanga.

Genus *Butreron* Bp. 1854.

1. *Capellei* (Temm.) — 1 ♂ Java.

Genus *Sphenocercus* Gray 1840.

1. *sphenurus* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
2. *Sieboldi* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Japan.
3. *Korthalsi* (Müll.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ Sumatra.
4. *apicaudus* (Hodgs.) — 1 ♀ Ostindien.
5. *oxyurus* (Reinw.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Phalacrotreron* Bp. 1854.

1. *Delalandi* Bp. — 2 ♂, 1 ♀ Port Natal; 1 ♀ Süd-Africa.
2. *calva* (Temm. et Knip.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Africa; 1 ♂ Cap Lopez. (West-Africa).
3. *Waalii* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Senegal.

Genus *Ptilopus* Sws. 1825.

1. *regina* (Sws.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ Australien.
2. *Greyi* Gray — 1 ♂ Neu-Hebriden.

Genus *Curotreron* [*Kurutreron* (!)] Bp. 1854.

1. *taitensis* (Less.) — 1 ♂ jun. Otaheiti.

Genus *Terenotreron* Heine [*Thouarsitreron* (!)] Bp. 1854].

1. *Dupetit-Thouarsi* (Neboux) — 1 ♂, 1 ♀ Marquesas-Inseln.
2. *xanthogaster* (Wagl.) — ♂ Aru-Inseln.

Genus *Jotreron* Bp. 1854.

1. *pectoralis* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Waigiou.
2. *melanocephalus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Java.
3. *melanospilus* (Salvad.) — 1 ♂ Celebes.
4. *chrysorrhous* (Salvad.) — 1 ♀ jun. Ceram.
5. *viridis* (L.) — 1 ♂ Nord-Ceram.
6. *iogaster* [*hyogaster* (!)] (Reinw.) — 1 ♂ Gilolo.
7. *nanus* (Temm.) — 1 St. Waigiou.

Genus *Cyanotreron* Bp. 1854.

1. *monachus* (Temm.) — 2 ♂ Ternate; 1 ♀ juv. Gilolo.
2. *pulchellus* (Temm.) — 1 ♂ Ceram; 1 ♂ Neu-Guinea.
3. *coronulatus* (Gray) — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Phassa* Heine [*Rhamphiculus* (!) Bp. 1854].

1. *jambu* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Sumatra.

Genus *Pocilotreron* Heine [*Sylphidoena* (!) Bp. 1854].

1. *Wallacei* (Gray) — 1 ♂ Aru-Inseln.

Genus *Lamprotreron* Bp. 1854.

1. *superbus* (Temm.) — 1 ♂ Amboina; 1 ♀ Mysol.
2. *Temmincki* (Des Murs et Prév.) — 1 ♀, 1 juv. Ceram.
3. *porphyreus* („Reinw.“ Temm.) — 1 ♂ Rurukan Minahassa (Celebes); 1 ♂ Java; 1 ♂ Molukken?

Genus *Leucotreron* Bp. 1854.

1. *cinctus* (Temm.) — 1 ♂ West-Timor.

Subfam. Carpophaginae.

Genus *Carpophaga* Selby 1835.

1. *Paulinae* (Temm.) — 1 ♂ Celebes; 1 ♀ Sulu-Inseln.
2. *chalybura* Bp. — 1 ♂ jun. Manilla.
3. *aenea* (L.) — 1 ♂ Borneo.
4. *perspicillata* (Temm.) — 1 ♂ Ternate; 1 ♀ Neu-Guinea.
5. *sylvatica* (Tick.) — 1 St. Ostindien.

Genus *Globicera* Bp. 1854.

1. *myristicivora* (Scop.) — 1 ♂ Ceram; 1 ♂, 1 ♀ Mysol.
2. *rubricera* (Gray) — 1 ♂ Malacurra (Neu-Britannien).

Genus *Myristicivora* Rehb. 1853.

1. *bicolor* (Scop.) — 1 ♂ Ceram.
2. *luctuosa* (Reinw.) — 1 ♂ Sulu-Inseln.

3. *spilorrhoea* (Gray) — 1 ♂ Nord-Australien.
4. *melanura* (Gray) — 1 ♂ Batchian.
5. *grisea* (Gray) — 1 ♀ Java.

Genus *Ducula* Hodg. 1836.

1. *badia* (Raffl.) — 1 ♂ Sumatra.
2. *lacernulata* (Temm.) — 1 ♂ Java.
3. *basalica* (Sund.) — 1 ♂ Neu-Guinea.
4. *rosacea* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Timor.

Genus *Laryngogramma* Rchb. 1862 [*Trerolaema* (!)
Bp. 1855].

1. *gularis* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Nord-Celebes.

Genus *Zonoenas* Rchb. 1853.

1. *pinon* (Quoy et Gaim.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♀ Mysol.
2. *Zoeae* (Less.) — 1 ♂ Aru-Inseln; 1 ♀ Neu-Guinea.
3. *rufiventris* Salvad. [*Columba rufigaster* (!) Quoy et Gaim.] — 1 ♂
Waigiou.

Genus *Gymnophaps* Salvad. 1874.

1. *pocillorrhoea* (Brügg.) — 1 ♀ Rurukan Minahassa (Celebes).

Genus *Janthoenas* Rchb. 1853.

1. *janthina* (Temm.) — 1 ♂ Japan.
2. *castaneiceps* (Peale) — 1 ♂ Samoa-Inseln.

Genus *Megaloprepia* Rchb. 1853.

1. *magnifica* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.
2. *puella* (Less.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♀ Ceram.
3. *formosa* (Gray) — 1 ♂ Gilolo,

Genus *Hemiphaga* Bp. 1854.

1. *Novae Zeelandiae* (Gm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.
2. *spadicea* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.
3. *poliocephala* (Gray) — 1 ♂ Philippinen.
4. *Forsteni* (Temm.) — 1 ♂ Rurukan Minahassa (Celebes).

Genus *Ptilocolpa* Bp. 1854.

1. *griseipectus* (Gray) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Leucomelaena* Bp. 1854.

1. *norfolciensis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Lopholaemus* Gray 1844.

1. *antarcticus* (Shaw) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ juv. Australien.

Subfam. Chamaepeliinae.

Genus *Chamaepelia* Sws. 1827.

1. *passerina* (L.) — 1 ♂ Mexico; 1 ♂ Costa-Rica.
2. *granatina* Bp. — 1 ♂ Porto Cabello.
3. *griseola* (Spix) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Leptopelia* Heine [*Talpacotia* (!) Bp. 1854].

1. *talpacoti* (Temm.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *rufipennis* (Gray) — 1 ♂ Costa-Rica; 1 ♀ Caracas.

Genus *Micropelia* Heine [*Scardafella* (!) Bp. 1854].

1. *inca* (Less.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Mexico.
2. *squamosa* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Zenaida* Bp. 1838.

1. *maculata* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *auriculata* (Des Murs) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
3. *hypoleuca* Gray — 1 ♂ Calacali (Ecuador).

Genus *Stenuroena* Rehb. 1854.

1. *stenura* (Bp.) — 1 ♂ Bogota.
2. *ruficauda* (Gray) — 1 ♂ Caracas; 1 ♀ Venezuela.

Genus *Melopelia* Bp. 1854.

1. *leucoptera* (L.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Peristera* Sws. 1827.

1. *cinerea* (Temmm.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *Geoffroyi* (Temmm.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Metriopelia* Bp. 1854.

1. *melanoptera* (Molin.) — 1 ♂ Chimborazo (Ecuador); 2 ♀ Chile.

Genus *Leptoptila* Sws. 1837.

1. *albifrons* „Gray“ Bp. — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Esquintla (Guatemala).
2. *rufaxilla* (Rich. et Bern.) — 1 ♀ Britisch-Guiana.
3. *brasiliensis* Gray — 1 ♂ Brasilien.
4. *Verreauxi* Bp. — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Gymnopelia* ScL. 1873.

1. *erythrothorax* (Temmm.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Brasilien.

Genus *Geopelia* Sws. 1837.

1. *striata* (L.) — 1 ♂ juv. Ostindien; 1 ♀ Amboina.

2. *humeralis* (Temm.) — 1 ♂ Australien.
3. *Maugei* (Temm.) — 1 ♂ Timor.

Genus *Stictopelia* Rehb. 1853.

1. *cuneata* (Lath.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♀ Port Jackson (Neu-Süd-Wales).

Subfam. Geotryginae.

Genus *Chalcopelia* Bp. 1854.

1. *afra* (L.) — 2 ♂ Sennaar.
2. *chulcospila* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
3. *puella* (Schleg.) — 1 ♂ Cap Lopez (West-Africa).

Genus *Tympanistria* Rehb. 1853.

1. *bicolor* Rehb. [*Columba tympanistria* Temm.] — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Oropelia* Rehb. 1854.

1. *montana* (L.) — 1 ♂ Rio-Grande; 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Cuba.
2. *violacea* (Temm.) — 1 ♂ Bahia.
3. *martinica* (L.) — 2 ♂ Cuba.

Genus *Geotrygon* Gosse 1847.

1. *Bourcieri* Bp. — 1 ♂, 1 jun. Pallatanga (Ecuador).
2. *albifacies* Gray — 1 ♂ Mexico.
3. *linearis* (Knip. et Prév.) — 1 ♂ Porto Cabello.

Genus *Starnoenas* Bp. 1838.

1. *cyanocephala* (L.) — 1 ♂ Cuba.

Genus *Ocyphaps* Gould 1842.

1. *lophotes* (Temm.) — 1 ♂ Darling-Mündung (Süd-Australien);
1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Cosmopelia* Sund. 1872.

1. *elegans* (Temm.) — 1 ♂, 2 ♀ Australien.

Genus *Phaps* Selby 1835.

1. *chalconotus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales; 1 ♀ Nieder-Murray; 1 ♀ Port Philipp (Victoria).
2. *histrionica* (Gould) — 1 ♂ Australien.

Genus *Leucosarcia* Gould 1843.

1. *picata* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Phapitreron* Bp. 1854.

1. *leucotis* (Temm.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Chalcophaps* Gould 1843.

1. *indica* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *javanensis* (Müll.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Java.
3. *timoriensis* Bp. — 1 ♂ Ost-Timor.
4. *moluccensis* Gray — 1 ♂ juv. Morty-Insel.
5. *chrysochloris* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.
6. *Stephani* (Puch. et Jacq.) — 1 ♂ Triton-Bai (Neu-Guinea);
1 jun. Waigiu.

Genus *Henicophaps* Gray 1861.

1. *albifrons* Gray — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Phlogoenas* [*Phlegoenas* (!)] Rehb. 1853.

1. *cruentata* (Gm.) — 1 ♂ Philippinen.

2. *jobiensis* Meyer [*Chalcophaps Margaritae* d' Alb. et Salvad.] —
1 St. Neu-Britannien.
3. *tristigmata* (Temm.) — 1 ♂ Rurukan Minahassa (Celebes).

Genus *Otidiphaps* Gould 1870.

1. *cervicalis* Ramsay — 1 ♂ Neu-Guinea.

Genus *Caloenas* Gray 1840.

1. *nicobarica* (L.) — 1 ♂ Philippinen.

Subfam. **Megapeliinae.**

Genus *Megapelia* Kaup 1836 [*Goura* Flemm. (!) 1822].

1. *coronata* (L.) — 1 ♂ Neu-Guinea; 1 ♂ jun. Waigiou.
-

Fam. Didunculidae.

Genus *Didunculus* Peale 1848.

1. *strigirostris* (Jard.) — 1 ♂ Samoa-Inseln.
-

Ordo VIII. Rasores.

Fam. Pteroclidæ.

Genus *Pterocles* Temm. 1809.

1. *arenarius* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Nordost-Africa; 1 ♂, 1 ♀ Chemorra (Algier).
2. *fasciatus* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.
3. *bicinctus* Temm. — 1 ♀ Süd-Africa.
4. *tricinctus* Sws. — 1 ♀ Senegal.
5. *Lichtensteini* Temm. — 1 ♂ Dongola; 1 ♂ Nubien.
6. *coronatus* Licht. — 1 ♂ Nubien.
7. *gutturalis* Smith — 1 ♂, 1 ♀ jun. Abessinien, 1 ♀ Zásaga (Nord-ost-Africa).
8. *variegatus* Burch. — 1 ♂, 1 ♀ Cap.

Genus *Pterygocys* Heine [*Pterochlorus* (!) Bp. 1856].

1. *alchata* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Spanien; 1 ♂ Nord-Africa; 1 ♂, 1 ♀ Constantine (Algier).
2. *namaquus* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa.
3. *exustus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Dongola; 1 ♂, 1 ♀ Nubien.
4. *senegalus* (L.) — 1 ♀ Abessinien.

Genus *Syrrhaptes* Ill. 1811.

1. *paradoxus* (Pall.) — 1 ♂ Schlesien; 1 ♀ Harz; 1 ♀ Kirgisen-
Steppe.
 2. *thibetanus* Gould — 1 ♂ Thibet.
-

Fam. Thinocoridae.

Genus *Thinocorus* Esch. 1829.

1. *Orbignyianus* (Geoffr. et Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Cordilleren von
Chile.

Genus *Attagis* Geoffr. et Less. 1820.

1. *Gayi* Geoffr. et Less. — 1 ♂, 1 ♀ Cordilleren von Chile.
 2. *chimborazensis* Scl. et Salv. — 1 ♂ Panza (Chimborazo).
-

Fam. Ortygidae.

Genus *Ortygis* Ill. 1811 [*Turnix* (!) Bon. 1790, *Tridactylus* Lacép. 1800—1801 nec *Tridactyles* Mammal. 1751].

1. *sylvatica* (Desfont.) — 2 ♂ Süd-Europa; 1 ♀ Sicilien; 1 ♀ Algier.
2. *maculosa* (Temm.) — 1 ♂ Ostindien.
3. *varia* (Lath.) — 1 ♂ Australien.
4. *pyrrhorthorax* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Areortyx* Heine [*Areoturnix* (!) Bp. 1856].

1. *pugnax* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Riouw (Malacca).
2. *ocellatus* (Scop.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Pedionomus* Gould 1840.

1. *torquatus* Gould — 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Fam. *Perdicidae*.

Subfam. *Perdicinae*.

Genus *Cryptonyx* Temm. 1815.

1. *roulroul* (Scop.) — 2 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Melanoperdix* Jerd. 1864.

1. *niger* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.

Genus *Caloperdix* Blyth 18...

1. *oculea* (Temm.) — 1 ♂ Himalaya.

Genus *Coturnix* Möhr. 1752.

1. *communis* Bonn. — 1 ♂, 1 ♀, 3 pulli Harz; 2 ♂ jun. Nil-Delta (Egypten); 1 ♂ (*C. capensis* Lcht.) Süd-Africa; 1 ♀ China.
2. *histrionica* Hartl. — 1 ♂ Insel St. Thomé (West-Africa).
3. *coromandelica* (Gm.) — 1 ♀ Ostindien.
4. *pectoralis* Gould — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂, 1 ♀ Gippsland, Port Albert (Süd-Australien).

Genus *Synoecus* Gould 1842.

1. *australis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Perdicula* Hodgs. 1837.

1. *cambayensis* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.
2. *asiatica* (Lath.) — 1 ♂ Madras.

Genus *Compsortyx* Heine [*Excalfactoria* (?) Bp. 1856].

1. *chinensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Philippinen.

Genus *Perdix* Briss. 1760.

1. *cinerea* Lath. — 1 ♂, 2 ♀, 3 *adolesc.*, 1 juv. *adultior*, 1 ♀ *rostr*
adunco, 1 ♂ jun. *pallidus*, 1 ♀ jun. *pallida*,
1 juv., 4 pulli Harz; 1 ♂ jun. *albescens*,
1 ♀ jun. *albescens* Saale.
2. *barbata* (Verr. et Des Murs) — 1 ♂ Turkestan.

Genus *Margaroperdix* Rehb. 1853.

1. *madagascariensis* (Scop.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Caccabis* Kaup 1829.

1. *saxatilis* (Meyer) — 3 ♂, 1 ♀, 1 pullus Schweiz.
2. *graeca* Bp. — 1 ♂ Smyrna; 1 ♀ Griechenland.
3. *chukar* (Gray) — 1 ♂ Ostindien.
4. *rufa* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Frankreich.

Genus *Alectoris* Kaup 1829.

1. *petrosa* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Europa; 1 ♂ Nord-Ost-Africa.

Genus *Bambusicola* Gould 1862.

1. *sonorivox* Gould — 1 ♂ Formosa.

Genus *Peloperdix* Blyth 1859.

1. *javanica* (Gm.) — 1 ♂ Java.

Genus *Arboricola* Hodgs. 1844.

1. *torqueola* (Valenc.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.
2. *rufogularis* (Hodgs.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.

Genus *Plectroperdix* Heine [*Hepburnia* (!) Bp. 1853].

1. *spadicea* (Gm.) — 1 ♀ Bengalen.

Genus *Ptilopachys* [*Ptilopachus* (!)] Sws. 1837.

1. *ventralis* (Val.) — 1 ♂ Senegal; 1 ♂ jun., 1 ♀ Keren (Abessinien).

Genus *Francolinus* Steph. 1819.

1. *vulgaris* Steph. — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♂ Hyderabad Sind (Ostindien); 1 ♀ Sukkur Sind (Ostindien).
2. *chinensis* (Osborn) — 1 ♀ Siam.

Genus *Ortygornis* Rehb. 1853.

1. *ponticerianus* (Gm.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Perdicoides* Heine 1860 [*Peliperdix* (!) Bp. 1856].

1. *Lathamii* (Hartl.) — 1 ♂ Küste von Guinea.

Genus *Chaetopus* Sws. 1837.

1. *Levaillanti* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap.
2. *afer* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
3. *Erkeli* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♀ Keren (Abessinien).
4. *Clappertoni* Childr. — 1 ♂ Abessinien.
5. *gutturalis* (Rüpp.) — 1 ♂ Keren (Abessinien).

Genus *Clamator* Blyth 1850.

1. *capensis* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa.
2. *natalensis* (Smith) — 1 ♂ jun. Süd-Africa.

Genus *Pternistes* Wagl. 1832.

1. *nudicollis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap.
2. *rubricollis* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Tetraoperdix* [*Tetraoperdix* (!)] Hodgs. 1837.

1. *nivicola* Hodgs. — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Ostindien.

Genus *Oreotetrax* Cab. 1846.

1. *himalayensis* (Gray) — 1 ♂ Himalaya; 1 ♀ Ostindien.

Subfam. Odontophorinae.

Genus *Oreortyx* Baird 1858.

1. *pictus* (Dougl.) — 1 ♂ Californien.

Genus *Lophortyx* Bp. 1838.

1. *californicus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ Californien.

Genus *Callipepla* Wagl. 1832.

1. *squamata* Vig. — 2 ♂ Mexico.

Genus *Eupsychortyx* Gould 1845.

1. *cristatus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Neu-Granada.
2. *Sonnini* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Süd-America.
3. *parvicristatus* Gould — 1 ♂, 1 ♀ Bogota; 1 ♀ Baranquilla (Neu-Granada).

Genus *Ortyx* Steph. 1819.

1. *virginianus* (L.) — 3 ♂, 3 ♀ Nord-America.

2. *cubanensis* Gould — 1 ♀ Cuba.
3. *pectoralis* Gould — 1 ♂ Xalapa.

Genus *Cyrtonyx* Gould 1845.

1. *Massenae* (Less.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Mexico.

Genus *Dendrortyx* Gould 1845.

1. *macrurus* (Jard. et Selby) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Strophiorityx* Bp. 1856.

1. *strophium* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
2. *erythrops* (Gould) — 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).
3. *lineolatus* (Lcht.) — 1 ♂ Yucatan.

Genus *Odontophorus* Vieill. 1816.

1. *guianensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *dentatus* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
3. *guttatus* Gould — 1 ♂ Guatemala.

Fam. Tetraonidae.

Genus *Tetrao* L. 1744.

1. *urogallus* L. — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 1 ♀ Russland; 1 ♂ var. Petersburg; 1 ♀ (hahnenfedrig) Russland.
2. *urogallinus* [*urogalloides* (!)] Midd. — 1 ♂ Sibirien.

3. *hybridus* L. — 2 ♂ Russland.

4. *tetrix* L. — 4 ♂, 1 ♀, 1 pullus Harz; 1 ♂ jun. Pommern; 1 ♂ jun.,
2 ♀, 1 ♀ (hahnenfedrig) Russland.

Genus *Dendragapus* Ell. 1864.

1. *obscurus* (Say) — 1 ♂ Hudsons-Bai.

Genus *Canace* Rehb. 1853.

1. *canadensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Falcipennis* Ell. 1864.

1 *Hartlaubi* Ell. — 1 ♂, 1 ♀ Stanowoi-Gebirge (Ost-Sibirien).

Genus *Pedioecetes* Baird 1858.

1. *phasianellus* (L.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Tympanuchus* Glog. 1842 [*Bonasa* (!) Steph. 1819].

1. *cupido* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Tetrastes* Keys. et Blas. 1840 [*Bonasia* (!)
Bp. 1828].

1. *bonasia* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂, 2 ♀ Russland.

2. *umbellus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Lagopus* Vieill. 1816.

1. *mutus* Leach — 5 ♂ *hiem.*, 3 ♀ *hiem.*, 3 ♂ *aest.*, 3 pulli Schweiz;
1 ♀ *aest.* Frankreich; 1 ♂, 1 ♀ *hiem.*,
Lappland.

2. *scoticus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Schottland.

3. *rupestris* (Gm.) — 1 ♂ *hiem.*, 1 ♂ jun. *aest.* Island.

4. *albus* (Gm.) — 1 ♂ *hiem.*, 1 ♀ *hiem.*, 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ *aest.* Schweiz;
1 ♂ *vere* Nyborg (Fünen).

Fam. Phasianidae.

Subfam. Numidinae

Genus *Numida* L. 1766.

1. *meleagris* L. — 2 ♂, 2 pulli Harz.
2. *mitrata* Pall. — 1 ♂ Mosambique.
3. *ptilorhyncha* Licht. — 1 ♂, 1 ♀ Abessinien.

Genus *Guttera* Wagl. 1832.

1. *plumifera* (Cass.) — Guinea-Küste.

Genus *Acryllium* Gray 1840.

1. *vulturinum* (Hardw.) — 1 ♂ Sansibar.

Genus *Agelastes* Temm. 1849.

1. *meleagrides* Temm. — 1 ♂ Goldküste.

Subfam. Phasianinae.

Genus *Gallus* L. 1744.

1. *ferrugineus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 juv. Java; 1 ♂ Philippinen; 1 ♂ var. Nepal.
2. *Sonnerati* Temm. — 2 ♂, 1 ♀ Ostindien.
3. *varius* (Shaw) — 1 ♂ Java.
4. *domesticus* Auct. — 4 ♂, 2 ♀ Deutschland.

Genus *Euplocamus* [*Euplocomus* (!)] Temm. 1815.

1. *Vieilloti* Gray — 1 ♂, 1 ♀ Malacca.

Genus *Lochmophasis* Heine [*Gallophasis* (!) Hodg. 1827].

1. *albocristatus* (Vig.) — 1 ♂, 2 ♀ Himalaya.
2. *melanotus* (Blyth) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Grammatoptilus* Rehb. 1852.

1. *lineatus* (Vig.) — 1 ♂, 1 ♀ Pegu.

Genus *Acomus* Rehb. 1848.

1. *purpureus* (Gray) — 1 ♂ Malacca.
2. *erythrophthalmus* (Raffl.) — 2 ♂ Malacca.

Genus *Gemmaeus* Wagl. 1832.

1. *nycthemerus* (L.) — 2 ♂ Deutschland.

Genus *Graphephasianus* Rehb. 1853.

1. *Soemmeringi* (Temm.) — 1 ♂ Japan.

Genus *Phasianus* L. 1748—1756.

1. *colchicus* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 pullus, 1 ♂ var. *torquata*, 1 ♂ var. *alba*, 1 ♂ et 1 ♀ var. *pallida*, 1 ♂ et 1 ♀ var. *albo-maculata*, 1 ♂ *hybridus* — Deutschland.
2. *mongolicus* Brandt — 1 ♂ Bokhara; 1 ♀ Kokand.
3. *versicolor* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀ Japan.

Genus *Thaumalea* Wagl. 1832.

1. *picta* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Deutschland.

Genus *Catreus* Cab. 1851.

1. *Wallichii* (Hardw.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Himalaya.

Genus *Syrmaticus* Wagl. 1832.

1. *Reevesi* Gray — 1 ♂ China.

Genus *Argus* Temm. 1815.

1. *giganteus* Temm. — 1 ♂, 1 ♀ Sumatra.

Subfam. Pavoninae.

Genus *Ithagenes* [*Ithaginis* (!)] Wagl. 1832.

1. *cruentus* (Hardw.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Lophotetrax* Cab. 1846.

1. *macrolophus* (Less.) — 1 ♂, 1 ♀ Himalaya.

Genus *Ceratornis* [*Ceriornis* (!)] Sws. 1837.

1. *satyra* (L.) — 2 ♂ Himalaya.
2. *melanocephala* (Gray) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ Himalaya.

Genus *Polyplectrum* Temm. 1815.

1. *Hardwicki* Gray — 1 ♂ Thibet.
2. *bicalcaratum* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Malacca.

Genus *Pavo* L. 1735.

1. *cristatus* L. — 1 ♂ *domesticus* Harz.
2. *muticus* L. — 1 ♂ Ostindien; 1 ♂ jun. Java.

Genus *Lophophorus* Temm. 1815.

1. *impeyanus* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Himalaya.

Genus *Meleagris* L. 1735.

1. *gallopavo* L. — 1 ♂ Illinois; 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.
-

Fam. Opisthocomidae.

Genus *Opisthocomus* „Hoffm.“ Ill. 1811.

1. *hoazin* (Müll.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
-

Fam. Cracidae.

Subfam. Penelopinae.

Genus *Ortalida* Merr. 1786.

1. *motmot* (L.) — 1 ♂ Surinam; 1 ♀ Guiana.
2. *ruficeps* Wagl. — 1 ♀ Babahoyo (Ecuador).

3. *vetula* Wagl. — 1 ♂ Xalapa.
4. *poliocephala* Wagl. — 1 ♂ Oaxaca (Mexico).
5. *guttata* Spix — 1 ♂ Peru.
6. *rufoterminata* Cab. — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello.

Genus *Penelopsis* Bp. 1856.

1. *albiventris* (Wagl.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *leucogastra* (Gould) — 1 juv. Escuintla (Guatemala).

Genus *Stegnolaema* Schl. 1870.

1. *Montagnei* (Bp.) — 1 ♂ Peru; 1 St. Bogota; 1 juv. Puellaro (Ecuador).

Genus *Chamaepetes* Wagl. 1832.

1. *Tschudii* Tacz. — 1 ♂ Pallatanga (Ecuador).
2. *unicolor* Salv. — 1 ♂ Costa Rica.

(Genus *Opetioptila* Sundev. 1872 [*Aburria* (!) Rehb. 1853].

1. *carunculata* (Temm.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Salpizusa* [*Salpiza* (!)] Wagl. 1832.

1. *argyrotis* (Bp.) — 2 ♂ Porto Cabello.
2. *superciliaris* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.
3. *cristata* (L.) — 1 St. Guiana.
4. *marail* (Gm.) — 1 ♂ Surinam; 2 St. Guiana.
5. *jacucaca* (Spix) — 1 ♂ Süd-America; 1 St. Porto Cabello.
6. *purpurascens* (Wagl.) — 1 ♂ Porto Cabello; 1 ♀ Pallatanga (Ecuador).

Genus *Penelope* Merr. 1786.

1. *cumanensis* (Jacq.) — 1 ♂ Guiana.
2. *pipile* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.

Genus *Oreophasis* Gray 1844.

1. *Derbyanus* Gray — 1 ♂ Coban (Guatemala).

Subfam. Cracinae.

Genus *Crax* L. 1744.

1. *alector* L. — 1 ♂ Guiana; 1 ♂ Surinam.
2. *globicera* L. — 1 ♀ Peru.
3. *globulosa* Spix — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
4. *Daubentoni* Gray — 2 ♂, 1 ♀, 1 jun. Porto Cabello.

Genus *Uragis* Gloger 1847 [*Mitu* (!) Less. 1831].

1. *mitu* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *tomentosa* (Spix) 1 ♂ Guiana.

Genus *Urax* Cuv. 1817 [*Pauxi* (!) Temm. 1815].

1. *galeata* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀, 2 jun. Porto Cabello.

Fam. Megapodidae.

Subfam. Catheturinae.

Genus *Catheturus* Sws. 1837 [*Talegalla* (!) Less. 1826].

1. *Lathamii* (Gray) — 1 ♂ Australien.

Genus *Megacephala* [*Megacephalon* (!)] Temm. 1844.

1. *maleo* Temm. — 1 ♂ Menado (Celebes).

Subfam. Megapodinae.

Genus *Megapodius* Quoy et Gaim. 1824.

1. *Freycineti* Quoy et Gaim. — 1 ♂ Gilolo.
 2. *Forsteni* Temm. — 1 ♂ Buru.
 3. *eremita* Hartl. — 1 ♂ Herzog York-Insel; 1 pullus Neu-Britannien.
 4. *tumulus* Gould — 1 ♂ Australien.
-

Fam. Crypturidae.

Genus *Trachypelmus* Cab. 1845.

1. *maior* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *subcristatus* Cab. — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Cayenne.
3. *robustus* (Scl.) — 1 ♂ Playa Vincente (Mexico).
4. *intermedius* Cab. — 1 ♂ Bogota.
5. *canus* (Wagl.) — 1 ♀ Porto Cabello.

Genus *Crypturus* Ill. 1811.

1. *cinereus* (Gm.) — 1 St. Surinam.
2. *tataupa* (Temm.) — 1 St. Brasilien.
3. *obsoletus* (Temm.) — 1 ♂ Rio Grande; 1 ♀ Montevideo.

4. *pileatus* (Bodd.) — 1 St. Guiana.
5. *meserythrus* Salv. — 1 St. Mexico.
6. *adpersus* (Temm.) — 1 St. Nord-Brasilien.

Genus *Nothocercus* Bp. 1855.

1. *Sallaei* Bp. — 1 St. Mexico.
2. *Julius* (!) Bp. — 1 ♂, 1 ♀ Bogota.
3. *Boucardi* Sallé — 1 ♀ Guatemala.
4. *variegatus* (Gm.) — 1 ♂ jun. Guiana.
5. *noctivagus* (Wied) — 1 St. San. Leopoldo (Rio Grande).

Genus *Rhynchotus* Spix 1825.

1. *rufescens* (Temm.) — 1 St. Brasilien.
2. *perdicarius* (Kittl.) — 1 adult., 1 jun. Valparaiso.

Genus *Nothura* Wagl. 1827.

1. *maculosa* (Temm.) — 1 St. Chile; 1 St. Montevideo.
-

Ordo IX. Brevipennes.

Fam. Struthionidae.

Genus *Struthio* L. 1735.

1. *camelus* L. — 1 ♂ — Africa.

Genus *Rhea* Moehr. 1752.

1. *americana* Lath. — 1 pullus Magellanstrasse.
2. *Darwini* Gould — 1 ♂ Cordilleren von Chile.
-

Fam. Hippalectryonidae.

Genus *Hippalectryo* Gloger 1842 [*Casuarus* (!) L. 1735].

1. *casuaris* (L.) — 1 ♂ jun. Ceram.
-

Fam. Apterygidae.

Genus *Apteryx* Shaw 1822.

1. *australis* Shaw — 1 ♂ Neu-Seeland.
2. *Oweni* Gould — 1 St. Neu-Seeland.
-

Ordo X. Grallatores.

Fam. Ardeidae.

Subfam. Ardeinae.

Genus *Erodias* [*Herodias* (!)] Boie 1822.

1. *albus* (L.) — 1 ♂ Sarepta; 1 ♂ vere [*Ardea Latiefii* Brehm*]
Chartum.
2. *galatea* (Mol.) — 1 ♂ Süd-America; 1 ♀ Xalapa; 1 ♂ Chile.
3. *intermedius* („Hasselt“ Wagl.) — 1 ♀ Java.

Genus *Garzetta* Kaup 1829.

1. *nivea* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Griechenland.
2. *thula* (Mol.) — 1 ♂, 1 ♀ juv. Cordilleren von Chile; 1 ♂ Guiana; 1 ♂ Caracas; 1 ♂ jun. Venezuela;
1 ♂ juv. Texas.

Genus *Leptorodius* [*Leptorodias* (!)] Ehrenb. 1828.

1. *gularis* (Bosc.) — 1 ♂; 1 ♂ var. *alba* West-Africa; 1 ♂ jun.,
1 ♀ jun. [*Ardea schistacea* Ehrenb.]
Senegal.

Genus *Hydranassa* Heine [*Demiegretta* (!) Baird 1858
nec Blyth 1846].

1. *rufa* (Bodd.) — Texas.

2. *ludoviciana* (Wils.) — 1 ♂ Texas; 1 ♂ Central-America; 1 ♀ jun. Venezuela.
3. *leucogastra* (Bodd.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Glauceros* Heine [*Florida* (!) Baird 1860].

1. *caeruleus* (L.) — 1 ♂ Xalapa; 1 ♂ (*rostrum longiore*) Guiana; 1 ♀ [*Ardea cyanopus* Gm.] Cuba; 1 ♂ var. *alba* Caracas.

Genus *Demigretta* Blyth 1846.

1. *jugularis* (Forst.) — 1 ♂ Uvea (Fidji-Inseln); 1 ♂ juv. Sumatra; 1 ♂ var. [*Ardea concolor* Blyth] Neu-Hebriden; 1 ♂ var. [*Ardea Greyi* Gray] Java.

Genus *Ardea* L. 1735.

1. *Novae Hollandiae* Lath. — 1 ♂, 1 ♂ jun. West-Australien.
2. *purpurea* L. — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ jun. Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Egypten.
3. *herodias* L. — 1 ♀ Xalapa; 1 ♂, 1 ♀ jun. Contra-Costa (Californien).
4. *melanocephala* Vig. & Childr. — 1 ♂, 1 ♀ Sennaar.
5. *pacifica* Lath. — 1 ♂ Süd-Australien.
6. *cocoi* L. — 1 ♂ Chile.
7. *cinerea* L. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 juv. Harz; 1 ♂ juv. Egypten.

Genus *Typhon* Rehb. 1853.

1. *sumatranus* (Raffl.) — 1 St. Süd-Australien.

Genus *Megerodius* Heine 1860.

1. *goliath* (Rüpp.) — 1 ♂ *vere* Sennaar.

Genus *Doriponus* Rehw. [*Agamia* (!) Rehb. 1853].

1. *agami* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Britisch-Guiana.

Genus *Bubuleus* Pucher. 1854.

1. *ibis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa; 1 ♀ Griechenland; 1 ♀ jun.
Africa.
2. *coromandus* (Bodd.) — 1 ♂ Java; 1 ♀ jun. Malacca.

Genus *Ardeola* Boie 1822.

1. *comata* (Pall.) [*Ardea ralloides* (!) Scop.] — 2 ♂ Süd-Europa.
2. *leucoptera* (Bodd.) — 1 ♂ Ostindien.
3. *speciosa* (Horsf.) — 1 ♂ *maior* Sunda-Inseln; 2 ♂ *minor* Java.
4. *bacchus* (Bp.) — 1 ♂ Amoy.

Genus *Ocniscus* Cab. 1856.

1. *virescens* (L.) — 3 ♂, 1 ♂ juv. Nord-America.
2. *striatus* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ jun. Süd-America;
1 ♂ jun. Venezuela.
3. *javanicus* (Horsf.) — 1 ♂ Ostindien.
4. *brevipes* (Ehrenb.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Nord-Ost-Africa.

Genus *Ardetta* Gray 1842.

1. *minuta* (L.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Harz; 1 ♂ Sarepta (Wolga).
2. *erythromelaena* (Vieill.) — 1 ♀ juv. Chile.
3. *cinnamomea* (Gm.) — 1 ♂ Sumatra; 1 ♂ jun. Sunda-Inseln;
1 ♂ jun. (var. *maior longirostris*) Luzon.
4. *Sturmi* (Wagl.) — 1 ♂ Africa.
5. *sinensis* (Gm.) — 1 ♂ Timor.

Genus *Dupetor* Heine [*Ardeiralla* (!) „Verr.“ Bp. 1855.
Butoroides (!) Gould 1865 nec *Butorides* (!) Blyth 1865].

1. *flavicollis* (Lath.) — 1 ♂ Sumatra.

Subfam. Botaurinae.

Genus *Butio* Rchw. 1877.

1. *goisagi* (Temm.) — 1 ♂ Japan.
2. *Kutteri* Cab. — 1 ♀ Palawan.

Genus *Botaurus* Steph. 1819.

1. *stellaris* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ Mark.
2. *poeciloptilus* (Wagl.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♀ Süd-Australien.
3. *lentiginosus* (Mont.) — 1 ♂ Californien; 1 ♂ Nord-America;
1 ♀ jun. (*minor*) Mexico.
4. *pinnatus* (Licht.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Tigrisoma* Sws. 1827.

1. *brasiliense* (L.) — 1 ♂, 2 ♀ Guiana; 1 ♂ Venezuela.
2. *Cabanisi* Heine* [Journ. Orn. 1859 p. 107] — 1 ♂ Mexico.

Genus *Zonerodius* Salv. 1882.

1. *heliosylus* (Less.) — 1 ♂ Nord-West-Küste von Neu-Guinea.

Genus *Pilerodius* Rchb. 1853.

1. *pileatus* (Bodd.) — 1 ♂ Venezuela.

Genus *Sirrycter* Heine.

1. *cyanocephalus* (Mol.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Nycterodius* Rchb. 1853.

1. *violaceus* (L.) — 1 ♂ Caracas; 1 ♂ Süd-America; 1 ♀ jun.
Porto Cabello.

Genus *Nycticorax* Steph. 1819.

1. *griseus* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Harz; 1 ♂ Ostindien;
1 ♂ jun. Java; 1 ♂ Cap; 1 ♂ juv.
Africa.
2. *Gardeni* (Gm.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ jun.
Xalapa.
3. *caledonicus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien; 1 jun. Australien.
4. *obscurus* Licht. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Chile; 1 ♂ juv. Valdivia.

Subfam. Cochleariinae.

Genus *Cochlearius* Briss. 1760.

1. *cancrophagus* (L.) — 1 ♂ Süd-America.
2. *Zeledoni* Ridgw. — 1 ♀ Xalapa; 1 ♂ jun. Mexico.

Fam. Scopidae.

Genus *Scopus* Briss. 1760.

1. *umbretta* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Ost-Africa.
-

Fam. Phoenicopteridae.

Genus *Phoenicopterus* L. 1748.

1. *roseus* Pall. — 1 ♂ Süd-Europa.
2. *erythraeus* Verr. — 1 ♂, 1 ♀ Algier.
3. *chilensis* Mol. — 1 ♂ Chile.

Fam. Ciconiidae.

Subfam. Ciconiinae.

Genus *Ciconia* L. 1735.

1. *alba* Behst. — 1 ♂ Harz.

Genus *Melanopelargus* Rehb. 1853.

1. *niger* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 jun. Harz.

Genus *Dissoura* Cab. 1850.

1. *episcopus* (Bodd.) — 1 ♂ Java.
2. *Pruyssenaeri* (v. Heugl.) — 1 ♂ jun. Sennaar.
3. *maguari* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Sphenorhynchus* Hempr. & Ehrenb. 1829.

1. *abdimi* (Licht.) — 1 ♂ aest. Chartum.

Genus *Mycteria* L. 1758.

1. *americana* L. — 1 ♀ jun. Brasilien.

Genus *Xenorhynchus* Bp. 1855.

1. *australis* (Shaw) — 1 ♂ Süd-Australien.

Genus *Leptoptilus* Less. 1831.

1. *crumenifer* (Cuv.) — 1 ♂ aest. Chartum.

Genus *Cranopelargus* Glog. 1842.

1. *javanicus* (Horsf.) — 1 ♂ Ostindien.

Subfam. Tantalinae.

Genus *Hiator* Rehb. 1852.

1. *lamelliger* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Sennaar.

Genus *Anastomus* Bonn. 1770.

1. *oscitans* (Bodd.) — 1 ♂ Madras.

Genus *Tantalus* L. 1758.

1. *loculator* L. — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa.
2. *leucocephalus* Gm. — 1 ♂ Ostindien.
3. *ibis* L. — 1 ♂ Chartum.
-

Fam. Ibididae.

Subfam. Plataleinae.

Genus *Platalea* L. 1735.

1. *leucorodia* [*leucorodia* (!)] L. — 2 ♂ Süd-Europa.
2. *flavipes* Gould — 1 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Mystrorhamphus* Heine [*Ajaja* (!) Rehb. 1853].

1. *ajaja* (L.) — 2 ♂ Chile; 1 ♂ Caracas; 1 ♂ jun., 1 juv. Xalapa.

Subfam. Ibidinae.

Genus *Theristicus* Wagl. 1832.

1. *melanopes* [*melanopis* (!)] (Gm.) — 1 ♂ jun. Chile; 1 ♀ Magellanstrasse.
2. *caudatus* (Bodd.) — 1 ♂ Guiana.

Genus *Phimosus* Wagl. 1832.

1. *infuscatus* Licht. — 1 ♂ Caracas.

Genus *Harpiprion* Wagl. 1832.

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Britisch-Guiana.

Genus *Parnopio* Heine [*Hagedashia* (!) Bp. 1855].

1. *hagedash* (Lath.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Bostrychia* Rehb. 1853.

1. *carunculata* (Rüpp.) — 1 ♂ Abessinien.

Genus *Lophotibis* Rehb. 1853.

1. *cristata* (Gm.) — 1 St. Madagascar.

Genus *Comatibis* Rehb. 1853.

1. *comata* (Ehrenb.) — 1 ♂ Algier.

Genus *Carphibis* Rehb. 1853.

1. *spenicollis* (James.) — 1 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Ibis* Cuv. 1817.

1. *melanocephala* (Lath.) — 1 ♂ Ostindien.
2. *aethiopica* (Lath.) — 2 ♂, 1 ♀ jun. Egypten.
3. *molucca* Cuv. — 1 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Plegadis* Kaup 1829.

1. *falcinellus* (L.) — 1 ♂ (*maior*) Süd-Europa; 1 ♀ (*minor*) Süd-Europa; 1 ♂ (*Scolopax guarauna* L.) Chile; 1 ♂ (*Ibis Ordi* Bp.) Texas; 1 ♂ juv. (*Ibis erythrorhyncha* Gould) Mexico.

Genus *Leucibis* Rehb. 1853.

1. *alba* (L.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Eudocimus* Wagl. 1832.

1. *ruber* (L.) — ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. (*maiores*) Guiana; 1 ♀, 1 ♀ juv. (*minores*) Caracas.

Fam. Eurypygidæ.

Genus *Eurypyga* Ill. 1811.

1. *solaris* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana.
2. *maior* Hartl. — 1 ♂ Columbien; 1 ♀ Porto Cabello.
-

Fam. Mesitidæ.

Genus *Mesites* Geoffr. St. Hil. 1838.

1. *variegata* Geoffr. St. Hil. — 1 ♀ Madagascar.
-

Fam. Rallidae.

Subfam. Parrinae.

Genus *Parra* Lath. 1790.

1. *jacana* Gm. — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Brasilien.
2. *hypomelaena* Gray — 1 ♂ Cartagena.
3. *gymnostoma* Wagl. — 1 ♂ Costa Rica.
4. *melanopyga* Scl. — 1 ♂ Santa Martha (Neu-Granada).
5. *intermedia* Bp. — 1 ♂ Venezuela.

Genus *Metopidius* Wagl. 1832.

1. *africanus* (Gm.) — 1 ♂ Mozambique; 1 ♂ blauer Fluss (Sennaar).
2. *indicus* (Lath.) — 2 ♂ Java; 1 ♀ jun. Ostindien.

Genus *Hydralector* Wagl. 1832.

1. *cristatus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Celebes.

Genus *Hydrophasianus* Wagl. 1832.

1. *chirurgus* (Scop.) — 1 ♂, 2 ♂ juv., 2 ♀ Serinagur (Ostindien).

Subfam. Heliornithinae.

Genus *Heliornis* Bonn. 1790.

1. *fulica* (Bodd.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♂ Surinam.

Subfam. Fulicinae.

Genus *Lophophalaris* Heine [*Lupha* Rehb. (!) 1853].

1. *cristata* (Gm.) — 1 ♂ Tanger; 1 ♀ Nord-Ost-Africa.

Genus *Fulica* L. 1735.

1. *atra* L. — 2 ♂, 1 ♀, 1 juv. Harz; 1 ♂ Sahara; 1 ♂ Ostindien.
2. *australis* Gould — 1 ♂ West-Australien.
3. *americana* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ jun. Nord-America.
4. *leucopyga* „Licht.“ Hartl. — 1 ♂, 1 ♀ jun. Chile.
5. *armillata* Vieill. — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
6. *ardesiaca* Tsch. — 1 St. La Paz (Valdivia).

Subfam. Gallinulinae.

Genus *Hypnoides* Rehb. 1853 [*Gallierex* (!) Blyth. 1849].

1. *cinereus* (Gm.) — 1 ♂ Philippinen; 1 ♂ juv. Sumatra; 1 ♀ jun. Siam.

Genus *Pisynolimnas* Heine [*Erythra* (!) Rehb. 1853].

1. *phoenicura* (Penn.) — 1 ♂, 1 ♀ Java; 1 ♀ jun. Borneo; 1 ♂ Nepal.

Genus *Amaurornis* Rehb. 1853.

1. *olivacea* (Meyen) — 1 ♂ Luzon.
2. *moluccana* (Wall.) — 1 ♂ Waai (Amboina).

Genus *Hydroicca* Cab. 1847.

1. *melanops* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Gallinula* Briss. 1760.

1. *chloropus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun., 2 pulli Harz; 1 ♂, 1 ♀ Africa; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Java; 1 ♀ jun. Serinagur (Ostindien).
2. *tenebrosa* Gould — 1 ♂ Australien.
3. *frontata* Wall. — 1 ♂ Celebes.
4. *galeata* Licht. — 1 ♂ Süd-America; 1 ♀ Guiana; 1 ♀ Mexico; 1 ♂ var. *multo maior* Peru.
5. *angulata* Sund. — 1 ♂ Insel St. Thomé (West-Africa).

Genus *Tribonyx* Du Bus 1837.

1. *ventralis* Gould — 1 St. Süd-Australien.

Genus *Jonornis* Rehb. 1853.

1. *martinicus* (L.) — 1 ♂ Guiana; 1 juv. Süd-America; 1 ♀ Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Hydrionia* Hartl. 1857.

1. *Alleni* (Thomps.) — 1 ♂ Gabon (West-Africa).

Genus *Caesarornis* Rehb. 1853.

1. *poliocephalus* (Lath.) — 1 ♂ Philippinen.

Genus *Porphyrio* Briss. 1760.

1. *veterum* Gm. — 1 ♂, 1 ♀ juv. Süd-Europa; 1 ♂ Sicilien.
2. *neglectus* Schleg. — 2 ♂, 1 ♀ Ostindien.
3. *melanotus* Temm. — ♂ Neu-Süd-Wales.
4. *bellus* Gould — 1 ♂ West-Australien.
5. *smaragdonotus* Temm. — 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♂ Menzaleh See (Egypten).
6. *indicus* Horsf. — 2 ♂ Java.

Subfam. Rallinae.

Genus *Rallicula* Schleg. 1871.

1. *leucospila* (Salv.) — 1 St. Arfak (Neu-Guinea).

Genus *Sarothrura* Heine [*Corethura* Rehb. 1853
nec Gray 1846].

1. *dimidiata* (Temm.) — 2 ♂ Süd-Africa.

Genus *Phalaridium* Kaup 1829 [*Zapornia* (!) Leach 1816].

1. *parvum* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♂ juv. Galizien; 1 ♀ Harz; 1 ♂, 1 ♀ Krim.
2. *Bailloni* (Vieill.) — 1 ♀ Süd-Frankreich.
3. *tabuense* (Gm.) — 1 ♂ West-Australien.
4. *quadristrigatum* (Horsf.) (*Porphyrio cinereus* Vieill. nec *Rallus cinereus* Vieill.) — 1 ♀ (*minor*) Java; 1 ♂ (*maior*) Philippinen; 1 jun. Celebes.

Genus *Limnocorax* Peters 1854.

1. *niger* (Gm.) — 1 ♂ Gabon (West-Africa).

Genus *Ortygometra* L. 1744.

1. *porzana* L. — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ Alexandrien (Egypten).
2. *Novae Hollandiae* Cuv. — 1 ♂ West-Australien.
3. *palustris* (Gould) — 1 ♀ Philippinen.

Genus *Crex* Behst. 1803.

1. *pratensis* Behst. [*Rallus crex* L.] — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 2 ♀ jun. Harz.

Genus *Creciscus* Cab. 1856.

1. *cinereus* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Ortygops* Heine [*Coturnicops* (!) Bp. 1854].

1. *noveboracensis* (Gm.) — 1 St. Nord-America.

Genus *Donacophilus* Rehw. [*Laterirallus* (!) Bp. 1856].

1. *melanocephalus* (Vieill.) — 1 ♀ Brasilien.

Genus *Erythrolimnas* Heine [*Rufirallus* (!) Bp. 1856].

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂, 1 ♂ jun. Surinam.
2. *rubra* (Scl. & Salv.) — 1 ♂ Belize (Honduras).
3. *Boeckii* (Bp.) — 1 ♂ Bolivien.

Genus *Galecolimnas* Heine [*Mustellirallus* (!) Bp. 1856].

1. *carolinus* (L.) — 1 ♂ juv. Nord-America; 1 ♂ Mexico.
2. *albicollis* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Guiana.

Genus *Ortygarchus* Cab. 1848 [*Aramides* (!) Pucher. 1845].

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Santa Martha (Neu-Granada; 1 ♂ *maior* Porto Cabello; 1 ♀ *maior* Paraguay.
2. *axillaris* (Lawr.) — 1 ♂ Guiana; 1 ♀ Porto Cabello.
3. *saracura* (Spix) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Rio Grande.

Genus *Limnopardalis* Gundl. 1856 [*Pardirallus* (!) Bp. 1856].

1. *elegans* (Aud.) — 1 ♂ Texas; 1 ♀ Staat Neu-York; 1 St. Central-America.
2. *longirostris* (Bodd.) — 1 ♂ Guiana.

3. *cinerea* (Vieill.) — 1 ♂ Peru.
4. *sempiolumbea* (Scl.) — 1 St. Bogota.

Genus *Ortygonax* Heine.

1. *rhytirhynchus* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Chile; 1 ♂ Rio Grande.
2. *nigricans* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ (*minores*) Süd-America; 1 ♂ (*maior*) Brasilien.

Genus *Rallus* Briss. 1760.

1. *aquaticus* L. — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *caerulescens* Gm. — 1 St. Cap.
3. *Plateni* W. Blas.* — 1 ♂ Minahassa (Celebes).

Genus *Notherodius* Wagl. 1827 [*Aramus* (!) Vieill. 1816].

1. *scolopaceus* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien.
2. *holostictus* Cab. — 1 ♂ Mexico; 1 ♀ Cuba.

Genus *Rallina* Rehb. 1853.

1. *fasciata* (Raffl.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. (*minores*) Java; 1 ♂ (*maior*) Luzon.

Genus *Limnobaenus* Sund. 1872.

1. *fusca* (L.) — 1 ♂ Philippinen; 1 St. Siam.
2. *amauroptera* (Blyth) — 1 ♂ Ostindien; 1 ♀ jun. Sumatra.

Genus *Donacias* Heine [*Lewinia* (!) Bp. 1854].

1. *brachypus* (Sws.) — 1 ♂ West-Australien.

Genus *Hypotaenidia* Rehb. 1853.

1. *torquata* (L.) — 1 ♂ (*rostro brevior*) Luzon 1 ♀ (*rostro longior*) Philippinen.

2. *philippensis* (L.) — 1 ♀ Philippinen; 1 ♂ Neu-Süd-Wales; 1 ♂ Gippsland, Port Albert (Victoria); 1 ♂ West-Australien.
3. *Forsteri* Hartl. — 1 St. Upolu (Samoa-Inseln).
4. *striata* (L.) — 1 ♂ Luzon; 1 ♂ jun. Philippinen.

Genus *Biensis* Puch. 1845.

1. *madagascariensis* (Verr.) — 1 St. Madagascar.

Genus *Calamodromus* Rehw. [*Rougetius* (!) Bp. 1856].

1. *Rougeti* (Guér.) — 1 ♂ Abessinien.
2. *Bernieri* (Bp.) — 1 ♂ Madagascar.

Genus *Ocydromus* Wagl. 1830.

1. *australis* (Sparrm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.
2. *nigricans* Buller — 1 ♂ Neu-Seeland.

Fam. Palamedeidae.

Genus *Palamedea* L. 1766.

1. *cornuta* L. — 1 ♂ Porto Cabello; 1 ♂ jun. Brasilien.

Genus *Chauma* Ill. 1811.

1. *chavaria* (L.) — 1 ♂ Paraguay.

Fam. Dicholophidae.

Genus *Dicholophus* Ill. 1811.

1. *cristatus* (L.) — 1 ♂ Brasilien.
-

Fam. Psophiidae.

Genus *Psophia* L. 1758.

1. *crepitans* L. — 1 ♂ Surinam; 1 ♀ Britisch-Guiana.
-

Fam. Gruidae.

Genus *Grus* L. 1735.

1. *communis* Bechst. — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *canadensis* L. — 1 ♂ Texas.
3. *leucogeranus* Pall. — 1 ♀ Amur.
4. *antigone* L. — 1 ♂ Cochinchina.

Genus *Anthropoides* Vieill. 1816.

1. *ringo* (L.) — 1 ♂ Sennaar; 1 ♂ Nord-Ost-Africa; 1 pullus Africa.

Genus *Tetrapteryx* Thunb. 1818.

1. *paradisea* (Leht.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Geranarchus* Glog. 1842 [*Balearica* (!) Briss. 1760].

1. *pavoninus* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Abessinien.
-

Fam. Otididae.

Genus *Otis* L. 1735.

1. *tarda* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 pullus Harz.

Genus *Tetrax* Leach 1816.

1. *campestris* Leach (*Otis tetrax* L.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa.

Genus *Eupodotis* Less. 1839.

1. *Ludwigi* (Rüpp.) — 1 ♂ Süd-Africa.
2. *caffra* (Leht.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Lissotis* Rehb. 1848.

1. *melanogastra* (Rüpp.) — 1 ♂ Abessinien.
2. *senegalensis* (Vieill.) — 1 ♂ West-Africa.

Genus *Compsotis* Heine [*Afrotis* (!) Bp 1854].

1. *afra* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Trachelotis* Rehb. 1848.

1. *scolopacea* (Temm.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Comatotis* Rehb. 1848.

1. *aurita* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Nepal.

Genus *Chlamydotis* Less. 1839.

1. *houbara* (Gm.) — 1 ♂ Nord-Ost-Africa.

— —

Fam. Scolopacidae.

Subfam. Limosinae.

Genus *Numenius* L. 1746.

1. *arquatus* L. — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *tenuirostris* Vieill. — 1 St. Cattaro (Dalmatien); 1 St. Algier.
3. *cyanopus* Vieill. — 1 ♂ Australien.
4. *madagascariensis* Gm. — 1 ♂ Africa; 1 ♀ Sumatra.
5. *longirostris* Wils. — 1 ♂ Central-America; 1 ♀ Texas.
6. *hudsonicus* Lath. — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
7. *uropygialis* Gould — 1 St. Süd-Australien.

Genus *Phaeopus* Cuv. 1817.

1. *minor* (Leach) (*Numenius phaeopus* L.) — 1 ♂ jun., 1 St. Harz.
2. *borealis* (Forst.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Limosa* Briss. 1760.

1. *aegocephala* (L.) — 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ *aest.*, 1 ♀ *vere* Harz; 1 ♀ Pommern; 1 ♂ jun. Mansfelder Salz-See; 1 ♂, 1 ♀ Menzaleh-See (Egypten).
2. *lapponica* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Waranger Fjord (Lappland); 1 ♂ Harz; 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Mansfelder Salz-See.
3. *Baueri* Naum. (*L. leucopygialis* Gould) — 1 St. Neu-Seeland.
4. *fedoa* (L.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Mexico.
5. *hudsonia* (Lath.) — 1 St. Mexico.

Genus *Rhynchosimus* Heine [*Terekia* (!) Bp. 1838;
Simorhynchus Keys. & Bl. 1840 nec Merr. 1819].

1. *cinereus* (Göld.) — 1 ♂ *maior* Archangel; 1 ♂ *maior* Sibirien;
1 ♀ *minor* Sibirien; 1 ♀ *minor* Java.

Subfam. Totaninae.

Genus *Tryngites* Cab. 1856.

1. *rufescens* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Venezuela.

Genus *Actiturus* Bp. 1832 [*Bartramia* (!) Less. 1833].

1. *Bartramius* (Wils.) — 1 ♂, 1 ♀ Central-America.

Genus *Tryngodes* [*Tryngoides* (!)] Bp. 1850 [*Actitis* Boie 1822
nec Ill. 1811].

1. *hypoleuca* (L.) — 1 ♂ *aest.*, 2 ♀ *hiem.* Harz; 1 ♂ *hiem.* Venezuela; 1 ♀ *aest.* Nord-America; 1 St.

Mexico; 1 ♀ Morty-Insel; 1 ♂ (*T. Schlegeli* Bp.) Java; 1 St. (var. *rostro longiore*) Darze Lahul (Ostindien).

2. *macularia* (L.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Symphemia* Rafinq. 1815.

1. *semipalmata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Central-América.

Genus *Glottis* Koch 1816.

1. *canescens* (Gm.) (*Totanus glottis* Bechst. nec L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 St. Weser; 1 ♂ Süd-Africa; 1 ♀ Nord-Ost-Africa; 1 ♂ Sennaar; 1 ♂ *rostro longiore* Java.

Genus *Erythroscelus* Kaup 1829.

1. *fuscus* (L.) — 1 ♂ *aest.*, 4 jun. *autumno* Harz.

Genus *Aegialodes* Heine [*Gambetta* (!) Kaup 1829 nec Koch 1816].

1. *calidris* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 pullus Insel Borkum; 1 ♂, 1 ♀ Java.

2. *melanoleucus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 St. *alis tarsoque multo maioribus* Chile.

3. *vociferans* (Wils.) — 1 St. Texas.

4. *flavipes* (Gm.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ *pedibus maioribus* Guiana; 1 ♀ Grönland.

Genus *Heteroscelus* Baird 1858.

1. *incanus* (Gm.) — 1 ♂ Kamtschatka; 1 ♂ jun. Java; 1 ♀ Timor.

2. *oceanicus* (Less.) — 1 St. Savoi (Samoa-Inseln).

Genus *Rhyacophilus* Kaup 1829.

1. *glareola* (L.) — 2 ♂, 2 ♀ Harz; 1 pullus Pommern; 1 ♂ *rostro longiore* Africa; 1 ♂, 1 ♀ (*Totanus affinis* Horsf.) Java.

Genus *Helodromas* Kaup 1829.

1. *ochropus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 pullus Pommern; 1 St. Schweiz; 1 ♀ Archangel; 1 St. (*Totanus leucurus* Gray) nördliches Ostindien.

Genus *Totanus* Behst. 1803.

1. *stagnatilis* Behst. — 1 ♂ Süd-Frankreich; 1 ♀ England; 1 ♀ Cairo.

Subfam. Tringinae.

Genus *Calidris* Cuvier 1799—1800.

1. *arenaria* (L.) 2 jun. Harz; 1 ad. Guiana; 1 ad. Mexico; 1 ad. Java.

Genus *Ereunetes* Ill. 1811.

1. *petrificatus* Ill. — 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♀ Staat Neu-York;
1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello.
2. *Mauri* Bp. — 1 ♂ *rostro longiore* Guiana.
3. *occidentalis* Lawr. — 1 St. Unter-Californien.

Genus *Ancylochilus* Kaup 1829.

1. *subarquatus* (Güld.) — 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ *hieme* Mansfelder Salz-See;
1 ♂ jun. *hieme*, 1 ♀ *hieme* Harz; 1 ♂ *aest.*
collo albo Java.

Genus *Limonites* Kaup 1829.

1. *Temmincki* (Leisl.) — 1 ♂ Archangel; 1 ♀ Pommern.
2. *minutillus* (Vieill.) — 1 ♂ *hieme* Caracas; 1 ♀ *hieme* Bahia;
1 ♂ *vere* Porto-Cabello; 1 ♀ *vere* Venezuela; 1 ♀ *vere* Süd-America.

Genus *Actodromas* Kaup 1829.

1. *minuta* (Leisl.) — 1 ♂, 1 ♀ *hieme*, 1 juv. Harz; 1 ♀ Mansfelder Salz-See; 1 St. *aest.* Schweiz.
2. *albescens* (Temm.) — 1 ♂ Australien.

Genus *Schoeniclus* Moehr. 1752.

1. *cinclus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 2 ♂ jun. *hieme*, 2 juv. Harz; 1 ♂ Pommern.
2. *Schinzi* (Brehm) — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Mansfelder Salz-See; 1 ♂ Pommern.

Genus *Heteropygia* Coues 1861.

1. *Bairdi* (Coues) (*Tringa melanota* (!) Vieill.) — 1 St. Nord-America.

Genus *Limnocinclus* Gould 1865.

1. *maculatus* (Vieill.) — 1 ♂ Carlisle (Nord-America); 1 ♀ Mexico.
2. *acuminatus* (Horsf.) — 1 St. Australien.

Genus *Limicola* Koch 1816.

1. *platyrhyncha* (Temm.) (*L. pygmaea* Koch) — 1 ♂ Mansfelder Salz-See; 1 ♀ Pommern.

Genus *Actia* Heine [*Arquatella* (!) Baird 1858].

1. *maritima* (Brünn.) — 1 ♂ *hieme*, 1 ♀ *aest.* Island; 1 ♂ *hieme*, 1 ♀ *aest.* Grönland.

Genus *Tringa* L. 1735.

1. *canutus* L. (*T. grisea* et *islandica* Gm.) — 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ *aest.*
Pommern; 1 ♂ juv. Altmark; 1 ♀ juv.
Harz; 1 ♂, 1 ♀ Lappland; 1 ♂ *aest.*,
1 ♀ *hieme* Java.
2. *crassirostris* Temm. et Schleg. — 1 ♂ Japan.

Genus *Philomachus* Möhr. 1752.

1. *pugnax* (L.) — 2 ♂ *aest.*, 2 ♀, 1 ♀ juv. Harz; 1 ♀ juv. Mans-
felder Salz-See; 7 ♂ (*diversi*) Holland
1 ♂ juv. *vere* Egypten; 1 pull. Insel
Borkum.

Genus *Micropalama* Baird 1858.

1. *himantopus* (Bp.) — 1 ♂, Babahoyo (Ecuador).

Subfam. Scolopacinae.

Genus *Rhynchaea* Cuv. 1817.

1. *capensis* (L.) — 1 ♂ Sennaar.
2. *bengalensis* (L.) — 2 ♂ Manilla; 1 juv. Java.
3. *semicollaris* (Vieill.) — 1 ad., 1 juv. Chile.

Genus *Philohela* Gray 1841.

1. *minor* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Scolopax* Briss. 1760

1. *rusticola* L. — 1 ♂, 2 ♀, 1 pullus Harz.

Genus *Limnocryptes* Kaup 1829.

1. *gallinula* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.

Genus *Spilura* Bp. 1856.

1. *stenura* (Bp.) — 1 St. Java; 1 St. Ostindien.
2. *solitaria* (Hodgs.) — 1 ♂ Nepal.

Genus *Nemoricola* Hodgs. 1837.

1. *nipalensis* Hodgs. — 1 St. Himalaya.

Genus *Gallinago* Leach 1816.

1. *maior* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *caelestis* (Frenzel) — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
3. *macrodoctyla* Bp. — 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♀ Abessinien.
4. *australis* (Lath.) — 1 St. Queensland.
5. *Wilsoni* (Temm.) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Mexico.
6. *Paraguaiae* (Vieill.) — 1 ♂ Chile.
7. *nobilis* ScL. — 1 St. Bogota; 1 ♂ Columbien.
8. *frenata* (Wied). — 2 ♂, 1 ♀ Brasilien; 1 ♂ Chile.
9. *gigantea* (Temm.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Macrorhamphus* Leach 1831.

1. *griseus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Schweden; 1 ♂ Guiana.
2. *scolopaceus* (Say) — 1 St. Unter-Californien.

Subfam. Phalaropodinae.

Genus *Steganopus* Vieill. 1818.

1. *Wilsoni* (Sabine) — 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Mexico.

Genus *Phalaropus* Briss. 1760.

1. *hyperboreus* (L.) — 1 ♀ Mansfelder Salz-See; 2 ♂, 1 ♀ juv. Lappland; 1 ♂ jun. Labrador.

Genus *Crymophilus* Vieill. 1816.

1. *fulcarius* (L.) — 1 ♂ aest. Island; 1 ♂ aest., 1 ♀ jun. hieme Chile; 2 ♀ aest., 1 ♂ hieme Grönland.

Subfam. Himantopodinae.

Genus *Himantopus* Barr. 1745.

1. *candidus* Bonn. — 1 ♂ Nord-Europa; 1 ♂, 1 ♀ Chartum; 2 ♀ Nildelta (Egypten).
2. *nigricollis* (Vieill.) — 2 St. *collo pantulum albo* Texas; 1 St. *collo valde albo* Guiana; 1 St. *collo fere nigro* Columbien.
3. *leucocephalus* Gould — 1 ♂ Australien.
4. *Novae Zeelandiae* Gould — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Recurvirostra* L. 1744.

1. *avocetta* L. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Harz; 1 ♀ juv. Pommern; 1 ♀ Egypten.
2. *americana* Gm. — 1 ♀ Californien.
3. *rubricollis* Temm. — 1 ♂ Australien.

Fam. Dromadidae.

Genus *Dromas* Payk. 1805.

1. *ardeola* Payk. — 1 ♂ Arabien; 1 ♀ N.-O.-Africa.

Fam. Charadriidae.

Subfam. Oedieneminae.

Genus *Pseudops* Hodgs. 1841 [*Carvanaca* (!) Hodgs. 1836].

1. *recurvirostris* (Cuv.) — 1 ♂ Madras.

Genus *Orthorhamphus* Salv. 1874 [*Esacus* (!) Less. 1831].

1. *magnirostris* (Geoffr.) — 1 ♂ Molukken; 1 ♀ Ekor (Halmahera).

Genus *Burhinus* Ill. 1811.

1. *grallarius* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. West-Australien.

Genus *Oedienemus* Temm. 1815.

1. *scolopax* Gm. — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Africa; 1 ♂ jun. Abessinien; 1 ♀ jun. Cairo (Egypten).
2. *senegalensis* Sws. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Abessinien.
3. *capensis* Leht. — 1 ♂ Süd-Africa.
4. *affinis* Rüpp. — 1 ♂ Abessinien.

Subfam. Charadriinae.

Genus *Vanellus* L. 1735.

1. *vulgaris* Bechst. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀, 1 ♀ juv.,
2 pulli Harz.

Genus *Belonopterus* Rehb. 1853.

1. *cayennensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 ♂ Brasilien; 1 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Ptiloscelis* [*Ptiloscelys* (!)] Bp. 1856.

1. *resplendens* (Tsch.) 1 ♂ Peru.

Genus *Chaetusia* [*Chettusia* (!)] Bp. 1839.

1. *gregaria* (Pall.) — 1 ♂ Süd-Russland; 1 juv., 1 ♀ blauer Fluss
(Sennaar).
2. *flavipes* (Sav.) — 1 ♀ Fagum, Möris-See (Egypten).

Genus *Lobibyx* Heine [*Lobivanellus* Rehb. 1853
nec Strickl. 1847].

1. *lobatus* (Lath.) — 2 ♂ Neu-Süd-Wales.
2. *miles* (Bodd.) — 1 ♀ Nord-Australien.
3. *senegalus* (L.) — 1 St. weisser Fluss (Africa).

Genus *Lobivanellus* Strickl. 1841.

1. *indicus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ juv. Ostindien.
2. *atronuchalis* (Blyth) — 1 St. Insel Salanga (Siam).
3. *lateralis* (Smith) — 1 ♂ Zambesi (Damara-Land).

Genus *Erythrogonys* Gould 1837.

1. *cinctus* Gould — 1 ♂ Neu-Süd-Wales.

Genus *Hoplopterus* Bp. 1831.

1. *spinosus* (L.) — 1 ♂ Cypern; 1 ♀ Abessinien.
2. *speciosus* (Wagl.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Hoploxypterus* Bp. 1856.

1. *cayanus* (Lath.) — 1 ♂ jun. Guiana; 2 ad. Porto Cabello.

Genus *Dilobus* Heine [*Lobipluvia* (!) Bp. 1856].

1. *malabaricus* (Bodd.) — 1 ♂ Pondichery.

Genus *Sarciophorus* Rehb. 1853.

1. *tectus* (Bodd.) — 1 ♂ Sennaar; 1 ♀ Abessinien.
2. *pectoralis* (Cuv.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Stephanibyx* Rehb. 1853.

1. *coronatus* (Gm.) — 1 ♂ Cap; 1 ♀ Süd-Africa.
2. *melanopterus* (Rüpp.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. N.-O.-Africa.

Genus *Squatarola* Leach 1816.

1. *helvetica* (L.) — 3 ♂, 1 ♂ jun. *aestate*, 3 ♀ *hieme* Harz.

Genus *Charadrius* L. 1735.

1. *pluvialis* L. — 2 ♂, 1 ♀ *aestate* Archangel; 1 ♂ *aestate*; 1 ♂, 1 ♀ *hieme* Harz; 1 pullus Pommern.
2. *fulvus* Gm. — 1 St. [*Ch. longipes* Temm.] Upolu (Samoa-Inseln); 1 ♂ *hieme*, 1 ♂ *vere* [*Ch. xanthocheilos* Wagl.] Java.

Genus *Oxyechus* Rehb. 1853.

1. *vocifer* (L.) — 2 ♂ Nord-America; 1 ♂ Mexico.

Genus *Hyetoceryx* Heine [*Pluviorhynchus* (!) Bp. 1856].

1. *obscurus* (Gm.) — 1 ♂ Neu-Seeland; 1 ♀ Neu-Irland.

Genus *Eudromias* Brehm 1831.

1. *morinellus* (L.) — 2 ♂ Lappland; 1 ♂ jun., 2 ♂ juv., 1 juv.,
1 ♀ Harz.
2. *australis* (Gould) — 1 St. Süd-Australien.
3. *asiaticus* (Pall.) — 1 jun. Süd-Europa.
4. *veredus* (Gould) — 1 ♀ P. Princessa (Palawan).

Genus *Cirrepidesmus* Bp. 1856.

1. *Geoffroyi* (Wagl.) — 1 ♂ Abessinien.
2. *mongolicus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Java.

Genus *Zonibyx* Rehb. 1853.

1. *modestus* (Lcht.) — 1 ♂ Falklands-Inseln; 1 ♂ jun. Chile.

Genus *Aegialitis* Boie 1822.

1. *hiaticula* (L.) — 1 ♂ Harz; 2 ♂, 1 ♀ Pommern.
2. *euronica* (Gm.) — 3 ♂, 1 pullus Harz; 1 ♀ Egypten; 1 ♂ Java.
3. *dubia* (Scop.) — 1 ♀ P. Princessa (Palawan).
4. *placida* (Gray) — 1 St. Jokuhama (Japan).
5. *tricollaris* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♀ Süd-Africa; 1 ♂ Tafelbai (Süd-Africa).
6. *monachus* (Geoffr.) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.
7. *Peroni* („Müll. Temm.“ Schleg.) — 1 St. Labuan (Borneo).

Genus *Aegialeus* Rehb. 1853.

1. *semipalmatus* (Bp.) — 1 ♂, 1 ♀ Labrador; 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *melodus* (Ord.) — 1 ♀ jun. Nord-America.

Genus *Ochthodromus* Rehb. 1853.

1. *Wilsonius* (Ord.) — 1 ♂, 1 ♀ Cuba; 1 ♂, 1 ♀ Columbien.
2. *bicinctus* (Jard. & Selby) — 1 ♂ Vandiemens-Land; 1 St. Neu-seeland.

Genus *Leucopolius* Bp. 1856.

1. *marginatus* (Vieill.) — 1 ♂ Cap.
2. *pecuarius* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Egypten.
3. *collaris* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Venezuela; 1 ♂ Pernambuco (Brasilien).
4. *tenellus* (Heugl.) — 1 ♂ Marovare (Madagascar).

Genus *Aegialophilus* Gould 1865.

1. *cantianus* (Lath.) — 3 ♂, 1 ♀ Pommern; 2 ♀, 1 pullus Harz.
2. *ruficapillus* (Temm.) — 1 ♂ West-Australien; 1 ♀ Australien.

Subfam. Haematopodinae.

Genus *Haematopus* L. 1735.

1. *ostralegus* L. — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 ♀ jun. Pommern; 1 pullus Borkum.
2. *palliatu*s Temm. — 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Chile.
3. *longirostris* Vieill. — 1 ♂ West-Australien; 1 ♀ Neu-Seeland.

Genus *Melanibyx* Rehb. 1853.

1. *fuliginosus* (Gould) — 1 ♂ West-Australien.
2. *capensis* (Licht.) — 1 ♂ Kaffernland.
3. *ater* (Vieill.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Chile; 1 St. (*minor*) Nord-Californien.
4. *niger* (Pall.) — 1 ♂ Insel Kadjak (Aleuten).

Subfam. Strepsilainae.

Genus *Strepsilas* Ill. 1811.

1. *interpres* (L.) — 1 ♀ Mansfelder Salzsee; 1 ♀ juv. Pommern;
1 ♂ Menzaleh-See (Egypten); 1 ♀ jun.
America; 1 ♂ Java; 1 ♀ Ostindien;
1 ♂ Salavatty.
2. *melanocephalus* Vig. — 1 St. Unter-Californien.

Fam. Glareolidae.

Subfam. Glareolinae.

Genus *Glareola* Briss. 1760.

1. *pratincta* (L.) 1 ♂ Süd-Europa; 1 jun. Harz; 1 ♂ jun. Syrien;
1 ♂, 1 ♀ Constantine (Algier).
2. *melanoptera* (Pall.) — 1 ♂ juv. Nord-Europa; 1 ♂ jun. Russland;
1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.
3. *orientalis* Leach — 1 ♂, 1 ♀ Java.

Genus *Rhimphalea* Heine [*Stiltia* (!)] Bp. 1854.

1. *isabella* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Australien.

Genus *Galactochrysea* [*Galachrysia* (!)] Bp. 1854].

1. *lactea* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ Ostindien.

Subfam. Tachydrominae.

Genus *Hyas* Glog. 1827 [*Pluvianus* (!) Vieill. 1816].

1. *aegyptius* (L.) — 1 ♂ Cordofan; 1 ♀ Sennaar.

Genus *Tachydromus* Ill. 1811 [*Cursorius* (!) Lath. 1790].

1. *gallicus* (Gm.) — 1 ♂ jun. Süd-Europa; 1 ♂, 1 ♀ jun. Egypten.
2. *rufus* (Gould) — 1 ♀ Süd-Africa.
3. *senegalensis* (Lcht.) — 1 ♂ Africa; 1 ♂ Gabun (West-Africa).
4. *coromandelicus* (Gm.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Rhinoptilus* Strickl. 1840.

1. *bicinctus* (Temm.) — 1 ♂ Cap.

Genus *Chalcopterus* Rehb. 1853.

1. *Temmincki* Rehb. — ♀ blauer Fluss (Sennaar).

Fam. Chionididae.

Genus *Chionis* Forst. 1788.

1. *alba* Gm. — 1 ♂ Falklands-Inseln.
2. *minor* Hartl. — 1 ♂ Kerguelens-Land.

Ordo XI. Natatores.

Fam. Cygnidae.

Genus *Cygnus* L. 1735.

1. *olor* (Gm.) — 1 ♂ Halle a/S.
2. *nigricollis* (Gm.) — 1 ♂ Montevideo; 1 ♀ Chile.

Genus *Olor* Wagl. 1832.

1. *cygnus* (L.) — 1 ♀ jun. Harz.
2. *americanus* (Sharpe) — 1 ♂, 1 ♀ St. San Joaquin-Fluss (Californien).

Genus *Chenopsis* Wagl. 1832.

1. *atrata* (Lath.) — 1 ♀ jun. Neu-Süd-Wales.

Genus *Pseudocygnus* Sundev. 1872 [*Coscoroba* (!) Rehb. 1853.
Pseudolor (!) Gray 1855].

1. *coscoroba* (Mol.) — 1 ♂, 1 pullus Chile.

Fam. Anseridae.

Genus *Choristopus* Eyt. 1838 [*Anseranas* (!) Less. 1828].

1. *melanoleucus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ Australien.

Genus *Plectropterus* Leach 1824.

1. *gambensis* (L.) — 1 ♀ Chartum (Egypten).

Genus *Chenalopex* Steph. 1823.

1. *aegyptiaca* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Chartum (Egypten).

Genus *Chenonetta* Brandt 1836.

1. *jubata* (Spix) — 1 ♂ jun. Süd-America.

Genus *Cereopsis* Lath. 1799.

1. *novae Hollandiae* Lath. — 1 ♂ Australien.

Genus *Anser* Briss. 1760.

1. *cinereus* Meyer — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *grandis* Gm. — 1 ♂ Ost-Sibirien.
3. *segetum* L. — 1 ♂ Pommern; 1 ♀ Mecklenburg.
4. *arvensis* Brehm — 1 ♂ Pommern; 1 ♀ Altmark; 1 ♂ Harz.
5. *albifrons* Scop. — 1 ♂ Grönland; 1 ♂ Holland; 1 ♀ Nord-Deutschland; 1 ♂ (*A. Gambeli* Hartl.) Alabama (Nord-America).
6. *intermedius* Naum. — 1 ♂ Unter-Egypten.
7. *finmarchicus* Gunn. [*A. erythropus* L.] — 1 ♂, 1 ♀ Lappland.

Genus *Eulabeia* Rehb. 1853.

1. *indica* (Gm.) — 1 ♂ jun. Pondichery.

Genus *Chen* Boie 1822.

1. *caerulescens* (L.) — 1 ♂ jun. Hudsonsbai.
2. *hyperboreus* (Pall.) — 1 jun. Nord-America.

Genus *Exanthemops* Elliot 1868.

1. *Rossi* (Baird) — 1 ♂ San Francisco (Californien); 1 ♀ San Joaquim-Thal (Californien).

Genus *Cynopsis* [*Cygnopsis* (!)] Brandt 1836.

1. *cynoides* [*cygnoides* (!)] (L.) — 1 ♂ Ostindien.

Genus *Brenthus* Sund. 1872 [*Brenta* (!) Scop. 1769.
Berniela (!) Steph. 1824].

1. *berniela* (L.) — 3 ♂, 2 ♀ Pommern; 1 ♀ Holland.

Genus *Chlamydochen* [*Chlamidochen* (!)] Bp. 1854.

1. *jubatus* (Lath.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien; 1 ♂, 1 ♀ Neu-Süd-Wales.

Genus *Leucoblepharon* Baird 1858.

1. *canadense* (L.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Leucopareia* Rehb. 1853.

1. *leucopsis* (Behst.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-Europa.
2. *sandvicensis* (Vig.) — 1 ♂ Sandwichs-Inseln.

Genus *Ptocas* Heine [*Rufibrenta* (!) Bp. 1856].

1. *ruficollis* (Pall.) — 1 ♂ Nord-Asien.

Genus *Cyanochen* Hartl. 1856.

1. *cyanopterus* Rüpp. — 1 ♂ Woggera (Nord-Ost-Africa).

Genus *Taenidiesthes* [*Taenidiestes* (!)] Rehb. 1853.

1. *antarctica* (Gm.) — 1 ♀ jun. Magellan-Strasse.

Genus *Chloëphaga* Eyt. 1838.

1. *magellanica* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.

2. *dispar* (Phil.) — 1 ♂ Chile.
3. *melanoptera* Eyt. — 1 ♂, 1 ♀ Chile; 1 ♂ Peru.
4. *poliocephala* Scl. — 1 ♂ — ?
5. *rubidiceps* Scl. — 1 ♂ Falklands-Inseln.
6. *canagica* (Sewart) — 1 ♂ Unalashka.

Genus *Vulpanser* Keys. & Blas. 1840 [*Tadorna* (!)
Leach 1824].

1. *tadorna* (L.) — 2 ♂ Harz; 1 ♀ jun., 1 ♀ juv., 1 pullus Pommern;
1 ♀ Island; 1 ♀ Lappland; 1 ♂, 1 ♀
Menzaleh-See (Egypten).

Genus *Gemmaeochen* Heine [*Radjah* (!) Rchb. 1853].

1. *radjah* (Garn.) — 1 ♂ Nord-Australien.

Genus *Nettalopex* Heine [*Casarca* (!) Bp. 1853].

1. *rutila* (Pall.) — 1 ♂ Ural; 1 ♀ Marocco; 1 ♀ Wolga.
2. *tadornina* [*tadornoides* (!)] (Jard. & Selby) — 1 ♂, 1 ♀ jun. West-
Australien.
3. *variegata* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Neu-Seeland.
4. *cana* (Gm.) — 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Sarcidiornis* Eyt. 1838.

1. *melanonota* (Forst.) — 1 ♂ Africa; 1 ♀ Mozambique.
-

Fam. Anatidae.

Genus *Dendrocyena* [*Dendrocygna* (!)] Sws. 1837.

1. *javanica* (Horsf.) — 1 ♂ Java.
2. *arcuata* (Cuv.) [*D. vagans* Eyt.] — 1 ♂ Macassar; 1 St. Australien.
3. *maior* Jerd. — 1 ♂ Ostindien.
4. *guttata* Forst. & Schleg. — 1 ♂ Celebes.
5. *viduata* (L.) — 1 ♂ Mozambique; 1 ♂ Süd-America.
6. *autumnalis* (L.) — 1 ♂ Britisch-Guiana; 1 ♀ West-Indien.

Genus *Stictonetta* Rehb. 1853.

1. *naevosa* (Gould) — 1 St. Australien.

Genus *Nettopus* [*Nettapus* (!)] Brandt 1836.

1. *auritus* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♀ Port Natal.

Genus *Anserella* Selby 1840.

1. *coromandeliana* (Gm.) — 1 ♀ Coromandel-Küste.
2. *albipennis* (Gould) — 1 ♂ Australien.

Genus *Aix* Boie 1826.

1. *sponsa* (L.) — 1 ♂ Washington (Nord-America); 1 ♂, 2 ♀ Nord-America.
2. *galericulata* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ China.

Genus *Mareca* Steph. 1824.

1. *penelope* (L.) — 3 ♂, 2 ♂ jun., 2 ♀ Harz.
2. *americana* (Gm.) — 1 ♂, 2 ♀ Nord-America.
3. *sibilatrix* (Poeppig) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Chile.

4. *punctata* (Cuv.) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien; 1 ♀, 1 ♀ jun.
Neu-Süd-Wales.
5. *gibberifrons* (Müll.) — 1 ♂ Macassar (Celebes).

Genus *Dafila* Leach 1824.

1. *acuta* (L.) — 3 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ Pommern.
2. *spinicauda* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Chile.
3. *erythrorhyncha* (Gm.) — 1 ♂ Tanna-See (Abessinien); 1 ♂ Süd-Africa.

Genus *Poecilonetta* Eyt. 1838.

1. *bahamensis* (L.) — 1 ♂ Britisch-Guiana.

Genus *Hyonetta* Sundev. 1872 [*Caïrina* (!) Flemm. 1822.
Carina Eyt. 1838 nec *Carine* Kaup 1829].

1. *moschata* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Brasilien.
2. *sylvestris* (Steph.) — 1 ♂, 1 ♀ Britisch-Guiana.

Genus *Anas* L. 1735.

1. *boschas* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 pullus Harz; 1 ♂ Rhein; 1 ♂ hybr.
ex *Hyonetta moschata* (L.) Harz.
2. *xanthorhyncha* Forst. — 1 ♂, 1 ♀ Cap.
3. *sparsa* Smith — 1 ♀ Africa.
4. *poecilorhyncha* Penn. — 1 ♂ Ceylon.
5. *luzonica* Fras. — 1 ♂ Philippinen.
6. *superciliosa* Gm. — 1 ♂ West-Australien; 1 ♂ *minor* Viti Levu
(Fidji-Inseln).
7. *obscura* Gm. — 1 ♂ Nord-America.
8. *specularis* King — 2 ♂ Chile.
9. *cristata* Gm. — 2 ♂ Chile.

Genus *Heteronetta* Fab. 1866.

1. *melanocephala* (Vieill.) — 1 ♂ jun. Chile.

Genus *Querquedula* Steph. 1824.

1. *crecca* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *carolinensis* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Xalapa; 1 ♂ Labrador.
3. *torquata* (Vieill.) — 1 ♂ Mexico.
4. *brasiliensis* (Gm.) — 2 ♂ Brasilien; 1 ♀ var. Britisch-Guiana.
5. *oxyptera* (Meyen) — 1 ♂ Chile.
6. *circia* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♀ Madras.
7. *cyanoptera* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Chile.
8. *discors* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America; 1 ♀ jun. vere Florida; 1 ♂, 1 ♀ Mexico.
9. *flavirostris* Vieill. — 1 St. Vera Paz (Bolivien).
10. *versicolor* (Vieill.) — 3 ♂, 1 ♀ Chile.
11. *Hartlaubi* (Cass.) — 1 ♂ Cammafluss (West-Africa).
12. *hottentota* Smith — 1 ♂, 1 ♀ Süd-Africa.

Genus *Adelonetta* Heine [*Punanetta* (!) Bp. 1856].

1. *puna* („Lcht.“ Tsch.) — 1 ♂ Peru.

Genus *Eunetta* Bp. 1856.

1. *falcata* (Pall.) — 1 ♂ Kurilen; 1 ♀ Ost-Sibirien.
2. *formosa* (Georgi) — 1 ♂ Japan; 1 ♂, 1 ♀ Ost-Sibirien.

Genus *Chaulelasmus* Gray 1838.

1. *streperus* (L.) — 1 ♂ Pommern; 1 ♀ Danzig; 1 ♂ (*Ch. americanus* Bp.) Californien.

Genus *Marmaronetta* [*Marmonetta* (!)] Rehb. 1853.

1. *angustirostris* Ménétr. — 1 ♂ Marocco; 1 ♀ Tanger.

Genus *Spatula* Boie 1822.

1. *chrypeata* (L.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 1 ♀ Harz.

2. *mexicana* (Lath.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Mexico.
3. *platalea* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Chile.
4. *rhynchotis* (Lath.) — 1 ♂ jun., 1 ♀ Australien.

Genus *Malacorhynchus* Sws. 1831.

1. *membranaceus* (Lath.) — 1 ♂ Süd-Australien; 1 ♀ West-Australien.

Genus *Metopias* [*Metopiana* (!)] Bp. 1856.

1. *peposaca* (Vieill.) — 3 ♂, 2 ♀ Chile.

Subfam. Fuligulinae.

Genus *Fuligula* Steph. 1824.

1. *rufina* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Ungarn; 1 ♂, 1 ♀ Süd-Europa.
2. *cristata* (Leach) — 4 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ Harz; 1 ♂ jun. Ostrau (Prov. Sachsen).
3. *collaris* (Don.) — 1 ♂ Washington (N.-America); — 1 ♀ Oaxaca (Mexico).
4. *marila* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun. Harz; 1 ♂, 1 ♀ Norwegen.
5. *affinis* (Eyt.) — 1 ♂ Nord-America.
6. *novae Zeelandiae* (Gm.) — 1 ♂ West-Australien.

Genus *Aithya* [*Aythya* (!)] Boie 1822.

1. *ferina* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 1 ♀ jun. Harz.
2. *vallisneriana* (Wils.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Ilyonetta* Heine [*Nyroca* (!) Flemm. 1822].

1. *nyroca* (Güld.) — 2 ♂, 1 ♀ Harz.
2. *australis* (Gould) — 1 ♂ Australien; 1 ♀ West-Australien.

Genus *Bucephala* Baird 1856.

1. *clangula* (L.) — 3 ♂, 3 ♂ jun., 2 ♀ jun. Pommern; 2 ♀ Harz;
1 ♂ Danzig.
2. *americana* (Bp.) — 1 ♂ Nord-America.
3. *islandica* (Gm.) — 2 ♂, 1 ♀ Island.
4. *albeola* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Cosmonetta* Kaup 1829.

1. *histrionica* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Grönland; 2 ♂, 1 ♀ Island.

Genus *Melonetta* Sund. 1872 [*Harelda* (!) Leach 1816].

1. *glacialis* (L.) — 2 ♂, 2 ♂ jun., 4 ♂ juv., 2 ♀ Pommern; 1 ♀ Harz; 1 ♂ *aestate*, 1 ♀ Lappland; 1 ♂ *hieme*, 1 ♀ Island.

Genus *Camptolaemus* [*Camptolaimus* (!)] Gray 1841.

1. *labradorius* (Gm.) — 1 ♂ (*valde defectus*) Nord-America.

Genus *Hymenolaemus* Gray 1843.

1. *malacorhynchus* (Gm.) — 1 ♀ Jolliefluss (Südälpen Neuseeland's).

Genus *Tachyeres* Owen 1875 [*Micropterus* Less. 1828
nec Lacép. 1802].

1. *cinereus* (Gm.) — 1 ♂ Falklands-Inseln.

Genus *Heniconetta* Gray 1840 [*Stelleria* (!) Bp. 1838].

1. *dispar* (Sparrm.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 3 ♀ Lappland.

Genus *Somateria* Leach 1822.

1. *mollissima* (L.) — 2 ♂ Nord-Europa; 1 ♂ juv., 1 ♀ Lappland.
2. *spectabilis* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♂ *vere* Lappland.

Genus *Oedemia* [*Oidemia* (!)] Flemm. 1822.

1. *nigra* (L.) — 1 ♂, 2 ♂ jun., 1 ♀ Harz; 1 ♂, 2 ♀ Pommern;
1 ♀ Lappland.
2. *americana* (Sws. & Rich.) — 1 ♂ Nord-America.

Genus *Pelionetta* Kaup 1829.

1. *perspicillata* (L.) — 1 ♂ Hudsonsbai.

Genus *Melanonetta* [*Melanitta* (!)] Boie 1822.

1. *fusca* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ jun., 3 ♀ Harz; 1 ♂ Pommern; 1 ♀ Lappland.

Subfam. Erismaturinae.

Genus *Biziura* Leach 1824.

1. *lobata* (Shaw) — 1 ♂ Van Diemens-Land; 1 ♂ jun.; 1 ♀ jun.
West-Australien.

Genus *Thalassornis* Eyt. 1838.

1. *leuconota* (Smith) — 1 St. Madagascar.

Genus *Erismatura* Bp. 1832.

1. *leucocephala* (Scop.) — 1 ♂, 1 ♀ Africa; 1 ♀ Tanger (Marocco).
 2. *australis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
 3. *rubida* (Wils.) — 1 ♂, 1 ♀ Süd-America.
 4. *ferruginea* Eyt. — 2 ♂, 1 ♂ jun., 2 ♀, 1 pullus Chile; 1 ♀ Mexico.
 5. *dominica* (L.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Cuba.
-

Fam. Mergidae.

Genus *Rhaphipterus* [*Raphipterus* (!)] Gray 1844.
Merganetta (!) Gould 1841].

1. *armatus* (Gould) — 1 ♂, 1 ♂ hornot., 1 ♂ jun., 1 ♂ juv., 2 ♀
Cordilleren von Chile.
2. *leucogenys* (Tsch.) — 1 ♂ Merida (Venezuela); 1 ♀ Neu-
Granada.

Genus *Mergus* L. 1735.

1. *merganser* L. — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 2 ♀ Thüringen; 1 ♂ Island.
2. *americanus* Cass. — 1 ♂ Sacramento-Fluss (Californien); 1 ♀
San Pablo-Bai (Californien).
3. *orientalis* Gould — 1 ♂ Japan.
4. *servator* L. — 1 ♂, 1 ♀ Harz; 1 ♂ Mansfelder Salzsee; 1 ♂ Grön-
land; 1 ♀ Chile.

Genus *Prister* Heine.

1. *brasilianus* (Vieill.) — 1 ♂ Brasilien.

Genus *Lophodytes* Rehb. 1853.

1. *cucullatus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Nord-America.

Genus *Mergellus* Selby 1840.

1. *albellus* (L.) — 2 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Harz.
-

Fam. Steganopodidae.

Subfam. Dysporinae.

Genus *Dysporus* Ill. 1811 [*Sula* (!) Briss. 1760].

1. *bassanus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Atlantischer Ocean.
2. *cyanops* Sund. — 1 ♂ Australien.

Genus *Piscatrix* Rehb. 1853.

1. *candida* (Steph.) — 1 ♂ Indischer Ocean; 1 ♂ jun. Süd-See;
1 jun. Malacca-Strasse.

Genus *Abeltera* Heine [*Sula* (!) Rehb. 1853 nec Briss. 1760].

1. *sula* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Süd-America; 1 St., 1 juv. Süd-Africa; 1 juv. Süd-See.

Subfam. Pelecaninae.

Genus *Pelecanus* L. 1735.

1. *crispus* Bruch — 1 ♂ Moldau.
2. *mitratus* Licht. — 1 ♂, 1 ♂ jun. Africa.
3. *rufescens* Gm. — 1 ♀ Philippinen.

Genus *Cyrtopelicanus* Rehb. 1853.

1. *trachyrhynchus* (Lath.) — 1 ♂ Mexico.

Genus *Catoptropelicanus* Rehb. 1853.

1. *conspicillatus* (Temm.) — 1 ♂ Australien.

Genus *Leptopelicanus* Rehb. 1853.

1. *fuscus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Porto Cabello.
2. *erythrorhynchus* (Gm.) — 1 ♂ Nord-Californien.

Subfam. Plotinae.

Genus *Plotus* L. 1766.

1. *anhinga* L. — 3 ♂, 1 ♀ Süd-America; 1 ♂ *minor* Mexico.
2. *melanogaster* Penn. — 1 St. Ostindien.
3. *Levaillanti* Licht. — 1 ♂ Port Natal; 1 ♂ N.-O.-Africa; 1 ♀ Sennaar.
4. *Novae Hollandiae* Gould — 1 ♀ Australien.

Subfam. Phalacrocoracinae.

Genus *Phalacrocorax* Briss. 1760.

1. *carbo* (L.) — 1 ♂ *nuptiarum tempore*; 1 ♀ *hieme* Nord-Europa;
1 St. *hieme* (*Graculus medius* Nils)
Egypten.
2. *sinensis* Shaw — 1 St. Japan.
3. *lucidus* Licht. — 1 ♂ Cap; 1 ♂ Abessinien.

Genus *Gripeus* Heine [*Graculus* Rehb. 1853
nec L. 1735].

1. *cristatus* (Fab.) — 1 ♂ Faroer-Inseln; 1 ♂ Island.
2. *capensis* (Sparrm.) — 1 St. Cap.
3. *dilophus* (Sws. et Rich.) — 1 St. Staat Neu-York.
4. *mexicanus* (Brandt) — 1 ♂ Xalapa.
5. *brasilianus* (Gm.) — 1 ♂, 1 jun., 1 juv. Brasilien.
6. *gracilis* (Meyen) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
7. *magellanicus* (Gm.) — 1 St. Südsee.

8. *urile* (Gm.) (*Phalacrocorax bicristatus* Pall.) — 1 St. Aleuten.
9. *pelagicus* (Pall.) — 1 St. Japan.
10. *penicillatus* (Brandt) — 1 St. Californien.

Genus *Hypoleucus* Rehb. 1853.

1. *Gouldi* Salv. (*Phalacrocorax leucogaster* Gould nec Vieill.) — 1 ♀
Neu-Süd-Wales.
2. *carunculatus* (Gm.) — 2 ♂ Chile.
3. *cirrhatu*s (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Chile.
4. *Bougainvillei* (Less.) — 1 ♂ Chile; 1 ♂ Peru.

Genus *Enygrotheres* Heine [*Stictocarbo* (!) Bp. 1856].

1. *punctatus* (Sparrm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.
2. *Gaimardi* (Garnot) — 2 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Haliastur* Heine 1860 [*Microcarbo* (!) Bp. 1856].

1. *pygmaeus* (Pall.) — 1 ♂ *nuptiarum tempore* Caspisches Meer.
2. *melanognathus* (Brandt) — 2 ♂ Ostindien; 1 ♀ Java.
3. *africanus* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♂ adolesc. Senegal; 1 ♂ Cap.
4. *melanoleucus* (Vieill.) — 1 ♂ Celebes; 1 ♂ jun. Neu-Süd-Wales.

Subfam. Tachypetinae.

Genus *Tachypetes* Vieill. 1816.

1. *aquilus* (L.) — 1 ♂ Westindien; 1 ♀ Mexicanischer Meerbusen.
2. *minor* (Gm.) — 1 ♂ Sunda-Strasse; 1 ♀ Atlantisches Meer;
1 ♀ Stilles Meer; 1 ♂ Australische
Küste.

Subfam. Phaëthontinae.

Genus *Phaëthon* [*Phaëton* (!)] L. 1756.

1. *aethereus* L. — 1 ♂ Atlantisches Meer; 1 pullus Dahlak-Archipel (Ost-Africa).
 2. *candidus* (Briss.) (*Ph. flavirostris* Brandt) — 1 ♂, 1 ♀ Atlantisches Meer.
 3. *rubricauda* Bodd. — 1 ♂ Indisches Meer; 1 ♂ Süd-See.
-

Fam. Laridae.

Subfam. Sterninae.

Genus *Sterna* L. 1748.

1. *hirundo* L. — 1 ♂, 1 ♀, 1 ♀ jun., 1 pullus Pommern; 1 ♂ Nordsee; 1 pullus Insel Borkum; 1 ♀ Grönland.
2. *fluviatilis* Naum. — 2 ♂ Harz.
3. *Forsteri* Nutt. — 2 St. Mexico.
4. *longipennis* Nordm. (*St. melanorhyncha* Finsch nec Gould) — 1 St. hieme Neu-Süd-Wales.
5. *frontalis* Gray (*St. melanorhyncha* Gould) — 1 St. Neu-Seeland.

Genus *Gelochelidon* [*Gelichelidon* (!)] Brehm 1830.

1. *nilotica* (Hasselq.) — 1 ♂, 1 ♀ Nordsee; 1 St. Ostindien.

Genus *Actochelidon* Kaup 1829.

1. *cantiaca* (Gm.) — 1 ♂, 1 ♀ Nordsee.
2. *media* (Horsf.) — 1 St. *aest.* Nord-Ost-Africa; 1 St. *aest.*, 1 St. *hieme* Ostindien; 1 St. *aest.* Sumatra.
3. *acutiflvida* (Cabot) — 1 St. *hieme* Mexico.

Genus *Phaethusa* Wagl. 1832.

1. *magnirostris* (Lcht.) — 1 ♂, 1 ♀ Guiana; 1 juv. Chile.
2. *chloropoda* (Vieill.) — 1 ♂ Chile.
3. *maxima* (Bodd.) — 1 ♀ *hieme* Nord-America; 1 ♂ *vere* Porto Cabello; 1 ♂ *aestate* Canada.
4. *elegans* (Gamb.) — 1 juv. *aestate* Chile; 1 ad. *hieme* Brasilien.
5. *cayennensis* (Gm.) (*Sterna eurygnatha* Saunders) — 1 St. Central-America.

Genus *Thalasseus* Boie 1822.

1. *caspicus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Egypten; 1 ♀ jun. Chartum.

Genus *Pelecanopus* Wagl. 1832.

1. *Bergi* (Lcht.) — 1 juv. Java; 1 ♂ Waigiou; 1 ad. *hieme* West-Australien; 1 juv. *hieme* Neu-Guinea.

Genus *Potamochelidon* Heine [*Seena* (!) Bp. 1849].

1. *seena* (Sykes) — 1 St. Madras.

Genus *Sternula* Boie 1822.

1. *minuta* (L.) — 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Harz.
2. *australis* (Gm.) — 1 ad. *aest.* Ostindien.
3. *balaenarum* (Strickl.) — 1 St. Damara-Land.
4. *pusilla* (Müll.) — 1 juv. *hieme* Borneo.

5. *melanauchen* (Temm.) — 1 ♀ China.
6. *neréis* (Gould) — 1 St. Süd-Australien.
7. *superciliaris* (Vieill.) — 1 ad. Venezuela.

Genus *Hydrochelidon* Boie 1822.

1. *nigra* (L.) — 2 ♂, 2 ♀, 1 jun., 2 juv. Harz; 2 jun. Weser.
2. *leucoptera* (Meissn. & Schinz) — 1 ♂, 1 ♂ juv., 1 ♀ Wolga;
1 ♂, 2 ♀ Galizien.

Genus *Pelodes* Kaup 1829.

1. *hybrida* (Pall.) — 1 ad., 1 juv. Pommern; 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Wolga;
2 ♂ jun. Alexandrien (Egypten).
2. *indica* (Steph.) — 1 St. Ostindien.
3. *javanica* (Horsf.) — 1 St. Ostindien.?
4. *surinamensis* (Gm.) — 1 jun. Mexico.
5. *albigena* (Lcht.) — 1 ♂ aestate, 1 ♂ hieme Süd-Europa.
6. *albistriata* (Gray) — 1 ad. Insel St. Jean (West-Indien).

Genus *Haliplana* Wagl. 1832.

1. *fuliginosa* (Gm.) — 1 St. Cuba.
2. *anaesthesia* (Scop.) — 1 St. Indisches Meer.
3. *lunata* (Pall.) — 1 St. Cap.

Genus *Gygis* Wagl. 1832.

1. *alba* (Sparrm.) — 1 ♂ Neu-Seeland.

Genus *Anous* „Leach“ Steph. 1826.

1. *stolidus* (L.) — 1 ♂ England; 1 St. Süd-See.
2. *tenuirostris* (Temm.) — 1 St. Insel St. Thomé (West-Africa);
1 St. Insel St. Helena.

Genus *Naenia* Boie 1844.

1. *inca* (Less.) — 1 ♂ Chile.

Subfam. Rhynchopinae.

Genus *Rhynchops* L. 1758.

1. *nigra* L. — 1 ♂ Antillen; 1 ♂ jun. Caracas; 1 ♀ jun. Porto-Cabello.
2. *albicollis* Sws. — 1 jun. Ostindien.
3. *flavirostris* Vieill. — 1 ♂ Dongola (Nubien).

Subfam. Larinae.

Genus *Larus* L. 1744.

1. *canus* L. — 1 ♂, 1 ♀, 2 pulli Pommern; 1 ♂ *hieme*, 1 ♂ juv. 1 ♀ Harz.
2. *Heinei* v. Homeyer* (Naumannia 1853 p. 129—130. Journ. Orn. 1885 p. 283 t. 4 f. 6) — 1 ♂ *hieme*, 1 ♂ jun. Griechenland; 1 ♂ jun. Sarepta (Wolga)
3. *delawarensis* Ord. — 1 St. Californien.

Genus *Gabianus* Bp. 1852.

1. *pacificus* (Lath.) — 1 St. Australien.

Genus *Dominicanus* Bruch 1853.

1. *marinus* (L.) — 2 ♂ Nordsee; 1 ♀ Labrador.
2. *litoreus* (Forst.) — 1 ♂ (*D. vociferus* Bruch) Magellan-Strasse; 1 ♂, 1 ♂ juv. (*D. vetula* Bruch) Süd-Africa.

Genus *Clupeilarus* Bp. 1856.

1. *fuscus* (L.) — 1 ♂ Nordsee; 1 ♀ Ostsee; 1 ♂ (*Larus fuscescens* Licht.) Egypten.

Genus *Leucus* Kaup 1829.

1. *leucopterus* (Faber) — 1 ♂ Grönland.
2. *glaucus* (Brünn.) — 1 ♂, 1 juv. Nordsee; 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ Labrador;
1 ♂ jun. Mexico.

Genus *Einalia* Heine [*Laroides* (!) Brehm 1840].

1. *argentata* (Brünn.) — 1 ♂ *hieme*, 1 ♀ *hieme*, 1 ♂ *aestate*, 1 ♀ juv. Nordsee; 1 St. (*L. Michahellesi* Bruch) Lenkoran (Caspisches Meer); 1 St. Nord-Ost-Africa.
2. *occidentalis* (Aud.) — 1 St. Farallone-Insel (Californien).

Genus *Blacipus* [*Blasipus* (!)] Bp. 1852.

1. *crassirostris* (Vieill.) — 1 ♂, 1 ♀ Japan.

Genus *Adelolarus* [*Adelarus* (!)] Bp. 1852.

1. *leucophthalmus* (Licht.) — 1 St. Rothes Meer.
2. *crassirostris* (Licht.) — 1 St. Arabien.

Genus *Ichthyaëtus* Kaup 1829.

1. *Pallasi* Kaup (*Larus ichthyaëtus* Pall.) — 1 ♂ *aestate* Sarepta (Wolga).

Genus *Chroicocephalus* [*Chroicocephalus* (!)] Eyton 1836.

1. *ridibundus* (L.) — 1 ♂ *hieme*, 1 ♀ *hieme*, 1 ♂ *aest.*, 1 ♂ jun.,
1 ♀ juv. Harz; 1 ♀ Elbing (West-

Preussen); 1 ♂ Wolgast (Pommern);
1 ♂ Rothes Meer.

2. *capistratus* (Temm.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Harz.

3. *glaucodes* (Meyen) — 1 ♂ Valdivia (Chile).

4. *Philadelphiae* (Ord.) — 1 ♂ jun. Nord-America; 1 ♂ Vancouver.

Genus *Atricilla* Bp. 1854.

1. *Catesbyi* Bp. (*Larus atricilla* L.) — 1 ♂ aest. Central-America;
1 St. *hieme* Guatemala; 1 juv. Canada.

Genus *Melanolarus* Heine [*Melagavia* (!) Bp. 1854].

1. *Franklini* (Sws. et Rich.) — 1 ♂ Mexico.

2. *melanocephalus* (Natt.) — 1 ♂ aest. Smyrna; 1 ♂ aest. Krim.

Genus *Hydrocoloeus* Kaup 1829.

1. *minutus* (Pall.) — 1 ♂ Krim; 1 ♀ juv. Wolga; 1 ♀ juv. Mans-
felder Salzsee; 1 ♀ *hieme* Nord-Ost-
Africa.

Genus *Gelastes* Bp. 1852 [*Garvia* Bruch 1853 nec Boie 1822].

1. *Novae Hollandiae* (Steph.) — 1 ♂ Australien.

2. *Andersoni* (Bruch) — 1 ♂ jun., 1 ♀ West-Australien.

3. *Lambruschini* (Bp.) (*Larus gelastes* Licht.) — 1 ♀ Alexandrien
(Egypten).

Genus *Epitclolarus* [*Epitclarus* (!)] Bp. 1854
[*Procellarus* (!) Bp. 1854].

1. *Heermanni* (Cass.) — 1 ♂ Farallone-Insel (Californien).

2. *modestus* (Temm.) — 1 St. Chile.

Genus *Chema* [*Xema* (!)] Leach 1813.

1. *Sabinei* (Sab.) — 1 ♂ Labrador; 1 ♀ jun. Grönland.

Genus *Gavia* Boie 1822 [*Pagophila* Kaup 1829].

1. *alba* (Gunn.) (*Larus eburneus* Phipps) — 1 ♂ Waranger Fjord (Lappland); 1 jun. Labrador; 1 ad. *hieme* (*Larus brachytarsus* Holb.) Grönland.

Genus *Chimonea* Kaup 1829 [*Rissa* (!) Leach 1825].

1. *tridactyla* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ *hieme*, 2 ♀ *vere*, 1 ♂ jun., 1 ♂ juv. Harz.

Subfam. Stercorariinae.

Genus *Stercorarius* Briss. 1760.

1. *parasiticus* (L.) — 1 ♂, 2 ♀ Nordsee; 1 ♂ Grönland; 1 St. Labrador; 1 St. *var. (axillaribus albis)* Faröer-Inseln.
2. *longicaudus* (Vieill.) (*Larus crepidatus* Banks) — 1 ♂ *vere* Süd-Grönland; 2 St. *aestate*, 1 St. *autumno* Harz; 1 St. Nordsee.

Genus *Coprotheres* Rehb. 1853.

1. *pomatorhinus* (*pomarinus* (!)) Temm. — 1 St. Nordsee.

Genus *Megalestris* Bp. 1856.

1. *skua* (Brünn.) (*Larus catarrhactes* L.) — 1 ♂ Nordsee; 1 ♀ Faröer-Inseln.
-

Fam. Procellariidae.

Subfam. Halodrominae.

Genus *Halodroma* [*Haladroma* (!)] Ill. 1811 [*Pelecanoides* (!)
Lacép. 1800—1].

1. *Berardi* (Quoy et Gaim.) — 1 St. Magellanstrasse.

Subfam. Procellariinae.

Genus *Pachyptila* Ill. 1811 [*Prion* (!) Lacép. 1800—1].

1. *vittata* (Gm.) — 1 St. Südsee.
2. *turtur* (Soland.) — 1 St. Südsee.
3. *Banksi* Gould — 1 St. Südsee.

Genus *Procellaria* L. 1746.

1. *pelagica* L. — 2 St. Nordsee.

Genus *Cymochorea* Coues 1864.

1. *leucorrhoea* (Vieill.) — 1 St. Atlantisches Meer; 1 St. Tanger (Marocco).

Genus *Oceanites* Keys. et Blas. 1840.

1. *oceanicus* (Kuhl) — 1 St. Küste von Nord-America; 1 St. Atlantisches Meer.

Genus *Cymodroma* Ridgeway 1884 [*Fregetta* (!) Bp. 1856
nec Cuv. 1799].

1. *tropica* (Gould) — 1 St. Neu-Hebriden.
2. *grallaria* (Vieill.) — 1 St. Südsee.

Genus *Adamastor* Bp. 1856.

1. *cinereus* (Gm.) — 2 St. Cap.

Genus *Nectris* Kuhl 1820 [*Puffinus* (!) Briss. 1760].

1. *maior* (Fab.) — 2 St. Grönland.
2. *leucomelaena* (Temm.) — 1 St. Amboina.
3. *puffinus* (L.) (*Puffinus anglorum* Temm.) — 1 St. Island; 1 St. Grönland.

Genus *Zalias* Heine [*Thiellus* (!) Rehb. 1853 nec Glog. 1827. *Nectris* Bp. 1866 nec Kuhl 1820].

1. *chlororhynchus* (Less.) — 1 St. Ostindien.
2. *tenuirostris* (Temm.) — 1 St. West-Australien.

Genus *Ossifraga* Hombr. et Jacq. 1844.

1. *gigantea* (Gm.) — 1 St. Chile; 1 St. Südliches Eismeer.

Genus *Fulmarus* Leach 1816.

1. *glacialis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ jun. Island; 1 ♀ Grönland; 1 ♂, 1 ♀ jun. Nordsee; 1 St. (*F. minor* Kjörbölling) Grönland.

Genus *Thalassoeca* [*Thalassoica* (!)] Rehb. 1853
[*Priocella* (!) Hombr. et Jacq. 1844].

1. *antarctica* (Gm.) — 1 St. Südliches Eismeer.
2. *glacialina* [*glacialoides* (!)] (Smith) — 2 St. Südsee.

Genus *Daptes* Blas. 1864 [*Daption* (!) Steph. 1825].

1. *capensis* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 ♂ Cap Horn.

Genus *Pterodroma* Bp. 1856.

1. *macropteron* (Smith) — 1 St. Südsee.

Genus *Cymatobolus* Rehw. [*Majaqueus* (!) Rehb. 1850].

1. *conspicillatus* (Gould) — 1 ♂ Australien.

Subfam. Diomedeinae.

Genus *Diomedea* L. 1758.

1. *exulans* L. — 1 St. Atlantisches Meer; 1 jun. (*D. spadicea* Lath.)
Chile.

Genus *Thalassarche* Rehb. 1853.

1. *melanophrys* (Temm.) — 1 St. West-Australien.
2. *culminata* (Gould) — 1 St. Südsee; 1 St. Nordküste von
Australien.
3. *chlororhyncha* (Lath.) — 1 St. Südsee.

Genus *Phoebetria* Rehb. 1853.

1. *fuliginosa* (Gm.) — 1 St. Südliches Eismeer.

Fam. Colymbidae.

Subfam. Colymbinae.

Genus *Colymbus* L. 1758 [*Podiceps* Lath. 1790].

1. *cristatus* L. — 2 ♂, 1 ♀, 2 ♀ jun. Harz; 1 ♂ Mansfelder Salz-
see; 1 pullus Pommern.
2. *australis* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.

Genus *Podacthyia* [*Pedeaithyia* (!)] Kaup 1829.

1. *griseigena* (Bodd.) — 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀ jun. Harz; 2 ♂ Mansfelder Salzsee; 1 ♀ jun. Altmark.

Genus *Acchmophorus* Coues 1862.

1. *maior* (Bodd.) (*Colymbus bicornis* Leht.) — 1 ♂ Brasilien; 1 ♂, 1 ♂ jun., 1 juv. Chile.
2. *occidentalis* (Lawr.) — 1 ♀ Californien.

Genus *Dytes* Kaup 1829.

1. *auritus* (L.) — 1 ♂ Island; 2 ♂ Norwegen; 1 ♀ Kopenhagen; 1 ♂, 1 ♀ jun. Harz.
2. *nigricollis* (Brehm) — 1 ♂ Harz; 1 ♂ Mansfelder Salzsee; 1 ♂, 1 ♀ *nuptiarum tempore* Tamieh in Fajum (N.-O.-Africa); 1 ♂ Nord-America; 1 ♀ Florida.
3. *californicus* (Heerm.) — 1 ♂ Yuba-Fluss (Californien); 1 ♀ Forest-Hill (Californien).
4. *Rollandi* (Quoy et Gaim.) — 3 ♂, 1 ♂ jun., 1 ♀, 2 jun. Chile; 1 ♂ Brasilien.
5. *callipareus* (*kaliparaeus* (!)) (Less.) — 2 ♂, 1 ♀ Chile.

Genus *Colymbetes* Heine [*Poliocephalus* (!) Selby 1840].

1. *nestor* (Gould) — 1 ♂, 1 ♀ West-Australien.
2. *rufipectus* (Gray) — 1 ♂ Neu-Seeland.
3. *tricolor* (Gray) — 1 ♂ Ternate.

Genus *Tachybaptus* Rehb. 1849 [*Sylbeocyclus* (!) Bp. 1832].

1. *fluviatilis* (Tunst.) (*Colymbus minor* Gm.) — 1 ♂ Altmark; 1 ♂ jun., 1 ♀ *hieme*, 2 ♀ jun., 1 pullus Harz; 1 ♂, 1 ♀ (*Sylbeocyclus capensis* Bp.)

Africa; 1 ♂, 1 ♀ (*Podiceps philippensis* Bonn.) Siam; 1 ♂ Java; 1 ♂ Japan.

2. *novae Hollandiae* (Steph.) — 2 ♂, 1 ♀, 1 jun. Australien.

3. *dominicus* (L.) — 1 ♂, 1 ♂ jun. Süd-America; 1 ♀ Mexico.

Genus *Nexiteles* Glog. 1842 [*Podilymbus* (!) Less. 1831].

1. *podiceps* (L.) — 1 ♂ Illinois; 2 ♂, 1 ♀ (*Podilymbus antarcticus* Less.) Chile; 1 ♂ Brasilien; 1 ♀ Montevideo.

Subfam. Urinatorinae.

Genus *Urinator* Cuv. 1799—1800 [*Colymbus* Lath. 1790 nec L. 1758. Eudytes Ill. 1811].

1. *glacialis* (L.) — 2 ♂, 1 ♀ Grönland; 1 ♀ Ampfurt (Prov. Sachsen).

2. *arcticus* (Less.) — 1 ♂ Grönland; 1 ♂ Nord-Europa; 1 ♂ Mansfelder Salzsee; 2 ♀ Altmark; 1 pullus Island.

3. *septentrionalis* (L.) — 1 ♂ Grönland; 1 ♂ aest., 1 ♂ hieme Pommern; 1 ♂ jun. Island; 1 ♀ Ostsee; 1 ♀ Schleswig; 1 ♀ Harz.

Fam. Alcidae.

Subfam. Cepphinae.

Genus *Brachyrhamphus* [*Brachyramphus* (!)] Brandt 1837.

1. *marmoratus* (Lath.) — 1 St. Kamtschatka.

Genus *Synthliborhamphus* [*Synthliboramphus* (!)] Brandt 1837.

1. *antiquus* (Gm.) — 1 ♂ *aest.* Kamtschatka.

Genus *Mergulus* Vieill. 1816 [*Alle* (!) Link 1806].

1. *alle* (L.) — 1 ♂ Nord-Europa; 1 ♀ Norwegen; 1 ♂, 1 ♀ Grönland.

Genus *Cepphus* Pallas 1769.

1. *grylle* (L.) — 1 ♂ *vere* Ostsee; 1 ♂ *aestate* Arktisches Europa;
1 ♂ *aestate*, 1 ♂ *hieme* Grönland; 1 ♀
aestate (*var. lactea*) Tanger (Marocco).
2. *Mandti* (Licht.) — 1 ♂ Spitzbergen; 1 ♂ *hieme* Grönland.
3. *columba* Pall. — 1 ♂ Spitzbergen; 1 ♂ *hieme* Grönland; 1 ♂,
1 ♀ Farallone-Insel (Californien).
4. *carbo* Pall. — 1 ♀ Kurilen.

Genus *Uria* Briss. 1760.

1. *Brünnichi* Sab. (*U. arra* Pall.) — 1 St. Harz; 1 St. Nordsee;
1 St. (*var. fusca*) Nördliches Eismeer;
1 St. Nordsee.
2. *lomvia* (L.) — 1 St. Nordsee; 1 St. *hieme*, 1 St. *aestate* (*U. rhingvia*
Brünn.), Island.
3. *californica* (Bryant) — 1 ♂, 1 ♀ Farallone-Insel (Californien).

Subfam. Simorhynchinae.

Genus *Ceratorhina* [*Cerorhina* (!)] Bp. 1828.

1. *monocerata* (Pall.) — 1 ♂ Farallone-Insel (Californien).

Genus *Simorhynchus* Merr. 1819.

1. *crisatellus* (Pall.) — 1 ♂ *aestate*, 1 ♂ *adol. aestate*, 1 ♂ *hieme*
Kamtschatka.

Genus *Phaleris* Temm. 1820.

1. *psittacula* (Pall.) — 1 ♂ Kamtschatka.

Genus *Ptychorhamphus* [*Ptychoramphus* (!)] Brandt 1837.

1. *aleuticus* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Santa Cruz (Küste von Californien).

Genus *Ciceronia* Rehb. 1853.

1. *pusilla* (Pall.) — 1 ♂, 1 ♀ Kamtschatka.

Subfam. Alcinae.

Genus *Alca* L. 1758.

1. *torda* L. — 1 ♂ *aest.*, 1 ♀ *aest.* Island.

Genus *Fratercula* Briss. 1760.

1. *arctica* (L.) — 1 ♂ Grönland; 1 ♂, 1 ♀, 1 ♂ jun. Island; 1 ♀ jun.,
1 St. (*var. albida*) Tanger (Marocco).
2. *corniculata* Naum. — 1 ♂ Kurilen.

Genus *Gymnoblepharum* Brandt 1837 [*Lunda* (!) Pall. 1766].

1. *cirrhatum* (Pall.) — 1 ♂ Kamtschatka; 1 ♀ Kurilen; 1 ♂, 1 ♀
Farallone-Insel (Californien).

Fam. Spheniscidae.

Subfam. Spheniscinae.

Genus *Spheniscus* Briss. 1760.

1. *demersus* (L.) — 1 ♂, 1 ♀ Cap; 1 St. *aestate* Iquique (Peru).
2. *chiloënsis* Mol. — 1 St. Chile.

3. *Humboldti* Meyen — 1 ♂ Cap Horn.
4. *palpebratus* Licht. — 2 St. Süd-America.

Genus *Pygoscelis* Wagl. 1832.

1. *papua* (Scop.) — 1 ♂ Magellanstrasse.

Genus *Endyptes* Vieill. 1816.

1. *catarrhactes* (Forst.) — 1 ♂ Tristan d'Acunha.
2. *chrysolophus* Brandt — 1 ♂ Falklands-Inseln.

Genus *Endyptila* Bp. 1856.

1. *minor* (Forst.) — 1 ♀, 1 pullus West-Australien.

Genus *Aptenodytes* Forst. 1788.

1. *Pennanti* Gray (*A. patagonica* Penn. nec Forst.) — 1 ♂ Falklands-Inseln.

Index

ordinum et familiarum.

	Species	Exempl.	Pag.
Ordo I. Oscines.			1
Fam. Rhacnemididae	172	444	1
„ Sylvicolidae	231	630	11
„ Sylviadae	119	288	23
„ Hirundinidae	44	90	30
„ Muscicapidae	81	187	32
„ Laniidae	110	269	38
„ Liotrichidae	168	271	45
„ Paridae	54	126	54
„ Certhiidae	11	25	58
„ Dacnidae	51	144	59
„ Nectariniidae	48	104	62
„ Brachypodidae	134	253	65
„ Meliphagidae	70	129	72
„ Alaudidae	38	86	77
„ Fringillidae	274	716	79
„ Ploceidae	110	213	96
„ Icteridae	80	208	102
„ Sturnidae	62	113	107
„ Paradiseidae	58	131	111
„ Corvidae	100	178	115
	2015	4605	
Ordo II. Clamatores.			122
Fam. Hypocnemididae	50	91	122
„ Eriodoridae	57	118	126
„ Pterotochidae	12	25	130
			24

	Species	Exempl.	Pag.
Fam. Anabatidae	96	154	131
„ Tyrannidae	169	341	137
„ Ampelidae	103	306	148
„ Phytotomidae	3	6	155
„ Todidae	1	1	155
„ Prionitidae	15	25	155
„ Coraciidae	36	75	157
„ Upupidae	9	19	160
„ Meropidae	28	60	161
„ Alcedinidae	88	189	163
„ Bucerotidae	34	47	169
	701	1467	
Ordo III. Strisores.			172
Fam. Trochilidae	258	630	172
„ Cypselidae	20	29	190
„ Caprimulgidae	30	67	191
„ Coliidae	5	16	194
„ Musophagidae	14	22	194
	327	764	
Ordo IV. Scansores.			196
Fam. Indicatoridae	6	11	196
„ Cuculidae	137	291	197
„ Bucconidae	24	52	206
„ Trogonidae	42	107	208
„ Galbulidae	11	35	210
„ Picidae	196	517	212
„ Capitonidae	51	110	225
„ Rhamphastidae	34	73	228
	501	1196	
Ordo V. Psittaci.			231
Fam. Pionidae	38	59	231
„ Conuridae	42	72	233
„ Psittacidae	2	4	235

	Species	Exempl.	Pag.
Fam. Palaeornithidae	27	63	236
„ Trichoglossidae	38	70	238
„ Microsittacidae	6	8	240
„ Platycercidae	34	88	241
„ Plissolophidae	23	48	243
„ Stringopidae	2	3	245
	212	415	
Ordo VI. Raptatores.			246
Fam. Strigidae	94	224	246
„ Falconidae	249	853	253
„ Vulturidae	15	29	273
	358	1106	
Ordo VII. Gyratores.			275
Fam. Columbidae	184	326	275
„ Didunculidae	1	1	287
	185	327	
Ordo VIII. Rasores.			288
Fam. Pteroclididae	14	31	288
„ Thinocoridae	3	5	289
„ Ortygidae	7	13	290
„ Perdidae	57	128	291
„ Tetraonidae	15	64	295
„ Phasianidae	35	87	297
„ Opisthocomidae	1	2	300
„ Cracidae	28	48	300
„ Megapodidae	6	7	302
„ Crypturidae	19	24	303
	185	409	
Ordo IX. Brevipennes.			305
Fam. Struthionidae	3	3	305
„ Hippalectryonidae	1	1	305
„ Apterygidae	2	2	305
	6	6	

	Species	Exempl.	Pag
Ordo X. Grallatores.			306
Fam. Ardeidae	55	132	306
„ Scopidae	1	2	310
„ Phoenicopteridae	3	4	311
„ Ciconiidae	15	20	311
„ Ibididae	18	34	313
„ Eurypygidae	2	4	315
„ Mesitidae	1	1	315
„ Rallidae	83	173	316
„ Palamedeidae	2	3	322
„ Dicholophidae	1	1	323
„ Psophiidae	1	2	323
„ Gruidae	7	12	323
„ Otididae	10	15	324
„ Scolopacidae	81	242	325
„ Dromadidae	1	2	333
„ Charadriidae	65	164	333
„ Glareolidae	12	25	338
„ Chionididae	2	2	339
	360	838	

Ordo XI. Natatores.			340
Fam. Cygnidae	6	9	340
„ Anseridae	38	74	340
„ Anatidae	89	261	344
„ Mergidae	9	28	350
„ Steganopodidae	43	81	351
„ Laridae	77	185	354
„ Procellariidae	27	44	361
„ Colymbidae	20	91	363
„ Alcidae	19	49	365
„ Spheniscidae	9	13	367
	337	835	

		Species	Exempl.	Pag.
Ordo	I. Oscines	2015	4605	1
„	II. Clamatorès	701	1467	122
„	III. Strisores	327	764	172
„	IV. Scansores	501	1196	196
„	V. Psittaci	212	415	231
„	VI. Raptatores	358	1106	246
„	VII. Gyratores	185	327	275
„	VIII. Rasores	185	409	288
„	IX. Brevipennes	6	6	305
„	X. Grallatores	360	838	306
„	XI. Natatores	337	835	340
		5187	11968	



G. Pätz'sche Buchdruckerei (Lippert & Co., Naumburg a. S.

